

వృత్తికథ

కె.వి.రాఘవరావు

ప్ర
స్థి
క
ధ

కె.వి.రాఘవరావు

విషయ సూచిక

పుట సంఖ్య

1.	బ్రహ్మియ స్వరూపము	1
2.	భామనకువులు	6
3.	జిల్కలు	8
4.	సూక్ష్మలు	10
5.	బాసుమండల తత్వము	13
6.	జన్ము నిర్ధారణము	22
7.	సూర్యగుటుంబము	28
8.	గమ్యస్థానము	35
9.	మామోక్షలోత్పత్తి	39
10.	చంద్రోదయలోత్పత్తి	40
11.	భూమండల పయస్సు	42
12.	పరమాణు స్వరూపము	45
13.	వివిధవస్తు వుంజములు	56
14.	మిశ్రమ పదార్థములు	59
15.	భూమండల పరిణామము	67
16.	జీవపదార్థము	78
17.	జీవపదార్థ సామర్థ్యములు	82
18.	చైతన్య జీవులు	84
19.	వృక్షరియములు	86
20.	జీవనృప్తి పద్ధతరణ	102
1.	పరిణామయోగోపాఖ్యము	104
2.	బహు కౌనికజీవులు	113
3.	ఎనిలిడా	115
4.	సైలూరియా, డెట్రోనిమీటా మహాయుగములు	121
5.	పెర్మియన్, కార్బోనిఫరస్ మహాయుగములు	121
6.	చైతన్య ప్రకృతి నిర్వేక్షణము	121
7.	చైతన్యముక మహాయుగము	121
8.	చైతన్యముక మహాయుగము	121

నివి యావలకు పోలేక తమతమ

సృష్టి కథ

బ్రహ్మాండ స్వరూపము

బ్రహ్మాండస్వరూప మూహతీతము. రాత్రులయం చాకాశవీధులపై
 దృష్టినిల్పి పరిశీలించినచో ననేకకోట్ల నక్షత్రములు కాన్పించును.
 అందు మిగులుకు మిగుక్కుని గోచరించు గోళములు ప్రతిదినము మనము
 చూచు సూర్యునినంటి స్వయంప్రకాశముగల తేజోమూర్తులు. అటు
 గాక తెల్లవై, అద్దమునుండి ప్రతిబింబించు కాంతివలె నిశ్చలకాంతల
 వెదజల్లు గోళములు గ్రహములు. ఇవి సూర్యుని యాకర్షణకు లోబడి
 వానిచుట్టును ప్రదక్షిణముచేయు గోళములు. గ్రహములు తమ
 ఆకర్షణబల్యచే చిన్నగోళములను తమచుట్టును త్రివ్యకొనుచుండును.
 అట్టి చిరుతగోళపే చంద్రుడు. వీనిని ఉపగ్రహములనికూడ వాడు
 25. సురు. గ్రహబలమునుబట్టి యీ చంద్రులసంఖ్య యధికముగాకూడ
 26. కిండును. కుజునకు రెండు, గురునకు నైదు, శని కెనిమిది యుప
 27. సాము లున్నట్లు దుర్భిణియంత్రపరిశీలన వలన తెలియుచున్నది.
 28. కీవిధముగా సూర్యునిచుట్టు పది గ్రహగోళములు తిరుగుచున్నవి.
 29. ధ్రువార్థమునకు ఆవరణనుండి నివి యూహలకు పోలేక తమతమ
 30. ధ్రువార్థమునకు ఆవరణనుండి నివి యూహలకు పోలేక తమతమ

విద్యుక్త కక్ష్యలలో కోట్లకొలది ఎత్తరములనుండి తిరుగుచున్నవి. వీనిని క్రమముగా 1. బుధుడు, 2. శుక్రుడు, 3. భూమి, 4. విజుడు, 5. ఒక భిన్నమైన గోళపుల్లనుకల గుంపు, 6. గురుడు, 7. శని, 8. యురేనస్, 9. నెప్ట్యూన్, 10. ప్లూటో యని వాడుచును. ఆఖరి గ్రహమైన ప్లూటో సూర్యునికు 356 కోట్లమైళ్ళ దూరములో నున్నది. దీనినిబట్టి సూర్యాకర్షితప్రపంచ మంతదూరమునకు వ్యాపించియున్న దని తెలియుచున్నది. పైన చెప్పిన పనిగ్రహములు సూర్యమండలము నుండి యుత్పన్నమగుటచే వీనిని సూర్యకుటుంబమని పిలుతును.

ఆకాశమందు పైన వివరించిన గ్రహములుగాక నగ్నదృష్టికి గోచరించు వ్రతి గోళము స్వయంప్రకాశవంతమగు సూర్యమండలమునందీగిడి. ఏలన, అత్యంతశక్తిగల దుర్భిణీయంత్ర సహాయముననే యితర సూర్యమండలములను గుర్తింపరాకుండుటను బట్టి, వాటి గ్రహములను, యుపగ్రహములను నగ్నదృష్టి సాధింపలేదనుట సర్వివచాంశము.

'హబుల్' అను శాస్త్రాత్మసిద్ధాంతవేత్తి యీ బ్రహ్మాండము 884000,000,000 బిలియన్, బిలియన్, బిలియన్, బిలియన్ల ఘనమైశ్య పరిమాణముయపనని గ్రహీతుకముగా నిరూపించియున్నాడు. దీని వ్యాసము 14000,00,000 కాంతివర్షముల దూరమని యూహించిరి. (కాంతివర్ష దూరమనగా, కాంతి సెకనుకు 186000 మైళ్ళవలెను నెడతెగక నొకసంవత్సరము నడిచిన దూరమని యర్థము.) ఊహ కందని యీ సంఖ్యానీకములు ఫలవంతమైన మేధాజన్యములుగాను, మిథ్యావాదములుగాను అనుమానించుటకు తావిచ్చుచున్నను, నట్లు భ్రమించుటకు సావకాశములేదు. ఏలన, నత్యంత పరిశీలనానుభవముగల శాస్త్రజ్ఞు లందరు నొక్కుమ్మడిగా యీ బ్రహ్మాండవ్యాసము భూమినుండి అత్యంతదూరమున గుర్తింపబడగల జ్యోతివరకు నున్న



1 వ పటము :
శ్రీరవీధి లోక పాలపుంక

పూరముకు మూడురైట్లకంటె మెక్కువగా నుండవోవడసి నిర్ణయించి రాకు. ఆవిధముగా వ్యాధమును, పరిధిని గ్రహించి ఘనసరిహారమును లెక్కవేసి.

ఈ యనంతప్రహ్లాదప్రదేశములో జ్యోతిలు, గుంపులు గుంపులుగా నుండి ప్రకాశించుచున్నవి. అనేకాకారములుగల యీ గుంపులు గుంపులముసందుడు దీప్తిములవలె నీశాలమగు ప్రదేశములలో నుండునారముగా నున్నవి (1 న పటము చూడుడు). అందుచేత వీటిని ద్వీపప్రహ్లాదములుగా వ్యాసహాసభాషలో వాడుదురు. ఒక్కొక్కద్వీప ప్రహ్లాదములో సనేకలక్షల నిజతేజోసంతములైన జ్యోతిలు లుండును. మేఘములులేని చీకటిరాత్రులం దాకాశమును పరిమలించినచో తెల్లని చారిమాదిరిగ మధ్య కన్పించును. ఇది యుత్తర చక్షుములకు వ్యాపించి యుండును. దీనిని కాలపుంత లేక శ్రీరవీధి యని వాడుకచేయుదురు. ఇంతస్వంతజ్యోతిషములైన గోళములనేకములు గుంపులు గుంపులుగా కన్పించును. కొన్నిచోట్ల తెల్ల తెల్లని మచ్చలుగా కన్పించును. వీటియం సనేకజ్యోతిలు తగుదుగా నుండుటచేతను, దూరమధికముగానుండుటచేతను అట్లు కన్పించుచున్నవి. మధ్యగానున్న శ్రీరవీధి ప్రహ్లాదమును లెండుగా భాగించుచున్నది (1 న పటము చూడుడు). ఇది యంతయు సమానమైన మందముగా లేక, కొంతసరి కెక్కువ దశసరిగాను, మరికొంతదూరము సన్నముగాను, ఒక్కొక్కచో మిక్కిలి తెల్లని మచ్చల వంక్రియు, మరియొకచో కీనకాంతిగల గుంపులు గలదిగాను యుండును. మరికొన్నిచోట్ల నక్షత్రరాసులు యొక్కభాగిని చారి మాదిరిగా నుండును. అందు మిక్కిలి క్లిష్టముగా నున్న తేజోగాసిని దుర్భీణీసహాయమున లెక్కించగ నుండు యాభైవేల సూర్యుల సంఖ్య తేలివడి. ఈ నక్షత్రరాసిని ద్వీపప్రహ్లాదముగా వాడుదురు. సముద్రములో నుండు ద్వీప




1 వ పటము .
శ్రీరవిధి లోక పొలపుంక

దూరముకు మూలకైట్లకంటె మెక్కువగా నుండకొపడని నిర్ణయించి నారు. అవిధముగా వ్యాసమును, పరిధిని గ్రహించి ఘనపరిమాణమును లెక్కవేసిరి.

ఈ యనంతబ్రహ్మాండప్రదేశములో జ్యోతిషులు, గుంపులు గుంపులుగా నుండి ప్రకాశించుచున్నవి. అనేకాకారములుగల యీ గుంపుములు సముద్రమునందుండు ద్వీపములనలె నిశాలమగు ప్రదేశములలో దూరదూరముగా నున్నవి (1 వ పటము చూడుడు). అందుచేత వీటిని ద్వీపబ్రహ్మాండములుగా వ్యావహారికభాషలో వాడుదురు. ఒక్కొక్కద్వీప బ్రహ్మాండములో సనేకలక్షల నిజతేజోసంతములైన జ్యోతిషులుండును. మేఘములులేని చీకటిరాత్రులం దాకాశమును పరిశీలించినచో తెల్లని చారిమాదిరిగ మధ్య కన్పించును. ఇది యుత్తర దక్షిణములకు వ్యాపించి యుండును. దీనిని పాలపుంతి లేక క్షీరవేధి యని వాడుకచేయుదురు. ఇందత్యంతతేజోసంయములైన గోళము లనేకములు గుంపులు గుంపులుగా కన్పించును. కొన్నిచోట్ల తెల్ల తెల్లని మచ్చలుగా కన్పించును. వీటియం దనేకజ్యోతిషులు తగుచుగా నుండుటచేతను, దూరమధికముగానుండుటచేతను అట్లు కన్పించుచున్నవి. మధ్యగానున్న క్షీరవేధి బ్రహ్మాండమును రెండుగాభాగించుచున్నది (1 వ పటము చూడుడు). ఇది యంతయు సమానమైన మందముగా లేక, కొంతవర కెక్కువ దశపరిగాను, ప్రతిజ్యోతిషూరము సన్నముగాను, ఒక్కొక్కచో మిక్కిలి తెల్లని మచ్చల వంక్తియు, మరియొకచో నీనకాంతిగల గుంపులు గలదిగాను యుండును. మరికొన్నిచోట్ల నక్షత్రరాసులు యొకటిబోసిన చారి మాదిరిగా నుండును. అందు మిక్కిలి దూరముగా నున్న తేజోగానిని దుర్భీణీసహాయమున లెక్కించగా నారు యాభైవేల సూర్యుల సంఖ్య తేలినది. ఈ నక్షత్రరాసిని ద్వీపబ్రహ్మాండముగా వాడుదురు. సముద్రములో నుండు ద్వీప

ములనలై పీఠికగూడ నియమితాశాసము లేక నుండిన కారణమున, మొత్తమువీడ అన్నియు సత్తులములుగా నుండుటచేత వీటిని ద్వీప ప్రహ్లాండములని నానకచేయచున్నాడు. ఇవి కొన్ని చిన్నవి, కొన్ని పెద్దవి, మఱికొన్ని వురీ పెద్దవిగా నుండును. శ్రీరవీధి నగరమును నిట్టి ద్వీపప్రహ్లాండము లనేకము లుండును. వీధియగువ తిరుగుగా నుండుటచే నది నెలుగుచారగా కన్పించుచున్నది. ఈ భాగముల భాగములైన కెండుభాగముల యందును నిట్టి ద్వీపప్రహ్లాండములు పలుచగా కూర్చబడియున్నవి. శ్రీరవీధియందు నీ నెలుగు ప్రహ్లాండ భాగములయందును గల ద్వీపప్రహ్లాండములను తెక్కియచగా సుహారు యిరునదిలక్ష లున్నట్లు తెలియుచున్నది.

మన సూర్యకుటుంబ మున్న ద్వీపప్రహ్లాండము కోశ్చిగుట్టు ఆకారము గల్గి శ్రీరవీధి కసారముననున్నది. దీని సూర్యము 3 లక్షల కాంతివర్ణముల దూరము. దీని మందము 60,000 కాంతి వర్ణములు. ఇందుగల నక్షత్రసంఖ్య సుమారు 47 వేల యిలియునులు. మెట్టప్రదేశములలోని గ్రామములు దూరములముగా నున్నట్లు యీ ద్వీపప్రహ్లాండములు సుహారు 60,000 కాంతివర్ణముల దూరమున కొక్కొక్కటి యున్నవి. అన్ని ద్వీపప్రహ్లాండములనలనే మన ద్వీపప్రహ్లాండము గూడ నెకనురు 200 మైళ్ళవ్యాప్తము పడుచు చున్నది. ద్వీపప్రహ్లాండములోని జ్యోతులు పరిపిడిగా నుండును. అట్లుగాక కొన్ని విడివిడిగాను మఱికొన్ని తేజోమేఘమునగుడు మఱియె యందందు మిగుకుమిగుక్కుని మెరయుచుండు ద్వీపములు గు డుండును. వీటిని 'నెబ్యులస్' ద్వీపము లందును. కొన్ని నెబ్యులస్ యందు విడిగానున్న జ్యోతు లేకవర్తులాకారముగా తేజోమేఘము; తెన్మధ్యమునమాత్ర మొక్క సూర్యుడు వెలుగుచుండును. మఱికొ నెబ్యులస్లయందు, మధ్యనున్న పెద్దజ్యోతికి చుట్టును కొన్ని చి



2 వ పటము :
ద్వీపబ్రహ్మాండము



శివ పటము :

గుండ్రని నెబ్యులన్

చిన్న జ్యోతులుండి మొత్త మివన్నియు తేజోమేఘముం దిమిడి యుండును. కేంద్రమందుగల పెద్దజ్యోతి మిక్కిలి సాంద్రమైన తేజో పదార్థము గలది. చుట్టును నానరించియున్న తేజోమేఘ మత్యంత లఘుసాంద్రత గల్గిన తేజోనాయువుచే నిర్మింపబడియుండును. చుట్టును గల చిరుతజ్యోతులు, కేంద్రజ్యోతినుండి యుత్పత్తియైన గోళములు. అవి యట్లుత్పత్తియగుటకు కొన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరములు పట్టును. పైన వివరించిన ప్రకారమున్న నెబ్యులస్ ల సేకసంఖ్యాకములుగా నందందు బ్రహ్మాండములో చూరదూరముగా నున్నవి. ఈ నెబ్యు లస్సులు ద్వీపబ్రహ్మాండములకంటె చాల చిన్నవియు, సూర్యునికంటె యనేకలక్షల రెట్లు పెద్దవియునై యున్నవి. ఒక్కొక్క నెబ్యులస్స్ వ్యాసము సుమారు 70 వేలకోట్ల మైళ్ళ చూరమై యుండును. ఒక నెబ్యులస్స్ గర్భములో కొన్ని వేల సూర్యకుటుంబములు విశాలముగా తిరుగుటకు అవకాశముండును. నెబ్యులస్స్ కు కేంద్రమందుగల నొడ్డ జ్యోతినుండి యనేకవందల చిన్న సూర్యు లుత్పత్తి యగు చుండును. అట్లుత్పత్తియైన చిన్నజ్యోతులే మాతృజ్యోతికి దూర ముగా జరిగి విశాల బ్రహ్మాండములోనికి జారిపోవుచుండును. మన సూర్యబింబముగూడ అట్లే యొక నెబ్యులస్స్ కేంద్రమందుగల పెద్ద జ్యోతిలోనుండి విడివడి విశాల బ్రహ్మాండములోనికి బహుదూర ముగా జరిగిపోయిన తేజోగోళము. ఇట్టి సూర్యమండలములు బ్రహ్మాం డములో దురూహ్యవేగముతో ననగా సుమారు సెకనుకు 200 లగా యిటు 500 మైళ్ళవంతున పరుగిడుచున్నవి. అవి యొకదానితో నొకటి ధీకొనకుండుటకు రెండు ముఖ్యకారణములు కాన్పించుచున్నవి. మొదటిది, యవి యంత్యంత దూరమున నుండుట. రెండు యీ గోళము లన్నియు ననుకూల (+), ప్రతికూల (-) విద్యుచ్ఛక్తి సముదాయము లగుట. ఒక నెబ్యులస్స్ యందుగల తల్లి జ్యోతినుండి వుట్టిన

జ్యోతులన్నియు నొకేరకపు విద్యుచ్ఛక్తిగలవియై యుండును. అందుచే నవి కొంత సమీపములో నున్నను పుష్పర మాకర్షించుకొనక, బహుస్థితిచుకొనుచుండును. హెచ్చులన్ నక్షత్రపు నుంపునందు పక్షి నక్షత్రము లీ పరిస్థితిని తెల్పుచున్నవి. ఒక ప్రతికూల విద్యుచ్ఛక్తిగల గోళము నుకొక అనుకూలశక్తిగల గోళమునుమాత్రమే యాకర్షించును. ఇట్టిగోళముల నుత్పత్తిశేయు నెబ్యులన్లు ప్రహ్వంపిలగా నపారదూరమున నుండుటచే ననుకూల ప్రతికూల శక్తియుతములగు జ్యోతులు గన్నిహితముగుట యసంభవము, చాల యదుడు. అందుచే ముగా నున్నను గోళగర్భితములైన అనుకూల, ప్రతికూల నిష్పిచ్ఛక్తులు పనిచేయుచుండుటవలన, ఆకర్షణ, బహిష్కరణ క్రియలు స్వల్పబలసంయుతములుగా నాగుచునే యుండును. సదిగోళముల నిష్పిచ్ఛక్తులు మొకగోళము, కొన్నిటిచే దగ్గరకు నాకర్షింపబడుటయు, మరి కొన్నిటిచే బహిష్కరింపబడుటయు జరుగుచుండునుగాన, సామీప దాయకమైన ఆకర్షణశక్తి, బహిష్కరణశక్తి మొకదాని నాకర్షింపవారిచి షధ్యనున్న గోళము నలింపక యున్నచోటనే యుండుట తటస్థించును. నెబ్యులన్లు మూడురకములు: 1. గుండ్రనివి, 2. వృత్తాకారముగలవి, 3. చీకటి నెబ్యులన్లు. మొదటి రెండురకములు తేజోమయములు. మూడకరకము తమోమయము (6 న పటము చూడుడు). ఈ తమోమయ నెబ్యులన్లు ధూమపేఘు సంయుతములు. వీటియందు కాంతికిరణముమల యంత చిన్న చిన్న పదార్థ కణువులు దట్టముగా నుండును. ఆకారణమున నివి కాంతిప్రసారము నడ్డుచుండును.

ధూమ కేతువులు


సూర్యులు, వాటి గ్రహములు, చంద్రులేగాక మరియొక గణగతి విహంగజ్యోతి లవృషదవృషడు మింట నాగంతుకముగా గన్పట్టు

చుండును. వీటిని తోకచుక్కలనియు, ఘామకేతువులనియు నందును. వీటి యుత్పత్తి నెబ్బులస్సెలనుండి యగుచుండును. అతి తేలికమైన నెబ్బులస్సెలలో నుండు కేంద్రజ్యోతి కొన్ని చిన్నగోళములను బైటికి నెనబల్లుట తటస్థించును. వ్రతి చిన్నతునుక తనను బరివేష్టించియుండు తేజోమేఘమును నెంటుబెట్టుకొని గూరముగా బోవును. అమితవేగమున బోవు తేజోబింబము చుట్టును గల యీ తేజోఘామము కొంతకాలమున కొక తోకఆకారము నొందును. ఇట్టి ఘామకేతువులు బ్రహ్మాండములో ననేకసహస్రము లుండును. మిక్కిలి తేలికమైన తేజోవాసువుచే సంఘటించబడినవగుటచే యితరగోళములు వీటిని బహుచూరమున నున్నను యాకర్షింపగలవు. వీటిలో కొన్నింటికి నియమితకక్ష్యలుండును. మరికొన్ని యట్టి కక్ష్యలులేక, నేదో యొక మార్గమున బోవుచుండును. వ్రతి తోకచుక్కయు సూర్యులవల్ల నాకర్షింపబడి వాటిచుట్టు ప్రదక్షిణముచేసి పోవుచుండును. చిరకాలముమండి రెండు తోకచుక్కలు మన సూర్యుని నియమితకాలమున ప్రదక్షిణముచేసి పోవుచున్నవి. ఇందు 26 సంవత్సరముల కొకటి, 76 సంవత్సరములకు రెండవది వచ్చుచుండును. కొన్ని ఘామకేతువు లొక్కసారిమాత్రమే గోచరించి తిరిగి మరెన్నడు గానరాకుండ బ్రహ్మాండములోనికి బోవుచుండును. ఘామకేతువు లొక ద్వీప బ్రహ్మాండములో బ్రవేశించినపు డందుగల యనేకజ్యోతు లొకర్షణ, బహిష్కరణ శక్తులకు లోనై వాటి సారాంశముగ నొక నియమిత కక్ష్యను బొందును. అట్టి కక్ష్య నతిక్రమించి పోబాలక నందే కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు ప్రదక్షిణములు చేయుచుండును. తలవైపున నున్న చుక్క తేజోఘామముకంటె సాంద్రతరమైనది. అందుచే నా చుక్క యాకర్షణవలన యీ తేజోఘామము తోకగా నీడ్చుకొని పోబడుచుండును. కొన్ని వెయ్యిసంవత్సరముల కొకతూరి గన్పట్టు

చుండును. 1811 వ సంవత్సరములో కనబడిన తోకచుక్క తిరిగి మూడు వేల సంవత్సరములకు గాని రాదని నిర్ణయించిరి. ఈ తోకచుక్కలు తమ నిరంతరపర్యటనములో బహు సంఖ్యాకములై సగోళములకు సన్నిహితముగా బోవునప్పుడు వాటి స్వరూపస్వభావాదులను గోలుబొంబుల తటస్థింపఁను. ఆనుపంగికమున నొక పెద్ద గోళమునకు సమీపముగ బోవునప్పుడు ధూమకేతువు తన తోకలో కొంత భాగమును ప్రత్యేచుకొనుట సంభవించును. అంతేగాక చుక్కలో గూడ కొన్ని హాస్పిలు కలుగుట కవకాశమున్నది. తోకగా ననుసరించు తేజోదూమము బహు తేలికైనది యగుటచేతను, ననేక కోట్ల మైళ్ళ పొడవున వ్యాపించి యుండుటచేతను, సులభముగా నందు హాస్పిలు నచ్చుట కవకాశమున్నది. 1811 వ సంవత్సరపు ధూమకేతువు తోకపొడవు పడకొంకుకోట్ల మైళ్ళు. 1950 వ సంవత్సరంలో కనబడిన దాని తోక తొమ్మిదికోట్ల మైళ్ళు. 1918 వ సంవత్సరములో కనబడిన తోకచుక్క తోకలో భూమి కొన్నిరోజు లున్నదని విశేషజ్ఞులు గ్రహించియున్నారు.

ఉ ల్క లు

మరికొన్ని చిన్న తరగతి గోళము లనేకకోట్లకాశముందు నుండు రిండు చుండును. ఇవి భూమినలెనే సూర్యుని చుట్టును తిరుగుచుండును. భూమి తన కక్ష్యలో వీటికి సమీపముగా బోయినప్పు డివి యాకర్షింపబడును. భూతలముమీద నుమాటు నూరుమైళ్ళవరకు గాలి యున్నది. దీనిని వాతావరణ మందును. ఈ వాతావరణమునకు పైన పూర్తిగా శూన్యప్రదేశే మైస ఆకాశము. భూమియొక్క వాతావరణ మంతయు సమానసాంద్రత గల్గినదిగాదు. 2, 3 మైళ్ళ వరకును గాలి వొట్టుగా నుండును. అటుపైన క్రమముగా వలచబడి యుండును.



5 వ పటము ।

హెర్కులస్

క్రమేపి పలకబడిన గాలి 70 లగాయిత: 100 మైళ్ళ వరకు ఉపా-
 పలచగా నుండును. ఆకర్షితములైన యుల్కలు భూమియొక్క వాతా-
 నరణములో ప్రవేశింపగానే గాలి తాకుట: యొరికినీ నలన అన్నిపుట్టి
 మండుట కారంభించును. ఈ నూరుమైళ్ళు మంచుచు వచ్చుసరికి నవి
 బహుచిన్నగోళము లగుటచే పూర్తిగా మండిపోయి దేవవులనలె
 భూమిని చేరును. కొన్ని పెద్దరకపు టుల్కలు కాలగా మిఠి భూమిని
 ఒక పెద్దచాయగా తాకుట కలదు. భూమిని చేరగా దానియందున్న
 ఉష్ణిమును భూమి లాగుకొనును. వెంటనే చల్లబడి యొక బండ
 ఆకారమును పొందును. కొరియాదేశమందున్న 'ఎరిక్సోనా' యను
 జిల్లాలో పూర్వ మొక పెద్ద యుల్క పడినదట. అది భూమిని చేరు
 సరికి సంచరమునుండి చూచువారికి సూర్యమండలము భూమిమీద పడి
 నట్లు గోచరించినదట. దిగుటలోగూడ నూటిగాగాక విమానము
 భూమిని చేరునట్లుగా క్రమేణ దిగును. అప్పుడా వేడికి చుట్టుపట్లగల
 చెట్లు, ఇంతువులు నశించిపోవును. ఎరిక్సోనాలో యీలా ఉల్క పడ్డ
 చోట యిప్పటికిని నొక పెద్ద గొయ్యి నూరడుగుల వ్యాసము గల్గి,
 40, 50 యడుగుల లోతున నున్నది. ఈ విధమైన గొయ్యియే రష్యా
 దేశమున మనోకటి కలదు. అచ్చటగూడ ఉల్కాపాతము వల్లనే
 యేర్పడి యున్నదని తెలియుచున్నది. చల్లరిన పిదప వీటిని రసాయన
 పరీక్షచేసి యినుము, రాగి మొదలైన ఖనిజము లందున్నట్లు
 గ్రహించియున్నారు. 1940 లో యీలాంటి ఉల్క పడినప్పుడు
 దానిని చల్లరగానే బ్రద్దలుగొట్టి చూచినారు. దాని పొడుమును
 నీటితో తడిపి కొంతకాలముంచుసరికి నందు క్రొత్తరకపు బేక్ట
 రీయము లుత్పన్నమైనవి. దీనిని బట్టిచూడ జీవస్పృష్టి భూమిమీదనేగాక
 యితరగోళములందుగూడ నుండుటకు సావకాశమున్నదని తేలు
 చున్నది. ఇది సంభవమనుటకు మరియొక ప్రబలకారణము గూడ కలదు.

సాధారణముగా జంతువులకు వృక్షములకు జీవనాధారమైనది ప్రాణ వాయువు (Oxygen). కొన్నిరకపు బేక్టీరియములు యీ ప్రాణ వాయువుయొక్క అవసరము లేకయే జీవించగలవు. అందుచే నితర గోళములందు జీవసృష్టియందుట కవకాశమున్నదని తోచుచున్నది.

సూర్యులు

సెబ్యులస్సలో నుండి ధూమకేతువులు, సూర్యులు గూడ ఉత్పత్తి నొందుట కవకాశమున్నది. వీటియందు గల పదార్థ తత్వమును గూర్చి, తేజోవిమర్శక యంత్రసహాయమువలన పరిశీలనలు జరిగినవి. ఇవి మహత్తరములైన తేజోమయ ధూమగోళములు. మండలోపరిభాగమందగ్నికీల లావరించి యుండును. దాని మధ్యయందత్యుష్ణమై యుపరిభాగమందున్న బరువుచేత కుదించబడిన సాంద్రతరమైన తేజోవాయువు, కొంత ద్రవముగూడ ఉండును. నాభిస్థానమందు గల గురుతరపదార్థమువలన గోళమునకు నాకర్షణాది శక్తులు కలుచున్నవి. గురుత్వనాభి ఆకర్షణబలము వలననే ఉపరిభాగమందున్న అగ్ని తేజోవాయువు విచ్ఛలవిడి యావలకు పోనేరక మండలము చుట్టును ఆనరించి యుండును. ప్రతి తేజోమయ గోళతత్వము నించుమించుగా నిల్లే యుండును. పరిమాణభేదములను బట్టి ఆకర్షణబలముల తారతమ్యము లేర్పడుచున్నవి. ఈ సూర్యులకు చలనము గూడ ఉండును. అమితవేగమున నివి యార్థి ప్రదక్షిణము చేయుచుండును. అట్టితరి లోని ద్రవ వాయుపదార్థములయందెడతెగని యాందోళన కలుగుచుండును. సాంద్రతలో నందందు తేడా లుండుటచే నొకచోటనున్న పదార్థ మింకొకచోటికి సర్దుకొనుచుండును. మండల మధ్యమందు గల ఆందోళననుబట్టి యీ సర్దుబాట్లతివేగముతో జరుగుటయేగాక, కేంద్రమునుండి చిన్న చిన్న తునుక

లవలక విసరవెయబడుట కల్గుచుండును. అట్లు విసరివేయబడిన చిన్న తునుకలుగూడ గోళాకారమును, గుండ్రముగా తిరుగుచుండిన కారణమున పొందును. ఈ విషయమును సులువుగా ప్రయోగముచేత నిర్ణయింప నగును. (4 వ పటము చూడుడు) ఒక గుండ్రని చెక్కవీడ తది రేగడి మంటినిగాని, చలిమిడినిగాని యొక ముద్దగా నుంచి, చెక్కను నట్టులముగా నతివేగముగ త్రిప్పినచో పైనున్న రేగడిమంటి యుండకు ప్రాతిపదికలోని యాకార మెట్టిదైనను, గోళాకారము వచ్చును. అందు చేతనే యాకాశమందు గల సర్వజ్యోతులు, వాటి గ్రహములు, ఉపగ్రహములు మొదలైన నన్నియు బంధివలె గుండ్రముగా నున్నవి. గోళములం దన్నిటను గుండ్రముగా తిరుగు చలనమే కలదు. ఈ రకపు చలనము ఆద్యంతములు లేక శాశ్వతముగా నున్నది. పై విధముగా గాలిచే విసరబడి యావలకు బంపబడి చిన్నగోళము లనేకములు నెబ్యులస్ యొక్క ఆకర్షణ ప్రపంచము లోనే చాలకాలమునుండి క్రమముగా దూరమునకు జరిగిపోవుట గల్గును. ఇట్టి సంఘటనలు జరుగుటకు వేలాది కోట్ల సంవత్సరములు వట్టుచుండును. నెబ్యులస్ లలో నుండి విడుదలయిన తేజోమయ గోళములు క్రమముగా సాగి యతివేగముతో ఆవలకు లక్షలాది సంవత్సరములు ప్రయాణముచేసి చివరకు విశాల వియత్తలములోనికి ప్రచుండును. స్వప్రకాశములైన గోళములన్నియు నీ విధముగా న్నించినవియే యైయున్నవి. వీటిని సూర్యులందురు. ప్రతిదినము మనము చూచు సూర్యుడు పెద్దకాలముక్రిందట నీవిధముగానే యుద్భవించిన మండలము. అందుచే మన సూర్యమండలముగూడ యొక పెద్ద తేజోరాసియే గాక బృహదగ్నిపిండమై యున్నది. దీని యుపరిభాగమందు తేజోవాక్రింపులు, అగ్నికలలు పదిలక్షలమైశ్శవరకు వ్యాపించియున్నవి (7 వ పటము చూడుడు). అందలి యుష్ణ మారువేల డిగ్రీలకు గాని

యుయను. నెబ్యులస్లోనుండి చాలకాలముక్రిందట విడువలయి యుండటచే దీని యపరిభాగమందు వాయుపదార్థమున్నను, లోపల వేడిద్రవము, కొన్ని చోట్ల ఘనపదార్థముగూడ ఉండును.

మన సూర్యమండలమువంటి గోళములు భూమికి విశేషగూరమున నున్నవి. అం దన్నిటికంటెను సమీపమున నున్న సూర్యగోళమును 'సిరియస్' అందుకు (Dog Star). ఇది భూమికి ఎనిమిదిన్నర కాంతి వర్షముల దూరమున నున్నది. పరిమాణములో రవిమండలముకంటె సాధారణముగా చుట్టువట్ల నున్న సూర్యగోళములన్నియు నధికములు. ఇందు బాగుగా లక్షింపబడి పరిశీలించబడినవాటిలోనికి వచ్చునవి : 1. అర్కూడిస్, 2. రీగల్, 3. సిరియస్, 4. బీటల్ రీజ్, 5. అంటారిస్ యనునవి.

ఇనమండలవ్యాసము 8 లక్షల 50 వేల మైళ్ళు. నవీనయంత్ర సహాయమున సాధింపబడినదగుటచే నీ సంఖ్య సరియైనదనుటలో గంభీరము లేదు. కాశీఖండములో నొకచోట భానుమండలము లక్ష యోజన విస్తీర్ణముగా వర్ణింపబడినది. విస్తీర్ణపదమునకు వ్యాసమై యుండనోవునని భావించినచో యోజనమనగా 8 మైళ్ళు కావున, ఈ లెక్కకు కొంచె మించుమించుగా సరిపోవుచున్నది. భూమికిని, సూర్యునికిని గల దూరమునుగూర్చిగూడ పూర్వగణితము లున్నవి. అధునిక పరిశీలనలవల్ల ఈ దూరము 9 కోట్ల 20 లక్షల మైళ్ళుగా తెలియుచున్నది. వీటినిబట్టి చూడ కొంతవరకు ఈ విధమైన లెక్కలు వేయుటకు మన పూర్వులు వ్రయత్నించినట్లుగా తెలియును.

వై సుదాహరించిన 'అర్కూడిస్' అను మరియొక సూర్యమండల వ్యాసము 2 కోట్ల మైళ్ళు. దానికంటెను పెద్దది 'రీగల్' గోళము. దీని

మధ్య వ్యాసము మూచుకోట్ల మైళ్ళు. వీటికంటె ననేకరెట్లు పెద్ద సూర్యమండలములు గలవు. అందు యహుపెద్దవి యనంబగునవి "బీటల్ గీజ్", "అయారిస్" మండలములు. వీటిలో మొదటిదాస వ్యాసము 29 కోట్ల మైళ్ళు. దీని గర్భములో మను సూర్యమండలము, దాని కుటుంబమైన బుధాదిగ్రహములు స్వేచ్ఛగా తమ కక్ష్యలలో తిరుగాడగల్గును. దీనికంటె మేటియనంబగునది అయారిస్. దీని వ్యాసము 48 కోట్ల మైళ్ళు. అంత పెద్దవియోయున్నను, యహు చిన్న చుక్కలవలె గోచరించుటకుకారణ మవి యనేకనంబల కాంతివర్ణముల సూరమున నుండుటయే.

ఈ జ్యోతులను వాటి రంగులనుబట్టి కొన్ని తెగలుగా భాగింప వచ్చును. సామాన్యముగా కన్పించునవి ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు, నారింజపండురంగు, నీలివర్ణము గలవి. ఉష్ణతారతమ్యము లీ రంగులను బట్టి తెలియనగును. పసుపురంగున వ్రకాశించు ఇనమండల ఉష్ణము 6000 డిగ్రీలు. యెర్రని కాంతుల నీను అయారిస్ ఉష్ణోగ్రత 3100 డిగ్రీలు మాత్రమే. నీలిరంగు గల రీగల్ యొక్క ఉష్ణము 16000 డిగ్రీలు. తెల్లని కాంతిగల వాటికి యింకను యొక్కవ వేడి యుండును. దీప్తి యందును, సాంద్రత యందునుగూడ నిట్లే తారతమ్యము లుండును.

భానుమండల తత్వము


సూర్యమండలము తేజోయుత వాయునిర్మితము. మండలోపరి భాగమం దగ్నికీలలు 50 వేలు మొదలు కొన్ని లక్షల మైళ్ళ వరకు వ్యాపించుచుండును. ఇందు వై భాగములందు వాయుపదార్థ మున్నను, మండల కేంద్రము వైపు పోను పోను వేడిద్రవ మున్నది. సాభిస్థానమం దీ ద్రవ ముండుటచేత గురుత్వాకర్షణ కలుగుచున్నది. వాయువు,

ద్రవము యొక్కవగా నుండుటచే సాంద్రత తక్కువగా నున్నది. భూమియొక్క సాంద్రతలో నాలవవంతుండును. లఘుసాంద్రవంతమైన దైనను గోళము స్థూలమైనది, బాహుశ్యమైనది యగుటచేత గాఢమైన కేంద్రాకర్షణశక్తిని కల్గియున్నది. ఈ శక్తివలన తన యందున్న పదార్థము నొక యుండగా నుండబట్టుటయేగాక, యితర చిన్న గోళములను గూడ ఆకర్షింపగల్గుచున్నది. ఈ శక్తికి విరుద్ధమైనదియు, సర్వదా న్యతిరేకముగా పనిచేయునదియు మరొకశక్తి కలదు. నానిని కేంద్ర బహిష్కరణ శక్తి (Centrifugal force) యందురు. దీనివలన యే వస్తువైనను గోళ కేంద్రమునుండి యావలకు త్రోసి వేయబడుచుండును. కేంద్రబహిష్కరణశక్తి యొక చక్రము గాని గోళముగాని గిరుగ తన యక్షిముమీద ఆత్మప్రదక్షిణము చేయునపు కుత్పత్తి యగును. తిరిగెడి వేగము ననుసరించి యీ శక్తి యొక్క బలము నిర్ణయింపబడును. అనగా గోళ మతివేగముగా తిరుగునప్పుడు శక్తి ప్రబలముగా నుండుటయు, వేగము తగ్గినచో శక్తి క్షీణమగుటయు, చలనము పూర్తిగా తగ్గినచో నీ బహిష్కరణ శక్తి పూర్తిగా నభీనమగుటయు గల్గును. చలనముగల గోళమునందీ రెండు శక్తులు పరస్పరవిరోధముగా బనిచేయుచుండును. కాని ఈరెండు శక్తులు సమానబలము గలవిగా నుండుటరుదు. సాధారణముగా కేంద్రాకర్షణశక్తి యొక్కవ బలముగలదై యుండును. అట్లు కానిచో గోళము యితరగోళముల నాకర్షింపనేరదు.

సూర్యమండలము తన యక్షిముమీద అనవరతము తిరుగుచుండును. ఇరువదియైదురోజుల కొకసారి పూర్ణప్రదక్షిణము చేయును. ఇందు రెండు శక్తులు పరస్పరము వ్యతిరేకముగా బనిచేయుచున్నను, కేంద్రాకర్షణశక్తి యొక్కవ ప్రాబల్యముగా నుండును. మండల మతి



6 వ పటము.
వక్రపు నెబ్యులస్



8 వ పటము :

సూర్యమండలములోని తేజోవాయువు

వేగముగా తిరుగునప్పుడు పరిభ్రామము గల కొంత తేజోవాయు వానలకు విసరబడుచుండుటయు, పునః ఆకర్షణకు లోబడి మండలములో మరియొకచోట కలిసి యందు లీనమగుటయు గలుగుచుండును. (8 వ పటము చూడఁడు) ఒక్కొక్కసారి గోళమునుండి రేసిన తేజోవాయు మేఘములు మండలమును వీడి బ్రహ్మాండములోనికి బోవుచుండును. అట్లు పోవుచున్న వాయుపదార్థము యొక్క వేగ మొకసారి పరిశీలించగా సెకనుకు 500 మైళ్ళున్నట్లు తెలియవచ్చినది. అంత యద్భుతమైన వేగముతో పోకపోయినచో నా పదార్థము తిరిగి ఆకర్షింపబడుటకు సావకాశ ముండెడిది.

ఈ లేచిపోయిన తేజోవాయువు పోయి పోయి యందందు చిన్న చిన్న గోళము లుద్భవించును. అంత వేగమున ఆ తేజోవాయువు భూమిపైపుకు వచ్చినచో భూమండలమందుగల జీవస్పృష్టియంతయు హఠాత్తుగా నశించిపోవుట సంభవించును. పై విధముననే గాక భానుమండల మనవరతము నిముసమునకు 30 కోట్ల టన్నుల బరువును కిరణ ప్రసారమువలన గోలుపోవుచుండును. దీనినిబట్టి సూర్యమండలము కొన్ని కోట్ల సంవత్సరముల క్రిత మిప్పటికంటె యనేకరెట్లు పెద్దదిగాను, ప్రకాశమానముగాను ఉండియుండవలెను. మార్చండేయపుగాణమందీ యంశము గన్పించుచున్నది. ప్రస్తుతమున్న తేజస్సునకు రెట్టింపు తేజముతో సూర్యమండలము పూర్వము ప్రకాశించుచుండెడిదని వ్రాయబడియున్నది.

సూర్యమండలమందు వాయు, ద్రవపదార్థములే గాక అందందు ఘనీభవించిన ఘనపదార్థముగూడ ఉండును. ఈ ఘనపదార్థమున్నచోట్ల తేజోహీనమై నల్లగా కనిపించును. అట్టి ప్రదేశములు నల్లని మచ్చలవలె కన్పించుచున్నవి. మచ్చల ప్రదేశమంతయు చల్లారి గడ్డగట్టిన నేల యని

భావింపదగును. కాని ఈమచ్చలకు వృద్ధిక్షయములు గలవు. (శని పటము చూచును) ఒకప్పుడు యెక్కువ మచ్చలు కనపడుటయు, మరొకప్పుడు తక్కువగ కనబడుటయు, ఒకే మచ్చ తన యాకారమును మార్చుకొనుటయు సంభవించుచుండును. దుర్భిణీయంత్రసహాయమున జూడ నీ మచ్చలు బహు చిన్నవిగా కన్పించినను వాటిలో నొక్కొక్కదాని పరిమాణము భూమండలమంత డుండును. ఈ మచ్చలు చిన్నవి పెద్దవి యగుటయు, పెద్దవి చిన్నవి యగుటయు, నొక పెద్దమచ్చ కొంతకాలమునకు రెండు, మూడు చిన్న మచ్చల సముదాయముగా మారుటయు సంభవించుచుండును. ఇట్టి మావులకు కారణము మండల మందుగల వేడివాయువదార్థము కొన్నిచోట్ల చల్లబడి గడ్డగట్టుటయు, చాలాచల్లబడి గడ్డగట్టిన ప్రదేశములు తిరిగి కొన్నిచోట్ల తేనో వాయు రూపమును ధరించుటయు నని తెలియుచున్నది. ఈ మచ్చల పరిశీలనల యందు విశేషవృత్తి. జరిగియున్నది. ప్రత్యేకముగా నొక మచ్చను గురించి దానినే దీక్షతో పరిశీలించినచో నది పూర్తిగా నల్లరంగులో నుండక, మధ్యభాగమందు మాత్రము నల్లగానుండి, చుట్టు అంచుభాగమందు ధూసరవర్ణముగల్గియుండును. వీటి ఛాయాచిత్రములనలన నీ ధూసర వర్ణముగల అంచు, మచ్చపరిధినుండి మచ్చపైబడు అనలజ్వాలల దీప్తి యని తెలియుచున్నది. ప్రతిమచ్చకు చుట్టును అనలజ్వాల లుండుటచే నొకప్పుడు చల్లబడి గడ్డగట్టిన ప్రదేశములు తిరిగి ద్రవ, వాయువదార్థములుగా మారుటకు సావకాశమున్నది. అందుచే నొకప్పుడు దృశ్యమైన మచ్చలు మరొకప్పుడు యదృశ్యము లగుచుండును. మండలమధ్యమం దనవరతము కల్లోలపరిస్థితి యుండుటవలన నిట్టి మచ్చ లుత్పత్తియగుటకు, హరించుకొనిపోయి శూన్యమగుటకు సులభ సాధ్యములైన సావకాశము లున్నవి. సూర్యమండలము తన యక్షుము మిథ పడమటినుండి తూర్పునకు భూమినలెనే ఆత్మప్రదక్షిణము

చేయుచున్నట్లు కనుగొనుట కే మచ్చల పరిశీలనయే సూభారమై యున్నది. ఒక మచ్చను తదేకదీక్షతో ననుదినమును జూచుచుండి న-నో నది యొకమూలనుండి యెదురుగానున్న సూలకుజరిగి యదృశ్యమై పదునాల్గురోజులు పూర్తిగా ముగుపడి తిరిగి ప్రాతిపదికలో గన్పించిన చోట గన్పించుచున్నది. ఈ పరిశీలనలవల్ల సూర్యుడివదియైదురోజుల కొకసారి తన చుట్టును తాను తిరుగుచున్నట్లు తెలియుచున్నది.

గోళగర్భమందుగల నిరంతరసంక్షోభము నలన జనించు యీ మచ్చల నృద్ధిక్షయములలో నొక విచిత్రసంఘటన యున్నది. వదకొండు సంవత్సరములకొకసారి మచ్చలనేకములుగా నుద్భవించి మండలమధ్య రేఖమీద బానులుదీర్చి కొద్దిరోజులుమాత్రముండి తరువాత తలోవైపుకు వికావికలై నర్దుకొనిపోవుట తటస్థించుచున్నది. నగ్నదృష్టి కగోచర మైన యీ మార్పు భూమండలముమీద అనేకోపద్రవములను సంఘటింపజేయుచున్నది. ఇందు ముఖ్యమైనది సూదంటురాళ్ళ నిర్వీర్యత. మండలమధ్యరేఖమీద మచ్చలున్న సమయమున సూదంటురాళ్ళు ఉత్తర దక్షిణములను సూచింపక చుట్టును తిరుగును. ఇట్టి పరిస్థితిని సూదంటురాళ్ళ సంక్షోభమని యందురు. దీనినిబట్టి యోచించగా భూగర్భములో ధ్రువాద్ధ్రువవర్యంతము నిలువుగా వ్యాపించియున్న సూదంటుశక్తి విచ్ఛిన్నమగుచున్నదని తెలియుచున్నది. ఈ మచ్చల యుపద్రవమువలన సూర్యభూమండలముల పరస్పరాకర్షణ బహిష్కరణ కార్యములలో సంక్షోభజనకములైన మార్పులు కొన్ని కలుచున్నవని తెలియుచున్నది. అంతేగాక మచ్చల యుపద్రవసమయ మందు 'రేడియో' లు సరిగా పనిచేయవు. దీనికి కారణము భూమిని చుట్టియున్న వాతాపరణముపైన మరొక అనరణ దానిచుట్టును ఆవరించియున్నది. దీనిని 'ఎనోస్పియర్.' అందురు. 'ఎనోస్పియర్' యందు కొన్ని స్పందనములు కల్లోలపరిస్థితులు కలుగుటచేత అది

సరిగా ఘనీకెరటములను ప్రతిబింబింప నేరకుండును. అందుచే రేడియోలు సరిగా పనిచేయవు. 1941 అక్టోబరు నెలలో నిట్టి మచ్చల యుపద్రవమును, దానిపెంబడి రేడియోలు పనిచేయకపోవుటయును గల్గినవి. ప్రపంచమందంతటగల రేడియోసంభాషణ లన్నియు నొక్కసారిగా అడ్డిపోవుటచే దీనిని గురించి యతితీవ్రపరిశోధనలు సాగించిరి. వాటి పర్యవసానముగా నిట్టి నిశ్చేష్టతకు కారణము సూర్యునిలో కల్గిన మచ్చల యుపద్రవమును నిర్ణయమునకు వచ్చిరి.

ఈ మచ్చల యుపద్రవమునలన భూమిమీదగల వృక్షములు పెరుగుటలో కొన్ని యాటంకములు సంభవించుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఎత్తైన పర్వతములమీద పెరుగు “పైనస్” అని పిలువబడు వృక్షములలో కొన్ని మాపులు గుర్తించిరి. పెద్దనూనులన్నియు వర్షమున కొకసారి చుట్టను తొడుగువలె దారువు నుత్పత్తి జేయుచుండును. ఒకవ్రూనిని అడ్డముగా రంపముతో కోసినచో ననేక వలయములను గుర్తింపవచ్చును. వీటిని వార్షికవలయము లందురు. అనగా, నొక్కొక్కసంవత్సరమున కొక్కొకవలయమునకు సంబంధించిన పెరుగుదల కలుగుచుండును. అందుచేత నడ్డముగా కోయబడిన యేవ్రూనునైనను పరిశీలించి యీ వార్షికవలయములను లెక్కించినచో నావృక్షముయొక్క వయస్సు చెప్పవచ్చును. పైనస్ అను వ్రూనునందు రెండువలయములు గలసి యొక సంవత్సరపు పెరుగుదలగా గుర్తించవలయును. ఈ చెట్లు పెరిగెడి ప్రదేశములలో శీతకాల మెక్కువ చలిగానుండి పెరుగుదలకు నవరోధము కల్గించును. అందుచే స్వల్పమందముగల వలయము లీ శీతకాలమునను, చెట్ల కనుకూలకాల మందు యెక్కువ మందముగల వలయములను పొందుచుండును. పైనస్ చెట్లలోనున్న వలయములు చిన్నవి, పెద్దవి యొకదాని తరువాత యొకటి యుండును. అందుచే ఒక చిన్నవలయము, ఒక

పెద్దనలయము గలసి యొకసంవత్సరము పెరుగుదలగా భావించవలసి యున్నది. ఎత్తైన వర్షతములకాద నున్న యొకపెద్ద 'పై నస్' ప్రాను నడ్డిముగా కోసిచూడగా సది 40 సంవత్సరముల ప్రాయముగలదని వార్షికవలయములను లెక్కించుటవలన తెలిసినది. ఈ వార్షికవలయము లలో 11 సంవత్సరముల కొకసారి బహుసన్నని వలయము గుర్తింపబడినది. ఆ ప్రమాదయం దిట్టి స్వల్పమందముగల వలయములు సూచు మాత్రమే యున్నవి. ఈ విషయమునుగూర్చి పరిశీలించినచో పూర్వని యందుగల మచ్చల మువ్వవమున కనుగుణముగ వృక్షజాతు లలో మాపులు సంభవించుట కవకాశ మున్నదని తెలియుచున్నది. మాపు లింకను యే యే నిధములుగా సంఘటింపబడుచున్నవో తెలియుటకు భవిష్యత్ పరిశీలనలే ఆధారములు.

ఎర్రమానకాలములో బృహదగ్నిపీండముగా గోచరించు భాను మండలమందు గల వస్తువిశేషములను కొంతవరకు తెలుసుకొనుట కవకాశ మున్నది. తేజోవిమర్శకయంత్ర సహాయమున బరిశీలించగా, నువరిభాగ మందున్న తేజోవాయువునందు ఉదజని, యినుము, నికెలు, కోబాల్టు, సిలికా, బోర, సోడియమ్, పొటాసియమ్, కాల్షి యమ్ మొదలైన లోహములు తమ తమ వాయురూపమున నున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఒక్కొక్క వస్తువునుండి వచ్చినకాంతిని విమర్శించి నచో నొక ప్రత్యేకతీయన నుండును. కాంతిపటమును బట్టి వస్తువును గుర్తించుటకు వీలున్నది. అందుచేత పై నుదాహరింపబడిన వస్తువులను వాటికాంతి నుండి గుర్తింపగల్గిరి. భూమండలమం దింతవరకును 98 మూలవస్తువులు గుర్తింపబడినవి. మూలవస్తువులనగా, తమలో మరి యే యితర వస్తువులేని యొకే యొకనస్తువు; ఇందు కుదాహరణముగా యినుము, వెండి, రాగి, బంగారము, పాదరసము మొదలైనవి తీసు కొననచ్చును. ఇటువంటి 98 మూల వస్తువులు, వరస్పరమును గలసి

మిశ్రమ వస్తువు లనంతముగా నేర్పడుటవలన భూమండలముమీఁది సృష్టియంతయు నేర్పడియున్నది. సూర్యమండలమునుండియే భూమి యుత్పత్తికెంది యుండుటచే నీ మూలవస్తువులు సూర్యమండలమున గూడ యుండియుండవలయును. కాని యవన్నియు గుర్తింపరామిఁ గారణ మవి యింకను సంఘటింపబడకుండుటయే. ఈ వస్తువు లెట్లు సంఘటింపబడునో ముందుప్రకరణమందు విపులముగా చర్చింపబడును.

ఇంతవరకును గుర్తించిన లోహములు, తదితర మూలవస్తువులు గాక మిగిలిన వాయువదార్థములో సర్వ మూలవస్తువులు నిర్గూఢ స్వరూపమున నున్నవి. అదెట్లనగా, ఒక వస్తువు సంఘటింప బడినప్పుడే దానికి బరువు, ఆవరణ, రూప, రస, గంధములు గల్గు చున్నవి. అది ఉత్పత్తి కానప్పు డీగుణములు లేక నిర్గూఢ స్వరూపముగా నున్నది. ఏ లోహమైనను అణువులచేత నిర్మింప బడుచున్నది. ఈ అణువులనుగూడ విభజించినచో యిక విభజంప నీలుగాని పరమాణువులు జనించును. ప్రతిమూలవస్తువు 2, 3, 4, పర మాణువులతో నిర్మింపబడిన అణుసముదాయమైయున్నది. ప్రతివస్తువు నకును ఒక్కొక్క ప్రత్యేకగుణగతములుగల పరమాణువుండును. అనగా 98 మూలవస్తువులకును 98 వివిధరకములైన పరమాణువుల స్వరూపము లున్నవి. అందుచేత పరమాణువులు సంఘటింపబడినచో నా వస్తువు సృష్టింపబడినట్లే. నవీనపరిశోధనలవలన పరమాణువుల స్వరూపము తెలియుచున్నది. ప్రతిపరమాణువు రెండుతరగతుల విద్యు దణువులకూడిక యని తెలియుచున్నది. ఇందు మొదటితరగతి విద్యు దణువులను ప్రోటాన్స్ అనియును, రెండవతరగతి విద్యుదణువులను 'ఎలక్ట్రాన్స్' అనియు నందురు. మొదటితరగతి అణువులయం దను కూల విద్యుచ్ఛక్తియు, రెండవతరగతి అణువులయందు ప్రతికూల విద్యుచ్ఛక్తియు కలవు. ఆకారణమున నారెండుతరగతుల అణువులు

ఒకదాని నొకటి యాకర్షించును. ఒకే తరగతికి జెందిన రెండు విద్యుదగువు లెన్నడును పరస్పర హాఠ్షంపింపఁజచ్చు. అంతేగాక అవి యొక దానినొకటి ఆహిష్కరించును. ఒక పరమాణువునం గొకటిగాని, కొన్ని గాని అనుకూల విద్యుదగువులు కేంద్రముగానుండి వాటిచుట్టును ప్రతి కూల విద్యుదగువులు ఒకటిగాని మరికొన్నిగాని అభివేగమున తిరుగు చుండును. మొత్తమువిగాద అనుకూలవిద్యుదగువులకు యేమియు భేదములేదు. అనగా 98 మూలవస్తువులందు గల పరమాణువులలో నున్న ప్రతికూలవిద్యుదగువులు ఒకేతరగతికి జెందుటేగాక వాటిలో భేదమేమియు నుండదు. అట్లే అన్ని పరమాణువులలో నున్న ఎల క్త్రాన్నికను భేదము లేదు. మూలవస్తువులలోని వివిధ తరగతుల భేదములు, వాటి సమ్మేళనసంఖ్యనలన నేర్పడుచున్నవి. ఈ విషయ మును గూర్చి ముందు ప్రకరణమున విపులముగా తెల్పియున్నాను.

సూర్యునిలో చాలవరకు తేజోవాయువునందు ప్రోటాన్సు, ఎల క్త్రాన్సు పరమాణువులుగా సంఘటింపబడని స్థితిలో నున్నవి. అట్టి పరిస్థితిలో వాటికి తేజస్సు, ఉష్ణముగూడ చాల అధికముగానుండును. క్రమముగా చల్లరినపిదప కొన్ని ప్రోటాన్సు చలనము మాని స్థాణు వుగానుండి వాటిచుట్టును కొన్ని ఎలక్త్రాన్సు నాకర్షణబలిమిని త్రిప్పు కొనుచుండును. అట్టి చక్రమే యొక పరమాణువు. ప్రస్తుత సూర్య పదార్థములో విడివిడిగా ఎలక్త్రాన్సు, ప్రోటాన్సు శరవేగమున నటు నిటు సఖముఖములకు పర్యటించుచున్నవి. గుర్తించబడిన యినుము, నికెల్, సోడియము మొదలైనవాటికిమాత్రమే పరమాణువు లేర్పడిన వని తెలియుచున్నది. విద్యుదగువుల కన్నింటికి నీ గుణములు సమానమే గనుక మూలవస్తువులన్నియు వాటి పూర్వరూపమైన విద్యుదగు సముదాయముగా నున్నవని చెప్పవలయును. విద్యుదగుసముదాయ ముగా నున్నచో 98 ప్రత్యేక మూలవస్తువుల గుణములు గానరావు

గాన యీ వస్తువులు వాటి నిర్మాణస్వరూపములో నున్నవని తాత్పర్యము.

సెబ్యులస్ స్థలయం దున్న తేజోవాచుతత్వముగూడ ఇంతే. పరమాణుస్వరూపమును జెందని ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క సముదాయమై యున్నది.

ఇట్టి సరిసిగ్నిలోనున్న సాగర్వమండలమునుండి సాగర్వములుంబయ్యెన బుధాదిగ్రహముల యుత్పత్తివిధానమునుగూర్చి చాలోచించితిము.

జీన్సు సిద్ధాంతము

కోట్లకొలది సంవత్సరములకు బూర్వము ప్రస్తుతము తన చుట్టును తిరిగుచున్న బుధాదిగ్రహకుటుంబము లేక సాగర్వ డొక్కడుమాత్రమే యుండి తన యక్షిమఃమీద అతివేగమున దిరుగుచుండెడివాడు. అప్పు గీంతటికంటె మిక్కిలి తేజస్సును, ఉష్ణమును, పరిమాణమును, వేగమును గల్గియుండెను. ఆత్మప్రదక్షిణ వేగ మత్యధికముగా నుండిన కారణమున కేంద్రబహిష్కరణశక్తి యుత్కృష్టముగానుండి, కేంద్రాకర్షణశక్తితో యించుమించుగా పోటీచేయగల్గియుండెడిది. మధ్యనున్న వాయువు కుడింపబడి ద్రవముగామారిన పిదప కేంద్రాకర్షణశక్తి బహిష్కరణశక్తిని మించి కొద్ది బలముగా నుండుటచే మండలమందుగల పదార్థమునుమాత్ర పూవలకు బోనీయక మండలముగల గోళాకృతి చెడిపోకుండ యరికిట్టుట కల్గుచుండెడిది. అప్పుడు వర్తమానకాలమందు గన్పించు నల్లని మచ్చలు యుత్పత్తిజెందియుండవు. మండలమంతయు సాంద్రతలో నందందు కొన్ని తారతమ్యములు కలిగియున్నను చాల వరకు వాయువ్యవస్థయందే యుండెను.

అట్టి సరిసిగ్నిలో రవిమండలముకంటె యనేకరెట్లధికమైన మరొక తేజోమయగోళము సూర్యునికి దగ్గరగా వచ్చుట సంభవించెను.

(10 న పటము చూడుడు) పటములో చూపినమాదిరిగా ఆగంతుకమగుట వచ్చిన ఆ దొడ్ల గోళము తనదారిని తాను ఋజువుగా పోయెను. ఒక బిందువుకు కొంతదూరములో నొక సరళరేఖ గీచినచో నా రేఖ బిందువు నకు క్రమముగా దగ్గరకు వచ్చి తిరిగి క్రమముగా దూరమునకు పోవును. అట్లే యీ పెద్దగోళముకూడ సరళముగా నున్న దారినిపోవుకది సూర్య మండలమునకు క్రమముగా సన్నిహితమగుచు వచ్చినది. అప్పు డీ రెండు గోళములు నొకదాని నొకటి యాకర్షింపగాగినవి. ఆగంతుక గోళము పెద్దది యగుటచే నది సూర్యునిచేత పూర్తిగా ఆకర్షింపబడుట యసంభవము. అతిదూరమున నున్న సూర్యమండలము కూడ పూర్తిగా నాకర్షింపబడుటకు సావకాశము లేక పోయినది. కాని మాదిరిపింజముమాదిరిగా సూర్యమండలమునకు పై భాగమున నున్న తేజోవాయువు కొంతభాగము ఆకర్షణకు లోబడినది. పెద్దగోళము క్రమముగా దగ్గరకువచ్చునప్పు డీ పదార్థము మండలమును వీడి యుపరిభాగమం నొక బాడిపె మాదిరిగా వచ్చి చేరినది. పెద్ద గోళము దూరముగానున్నను, దాని కేంద్రాకర్షణ శక్తి సూర్యమండలపు కేంద్రాకర్షణ శక్తిని మించుటచే, సూర్యునిలోని కొంత వాయువపదార్థ మావలకు వచ్చినది. ఆగంతుక గోళము తన మార్గమునందు సూర్యునికి మిక్కిలి సన్నిహితముగా వచ్చునరికి సూర్యునిలోనుండి యాకర్షింపబడిన తేజోవాయువు పూర్తిగా యీవలకు లాగబడినది. పెద్దగోళము తన మార్గమున బోవుటచే క్రమముగా దూరమగుచుండెను. అందుచేత ఆకర్షణశక్తికూడ బలహీనమై యీవలకు లాగబడిన తేజోవాయువును పూర్తిగా తనలోనికి ఆకర్షింపక అచ్చటనే యుంచిపోయెను. తన యాకర్షణశక్తికి మించినదూరమున కీ తేజోపింజము లాగబడియుండుటచే సూర్యుడు కూడ దీనిని తిరిగి తనలోనికి లాగునొనలేకపోయెను. అందుచేత

గాన శ్రీవాగ్మిపింజ మొక పొగచుట్ట యాకారముగానుండి సగ్మ్యుని తాడుట్టును తిరుగుట కారణించెను. తేజఃపింజ మిరువంకల సన్నగిలి మధ్యన మండముగానున్నది. శంఖేగమఃతో బోయెడి యాపెద్దగోళము సూర్యుని, తానాకన్వించిన సగర్వపదార్థమును విడిచి యచిరకాలములో విశేషసూర్యముగా బోయెను. అంతియగాక తిరిగి మరెన్నడును యింత చక్క యిటువచ్చుట తలస్థించలేదు. అది యట్లు నచ్చుచుండినచో సగర్వకుటుంబము విచ్చిన్నమై యుండెడిది. ముందెన్నడైనను నా విధముగ నచ్చుచో భూమండలముమీది సృష్టి పూర్తిగా నశించిపోవును. భూమండలమేగాక చిన్న యితర గ్రహగోళములుగూడ భిన్న భిన్నములై రేబవులుగా మారిపోవును. ఇట్టి ప్రమాదఫలితమును శనిమండలమున ప్రత్యక్షముగా జూడవచ్చును. శనిమండలమున కనేక చిన్న చిన్న చంద్రులు కలరు. అంగోక చంద్రమండలము శనిమండలమునకు సమీపమునకుగా ఆకన్వించి భిన్న భిన్నములై పోయినది. ఈచిన్న చిన్న తునుకలన్నియు శనిమండలముచుట్టును నొక వట్కూవలె యాసరించుముండి శనినలనే యాత్మప్రదక్షిణము చేయుచున్నవి. అందుచే దుర్బిణిలో చూచినప్పుడు శనిచుట్టును తెల్లని యుంగరములు చుట్టియున్నట్లు కన్పించును.

ప్రతి గోళము తన వ్యాసమునకు 2.5 కి రెట్ల మైళ్ళ దూరములో గల గోళమును పూర్తిగా ఆక్వరింపగల్గుచున్నది. అంతకంటె ఎక్కువ దూరమున నున్నచో ఆక్వరింపనేరదు. మన చంద్రు డట్టి ప్రమాదమునకు లోబడజాలవన్న భూమికి సుమారు 20,000 మైళ్ళ సమీపమునకు రావలసియుండును. ప్రస్తుతము 2 లక్షల యాల్ప మైళ్ళ దూరములో నుండుటచే నట్టి ప్రమాదసంఘటన కొన్ని కోట్ల సంవత్సరములకు గాని రానేరదు. గురుమండలము చుట్టును దిరుగు నొక యువ గ్రహమండల మతి సమీపమునకు వచ్చుచుండుటచేత కొన్ని వందల

సంవత్సరములకే నా చిన్నగోళములు చక్కరింపబడి ప్రవలగుట జరుగగలదు.

రైలుబండి స్టేషనులో నిలిచి, చున్నపు యొకనాయుని కిటికీలోనుండి యానలకు వైచిసెచో నది ప్లాట్ ఫారమువీచినచో త్రోసివేయబడిన చోటును కెదురుగా నగడే యుండును. బండి బయలుదేరి యొక మైలు నడిచినతర్వాత అది వేగముగా బోవునప్పుడు నాయుని కిటికీలో నుండి క్రింద పడివైచిసెచో నది పడిగానే రైలు బోవుచున్న దిశ నే కొంతనినకు నొల్ల సిమ్మట నేలమీదగల యాటంకములనలస త్రోసి వేయబడ్డ స్థలమునకు 10, 15 గజముల ముందు ఒకచో నాగును. ఏలన, బండి వేగముగా బయటెత్తునప్పు డందుగల నమిస్తునస్తువులు బండియొక్క వేగమును కలిగియున్నవి. ఆ వేగము నస్తువులు బండిలో నున్నంతనినకు కన్పించదు. అందలి యే నస్తువునైనను హఠాత్తుగా బండి న్యతిరేకస్థలములో నుంచినచో దాని వేగము వెంటనే న్యక్త మగుచున్నది. అట్లే సాగ్యన్యతిరేకస్థలములోనికి నాకర్షితమైన సూర్య పదార్థము, సూర్యమండలము యొక్క ఆత్మప్రదక్షిణ వేగమును గల్గి యున్నది. అందుచేత పొగచుట్ట యాకారముగా నుండియున్న పదార్థము సూర్యునిచుట్టును దిరుగుచుండెను. స్థాగు (Inertia) న్యాయ ప్రకార మది యే యాటంకములు లేనిచో నట్లు సర్వదా తిరుగుచుండ వలెను. స్థాగున్యాయ మనగా ఒక అచలమైన స్థితిలో నున్న నస్తువు యెన్నరిచేత కదపబడక యే శక్తిచేత ఆకర్షింపబడక ఉన్నచో నట్లే చలించక శాశ్వతముగా నుండుట. ఆలాగుననే చలించుచున్న యే నస్తువైనను, తన చలనమున కాటంక మేవిధముగాను రానిచో శాశ్వతముగా ప్రాతిపదికలోని వేగముతోనే చలించుచుండును.

పొగచుట్ట యాకారముగానున్న తేజోవాయువు మూడువంపలకోట్ల మైశ్య పొడివున వ్యాపించి యుండెను. కొంతకాలమున కిందు ఇంచు మించుగా సమానహారములం దాకర్షణ కేంద్రము లేర్పడెను. (11వ పటము చూడుడు.) కొన్ని వేలసంవత్సరములలో ఈ కేంద్రముల చుట్టు నొకటిన్నరకోటి మైశ్యహారమునకు పలచగా వ్యాపించియున్న తేజోవాయు వాకర్షణకేంద్రకేంద్రకరింపబడినది. గుండ్రముగా తిరిగిడి చలనముచలన కేంద్రకృతమైన యీ తేజోవాయువు బంటి యాకారమును పొందెను. ఈ యాకర్షణకేంద్రములు సూర్యమండలమునుండి ఋజువుగా నొకే సరళరేఖయందు 4 కోట్లమైశ్య కొకటి, 7 కోట్లకు రెండవది, 9 కోట్లకు మూడవది, సుమారు 12 కోట్లకు నాల్గవది, ఈవిధముగా సమానాంతరములలో నేర్పడినవి. కేంద్రముచుట్టును పలచగా విస్తరించినది, దగ్గరగావచ్చి దట్టముగా నొక యుండయాకారమును పొందెను. (11 వ పటము చూడుడు.) పొగచుట్ట యాకారముననుండిన తేజోవాయు విరువంకల సన్నముగానుండి మధ్యభాగమందు మందముగా నుండియున్నదని తెల్పియున్నాను. ఆ కారణమున సన్నగా నున్నచోట్ల తక్కువగను, మందముగానున్నచోట్ల యెక్కువగను యీ తేజోవాయు వుండుటచే నది కేంద్రకరింపబడి యుండలుగా మారినప్పుడు మొదట కొన్ని చిన్నగోళములు, క్రమముగా గోళములు పెద్దనయి, మధ్య మంద మెక్కువగుటచే నన్నిగోళములకంటె పెద్దగోళము సంఘటించుటయు, తిరిగి కొనను చుట్ట సన్నముగానున్న కారణమున గోళములు గూడ చిన్నవియగుట కల్గినది.

ఈ విధముగా సంభవమైన యగ్నిపిండములు సూర్యునకు 4 కోట్ల మైశ్యలో నొకటి బుధుడు, రెండవది 7 కోట్లమైశ్యలో శుక్రుడు, మూడవది 9 కోట్లమైశ్యలో భూమి, నాలుగది కుజుడు 16 కోట్ల మైశ్యలోను, 22 కోట్ల మైశ్యలో నొకమండలము, 28 కోట్ల మైశ్యదూరమున

అన్నిటికంటె పెద్దమండలమైన గురుకు, 52 కోట్ల మైళ్ళ దూరమున 7 నెలలుగు శనిమండలము, 100 కోట్లలో యురేకస్, 196 కోట్లలో న్యూట్యూన్, 384 కోట్ల మైళ్ళ దూరమున ప్లూటో అను గోళములున్నవి. ఇందు కుజునిరకు గల గోళములు యించుమించు సమానాంతము గల్గి యున్నవి. అట్లుపైన దేర్పడిన గోళములు అగమదూరములలో నేర్పడినవి. ఆకర్షితమైన పొగచుట్ట ఆకర్షణిగనున్న తేజోపింజము మధ్య యుండుకొనున చలనరీతిగానున్నచుటకు తాత్కాలముగా నున్న గోళములకంటె యనేకకాలము పెద్దదైన గురుమండలము సూర్యకుటుంబమునకు మధ్యస్థముగా నున్నది. (11 వ పటము చూడుచు.) ఈ విధమున నేర్పడిన మండలములన్నియు స్థాగున్యాయము ననుసరించి తమ పూర్వవేగమును గోల్పోక ఆత్మప్రవక్తికాలమును, సూర్యప్రదక్షిణమును చేయసాగినవి.

కుజు, గురు మండలములమధ్య సూర్యునకు 22 కోట్ల మైళ్ళ దూరములో సనేకనందల చిన్నమండలము లొక గుంపుగాచేరి, యితర గ్రహములవలెనే యాగుంపుగూడ సూర్యునిచుట్టును చిరుగుచున్నది. ఈ గుంపుస్థానములో నిగినర కొక పెద్దగోళముండెడిది. అది వక్రగతిని బడి గురుమండలసమీపమునకుగాగా నారెండును డికోనుటచేత నది బ్రద్దలయిపోయి చిన్న చిన్న గోళములగుంపుగా మారినది. అట్లు పగులగొట్టబడిన చిన్న ముక్కలుగూడ తమకక్ష్యయందు మాత్రమండలము ననుసరించుచున్నవి. ఈ గుంపులోని మండలముల నన్నింటిని గుర్తించి మే మేమే పేర్లను పెట్టియున్నారు. 'సికో' అను మండలము గుంపులోనున్న అన్నిటికంటెను బెద్దది. దీనివ్యాసము 480 మైళ్లు. మిగతగోళములు మిక్కిలి చిన్నవని తెలియుచున్నది. మొత్తము పది గోళములలోను, భిన్నీకృతమైన యీ గోళము మినహా మిగిలిన తొమ్మిది గోళములు నేటివరకు సూర్యునిచుట్టు ప్రదక్షిణము చేయచున్నవి. ఇం దాఖరి గ్రహమైన ప్లూటో, సూర్యునకు 384 కోట్ల మైళ్ళ

హారమున నుండుటచే, ప్రాతిపదికలో నాగంతుకముగావచ్చిన పెద్ద గోళము సూర్యునికి సుమారు 400 కోట్ల మైళ్ళదూరములో నుండిపోయి యుండునని యూహింపవలసియున్నది.

సూర్యకుటుంబమున కంతకు సమాచయమైన ప్రదక్షిణకాల మొకప్పుడుండియుండుటకు ఈ సిద్ధాంతము గానకాశ మిచ్చుచున్నది. దీనినిబట్టి యూహింపగా నొకప్పుడు సర్వగ్రహములు కేవలరాశిలోనుండి బయలుదేరిన వను హిందూకృత్తిషసిద్ధాంతాభివ్రాయము బలపడుచున్నది. కాలక్రమమున కనుంబములోని గ్రహమండలములకు వాటి దిన (స్వప్రదక్షిణకాలము) సంవత్సర (సూర్యప్రదక్షిణకాలము) పరిమాణములలో కారతమ్యము లేర్పడినవి. ఈ కారతమ్యములకు కారణములు రెండు : అందు మొదటిది ఖటుంబములోని 10 గ్రహములు సమానగోళములు గాక చిన్నవి, పెద్దవియై యుండిన కారణమున గమన వేగములలో భేదము గలుగుచున్నది. రెండవ కారణము వాటివాటి కక్ష్యలయొక్క దూరములలో భేదము. అన్నిటికంటెను బుధుని కక్ష్యచాల చిన్నది. క్రమముగా శుక్రుడు, భూమి, కుజుడు, గురుడు మొసలైనవాటి కక్ష్యలు పెద్దవగుటచే వాటి సంవత్సరములు పెద్దవయియున్నవి. ఈ గ్రహములు, వాటి విశేషములనుగురించి తెలుసుకొనుటలో వ్రస్తుతము పరిశోధనలు జరుగుచున్నవి. తెలిసినంతవరకు నిందు వివరించుచున్నాను.

సూర్యకుటుంబము

1. బుధుడు :— ఈ మండలము సూర్యునకు 3 కోట్లమైళ్ళ దూరమున నున్నది. దగ్గరగా నుండిన కారణమున సూర్యుని వేడి యొక్కవగా ప్రసరించుచుండుటచేత ఈ మండల మింకను జల్లబడలేదు. దీని వైభాగమందు గల ఉష్ణోగ్రత 350°C దిగ్గ్రలు. ఈ వేడికి సీసము కరిగి ద్రవరూపమున నుండును. అందుచే మండలము గట్టిపడక ఇంకను

కొంతి ద్రవముగాను, వాయుస్వరూపముగాను ఉండవచ్చును. భూమిపై నీటి జీనస్పృష్టియందు ఉంటే కేవలమును సావకాశము లేదు. బహు చిన్నగోళముగలచే నాకర్షణశక్తి లక్షణముగా నుండిన కారణమున, చుట్టును వాతావరణమును నిలబెట్టలేని స్థితిలో నున్నది. దీని వేగముగూడ చాలనరకు తగ్గినది. తనచుట్టును తాను తిరుగుటకు 88 రోజుల కాలము పట్టుచున్నది. సూర్యుని చుట్టించుటకు గూడ అంతేకాలము పట్టుచున్నది. ఇది పూర్తిగా చల్లని గడ్డగట్టి యా గడ్డగిదాద జీనస్పృష్టి ఉద్భవించుటకు యింకను కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు పట్టును.

2. శుక్రుడు :— బుధమండలముకంటే నీ మండలము చాల నరకు చల్లబడి ఉపరిభాగమంతయు గడ్డగట్టి యున్నది. ఈ మండలము తన చుట్టును తాను తిరుగుటకు 20 రోజులకాలము పట్టుచున్నది. దీని సంవత్సరపరిమాణము 7½ మాసములు. మండలము చుట్టును మేఘములు గరుచుగా నానరించియుండును. రెండు ధ్రువముల యందును కొంతకాలము బహుతెల్లగా కన్పించి, పిదప లేని మచ్చలు క్రమముగా నల్లనగుచుండుటచేత నీ ప్రదేశములందు శీతకాలములో మంచు గడ్డకట్టియుండి వేసవిలో కరిగి నీరయి ప్రవహించి పోవుచున్నదని తెలియుచున్నది. అందుచేత నీ మండలమందు ఋతువు లేర్పడి యుండ నచ్చును. పరిమాణములో శుక్రుడు యింపుమించు భూమితో సమానముగా నున్నాడు. ఈ మండలము ప్రతిబింబించు కాంతినలన నిందు పర్యతములు, లోయలు, సముద్రములు ఉన్నట్లు తెలియుచున్నది. దీని యుపరిభాగమందుగల ఉష్ణోగ్రత — 25° ఉండును. వాతావరణమునందు ప్రాణవాయు నంత యెక్కువగా నున్నట్లు సూచనలు లేవు. ఆ కారణమున జీనస్పృష్టి యుండుటకు సావకాశములు కాన్పించవు.

హారమున నుంచుటచే, ప్రాశిష్యకలో నాగంతకముగాంచిన పెద్ద గోళము సూర్యునికి సుమారు 400 కోట్ల మైళ్ళ దూరములో నుండిపోయి ముంచునని యూహింపవలసియున్నది.

సూర్యకుటుంబమున కంతకు సమానమైన ప్రదక్షిణకాల మొకప్పుడుండియుండవలసియున్నది. కాని కాళ మిచ్చుచున్నది. దీనినిబట్టి యూహింపగా సూర్యకుటుంబములకు సూర్యగ్రహములు పేష కాళలోనుండి బయలుదేరిన నను హిందూశ్యాతిషస్థాంతాభివ్రాయము బలపడుచున్నది. కాలక్రమమున కుటుంబములోని గ్రహమండలములకు వాటి దిన (స్వప్రదక్షిణకాలము) సంవత్సర (సూర్యప్రదక్షిణకాలము) పరిమాణములలో తారతమ్యము లేర్పడినవి. ఈ తారతమ్యములకు కారణములు రెండః అందు మొదటిది కుటుంబములోని 10 గ్రహములు సమానగోళములు గాక చిన్నవి, పెద్దవియై యుండిన కారణమున గమన వేగములలో భేదము గలుగుచున్నది. రెండవ కారణము వాటివాటి కక్ష్యలయొక్క దూరములలో భేదము. అన్నిటికంటెను బుధుని కక్ష్య చాల చిన్నది. క్రమముగా శుక్రుడు, భూమి, కుజుడు, గురుడు మొదలైనవాటి కక్ష్యలు పెద్దవగుటచే వాటి సంవత్సరములు పెద్దవయియున్నవి. ఈ గ్రహములు, వాటి విశేషములనుగురించి తెలుసుకొనుటలో ప్రస్తుతము పరిశోధనలు జరుగుచున్నవి. తెలిసినంతవరకు నిందు వివరించుచున్నాను.

సూర్యకుటుంబము

1. బుధుడు :— ఈ మండలము సూర్యునకు 3 కోట్లమైళ్ళ దూరమున నున్నది. దగ్గరగా నుండిన కారణమున సూర్యుని వేడి యొక్క వగా ప్రసరించుచుండుటచేత ఈ మండల మింకను జల్లుబడలేదు. దీనిపై భాగమందు గల ఉష్ణోగ్రత 350°C డిగ్రీలు. ఈ వేడికి నీనము కరిగి ద్రవరూపమున నుండును. అందుచే మండలము గట్టిపడక ఇంకను

కొంతి ద్రవముగాను, వాయువ్యవస్థలోను గూడ ఉండెను. భూమిచివనలె జీవసృష్టియందుకు కేంద్రాక్షమును సావకాశము లేదు. బహు చిన్నగోళముగుటచే నాకర్షణశక్తి కలహీనముగా నుండిన కారణమున, చుట్టును వాతావరణమును నిలబెట్టలేని స్థితిలో నున్నది. దీని వేగముగూడ చాలనవకు తగ్గినది. తనచుట్టును తాను తిరుగుటకు 88 రోజుల కాలము పట్టుచున్నది. సూర్యుని చుట్టెచ్చుటకు గూడ అంతేకాలము పట్టుచున్నది. ఇది పూర్తిగా చల్లబడి గడ్డగట్టి, యా గడ్డమీద జీవసృష్టి ఉద్భవించుటకు యింకను కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు పట్టును.

2. శుక్రుడు :— బుధమండలముకంటే నీ మండలము చాల వరకు చల్లబడి ఉపరిభాగమంతయు గడ్డగట్టి యున్నది. ఈ మండలము తన చుట్టును తాను తిరుగుటకు 20 రోజులకాలము పట్టుచున్నది. దీని సంవత్సరపరిమాణము $7\frac{1}{2}$ మాసములు. మండలము చుట్టును మేఘములు గరుచుగా నావరించుచుండును. రెండు ద్రవముల యందును కొంతకాలము బహుతెల్లగా కన్పించి, పిదప లేని మచ్చలు క్రమముగా నల్లనగుచుండుటచేత నీ ప్రదేశములందు శీతకాలములో మంచు గడ్డకట్టియుండి వేసవిలో కరిగి నీరయి ప్రవహించి పోవుచున్నదని తెలియుచున్నది. అందుచేత నీ మండలమందు ఋతువు లేర్పడి యుండ నచ్చును. పరిమాణములో శుక్రుడు యించుమించు భూమితో సమానముగా నున్నాడు. ఈ మండలము ప్రతిబింబించు కాంతినలన నిందు పర్వతములు, లోయలు, సముద్రములు ఉన్నట్లు తెలియుచున్నది. దీని యుపరిభాగమందుగల ఉష్ణోగ్రత — 25° ఉండును. వాతావరణమునందు ప్రాణవాయు వంత యెక్కువగా నున్నట్లు సూచనలు లేవు. ఆ కారణమున జీవసృష్టి యుండుటకు సావకాశములు కాన్పించవు.

3. భూమి :- ఇది సూర్యునికి తొమ్మిదికోట్ల మైళ్ళు దూరమున నున్నది. వ్యాసము 8 వేల మైళ్ళు. దీని పై భాగమందున్న ప్రదేశములో 71 పాలు సముద్రమును, 29 పాళ్ళు నేలయు కలిగి యున్నది. ఉపరి భాగమందుగల వాతానరణము సుమారు 100 మైళ్ళు నరకు వ్యాపించి యున్నది. వాతానరణమందు ప్రాణవాయు వయినదియు; అసగా నూటికి 20 పాళ్ళు. శేషించినది నత్రజన. నియక్, ఆయక్ అను గాలులుగూడ కొద్దిగా నుండును. ఆత్మప్రదక్షిణకాలము 24 గంటలు. సూర్యప్రదక్షిణకాలము 365 రోజులు. ఈ మండలమున కొక్కటియే యుపగ్రహము చంద్రుడు. చంద్రమండలపు వ్యాసము 2 వేల మైళ్ళు. దీని యుపరిభాగమందు మంచుగడ్డకంటె యెక్కువ చిల్లగా నుండును. చుట్టును వాతానరణము లేదు. అందుచే ప్రాణ వాయువు లేదని తెలియచున్నది. చంద్రమండలమును విపులముగా యుల్ల వ్వను జూడినప్పుడు, ఆ కారణమున మేఘములు, నీరు, లేనని తెలియచున్నది. వలన, నీరున్నచో మేఘములు ఉత్పత్తి జెందును. మేఘములున్నచో నామండలమును యెల్లప్పుడు స్వచ్ఛముగా వరి శీలించుటకు సానకాశమియ్యవు. దీనికి స్వప్రదక్షిణకాలము, భూప్రదక్షిణ కాలముగూడ 30 రోజులు. వేగము తగ్గిపోయి మెల్లగా కిరుగు చున్నది. పూర్ణిమరోజున చూచినచో నల్లని మచ్చలు కాన్పించును. ఈ మచ్చ లిందుగల పర్వతముల నీడలు. అహుసన్నిహితముగా నుండిన కారణమున నిందుగల పర్వతపంతులు, శిఖరములు, వాటియెత్తు, శైల్యములు గూడ తెలుసుకొనబడినవి.

4. కుజుడు (Mars) :- దీని నంగారకమండలమని గూడ వాడుదురు. ఇది భూమికంటె చాల చిన్నది. దీని వ్యాసము 4215 మైళ్ళు. భూమి కిది దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు మిక్కిలి యెఱ్ఱని బింబముగా గన్పట్టును. అంగారకుని దినప్రమాణము 24 గం. 37 నిమిషముల

231 నెకనులు. ఇంగ్లాండ్ భూమిపైనే చల్లబడి నక్షత్రగట్టిన యుండలము. భూమికంటెను కొన్ని లక్షల సంవత్సరములకు బూర్యము వ్రస్తుతము భూమినున్న పరిస్థితిలో నుండిన గోళము. మధ్యస్థభుజుండు 10C° ఉష్ణోగ్రత కలదు. భ్రువవ్రదేశములలో నెక్కువ చల్లగా నుండుటను బట్టి —70° C డిగ్రీలున్నవి. ఇచ్చట మంచ యెక్కువగా నుండును. ఈ యుండలమునకుగూడ చుట్టును వాతావరణ మున్నది. ఆ వాతావరణములో నూటికి 15 పాళ్ళు ప్రాణవాయువును, 5 పాళ్ళు నీటి యావిరియును గన్పించుచున్నవి. ఇందు వృక్షజాతులు, జంతువులు సృష్టింపబడి యుండవచ్చునని చాలమంది యూహించుచున్నారు. నల్లగ కప్పము మచ్చలన్నియు సరణ్యములై యుండవచ్చునని తోచుచున్నది. తీక్ష్ణవర్ణీనలలో బహుసన్ననిగీత లిందు గానవచ్చును. వాటిని కాలువలని పాడుకచేయుచున్నారు. కాని వాటినిగురించి వివ్రలముగా తెలుసుకొనుటకు సావకాశములు కన్పించుటలేదు. ఆ గీతలు పొసుగుపాటి నదులై యుండవచ్చును. ఈజిప్తు, లిబియా దేశముల మధ్యనున్న 'నైల్' నదివంటి నదులు గానవచ్చును. కుజయుండలమునకు సోయి, భూమిని దుర్భిణీలలో పరిశీలించినచో ఈజిప్తు ఫలనంతమైన దేశమగుటచే సరణ్యముచేత గప్పబడి నల్లగా కన్పించును. దాని ప్రక్కనే లిబియా యెడారి తెల్లగా నుండుటచే నీ రెంటిని వేరుకేయు గీత యొకటి గాన్పించును. అటువలెనే కుజునిలో కాల్బులుగూడ యెవారి, ఫలనంతప్రదేశముల మధ్య సరిహద్దుగీతలయి యుండకోపునని యూహించుచున్నారు. సర్వదా యెఱ్ఱనిరంగులో కన్పించుటకు కారణ మిందుగల యరణ్యములే యని భావించుచున్నారు.

అంగారకుడు సూర్యవదక్ష్మిణము చేయుటకు 687 రోజులు పట్టుచున్నది. ఈ గ్రహమునకు 'ఫోబోస్' 'డిమోస్' లను రెండు చంద్రులున్నవి.

ఇవి రెండును చాల చిరుతిగోళములు. మొదటిదాని వ్యాసము 10 మైళ్ళు. రెండవదాని వ్యాసము 5 మైళ్ళు. 'ఫాబోస్' అను చంద్రుడు కుజమండలమును 7 గంటల, 39 నిమిషములలో చుట్టి వచ్చును. అందుచేత కుజమండలమును సముద్రమునకు నూడుగార్లు ప్రవక్ష్యణము చేయుచుండును. మూడుగార్లు పశ్చిమదిశయం దుడయించట, మూడుగార్లు తూర్పుదిశయం దుడయించుట గలుగుచున్నవి. అంగారక మండలముకంటె సభివేగముగా భోవుచు దాని సభిక్రమించుటచేత పశ్చిమోదయము, తూర్పున అస్తమయము కలుగుచున్నవి. చిన్న గోళమగు 'ప్రోక' కుజప్రవక్ష్యణము 30 గం. 18 నిమిషములలో చేయుచున్నది.

కుజమండల విషయము చాలనరకు చల్లబడియున్నను, కొన్నికోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వము భూమివలె శీతోష్ణాదులను, వాతావరణమును, ప్రాణనాయువును, నీటియావిరిని కలిగియుండుటనుబట్టి యా మండలములో జీవసృష్టి విరివిగా యుండవలెనని తోచుచున్నది. కొంతకాల మా సృష్టి నడిచిన పిదప మండలము క్రమముగా చల్లబడుటచేత క్షీణించిపోవుటకు సావకాశ మున్నది. అందు మనుష్యులుండెడివారా, యెటువంటి జంతువులు, వృక్షములు ఉండెడివి అను సంశయము వినరముగా తెలుసుకొనుట చాల కష్టము.

5. భిన్నగోళపుంజము :— ఈ సముదాయములో నన్నిటికంటె పెద్దది 'సిరిస్'. దీని వ్యాసము 480 మైళ్ళు. ఇది గోళాకారముగా లేక అస్థాపక్రమముగా నుండుటచే నిది భిన్నమైన పెద్ద గోళములోని యొక పెద్ద పర్వతమని యూహించవచ్చును. నిరాధారముగా ఒక పెద్ద పర్వత మాకాశమందు తేలి కదులుచున్నచో యెట్లుండునో, అట్టి దృశ్యము దుగ్గిణీద్వారా దీనిని చూచినప్పుడు కలుగుచున్నది.

ఈ తోనుకకు కేంద్రాకర్షణశక్తి చాల బలహీనమైనది. ఇందుండి ఎవ్వరైనను ఒక రివాల్వరును స్ట్రెనిలువుగా పేల్చినచో విడుదలయిన రవ్వలు, గుండ్లు తిరిగి మండలమును చేరక విశాల బ్రహ్మాండములోనికి పోవును.

6. గురుమండలము (Jupiter) :- ఇది సూర్యకుటుంబములో నన్ని గోళములకంటె చాల పెద్దది. దీని వ్యాసము 88640 మైళ్ళు. దీని కేంద్రత సూర్యమండలము సమాదిగినే 1.34. పెద్దమండల మగుటచేత దీని యాత్మకప్రకృతి వేగము యింకను తగ్గక యతివిసురుగానున్నది. 9 గంటల 53 నిమిషములలో నిడి తన చుట్టును తాను తిరుగుచున్నది. దీనివాతావరణములోగూడ గంటకు 200 మైళ్ళవంటున బోయెడి ప్రవాహము లున్నవి. మండలము పైభాగమున పూర్తిగా చల్లబడి పోయినది. అందలి యుష్ణోగ్రత 140 డిగ్రీ లున్నది. ఉపరిభాగమందు గల మేఘములలో ననేకవాగుచు లున్నవి. అందందు బొగ్గు గూడ ఘనావస్థలోనున్నట్లు తెలియుచున్నది. మండల కేంద్రము ఘనీభవించిన యిసుము, యితరలోహములు గల్గి, మండలోపరిభాగము దళసరిగా మంచుగడ్డచే నావరింపబడి యటుపైన మిక్కిలి చల్లని వాతావరణముచేత కప్పబడియున్నది. దీనికి 5 చిన్నయుపగ్రహము లున్నవి. 12 సంవత్సరముల కొకసారి సూర్యుని చుట్టినచ్చుచున్నది.

7. శని :- ఇంచుమించుగా నీ మండలమును గురుమండలముతో సరి పోల్చినగును. దీని వ్యాసము 74,100 మైళ్ళు. దినవరిమాణము పదిన్నర గంటలు. ఇంత వేగముగా తిరుగు ప్రతిగోళమునకును కేంద్రబహిష్కరణ శక్తి బలీయముగా నుండును. దీని బహిష్కరణశక్తి కేంద్రాకర్షణ శక్తిలో 0.17 వంతున్నది. గురుమండలముకు గూడ నించుమించు తే యుండును. ఉపరిభాగమందుష్ణోగ్రత—150 డిగ్రీలు. గురుమండలము

నలెనే దీనిమధ్యయందుగూడ ఘనీభవించిన లోహములు గలిగి, పై భాగమున దళసరిగా మంచుగడ్డి మానరించుచున్నది. దీని వాతావరణమందు ఘనావస్థలోనున్న బొగ్గుకణములు మెండుగానున్నట్లు తెలియుచున్నది. దీని సూర్యప్రచక్షిణకాలము 80 సంవత్సరములు.

8. యురేనస్ :- ఇది కుజమండలమునలెనే చిన్నగోళము. సాంద్రత నీటికి 1.27 లెట్లున్నది. దీని ఉపప్రమాణము సుమారు పదకొండు గంటలు. శనిమండలముకంటె నిది యెక్కువగా చల్లబడియున్నది. పై భాగమున గల ఉష్ణోగ్రత 200 డిగ్రీలు. గోళముయొక్క లోతత్వము శని మండలము మాదిరిగానే యుండును. సూర్యుని చుట్టి వచ్చుటకు శనిమండలముకంటె చాల యెక్కువ కాలము పట్టును.

9. నెప్ట్యూన్ :- ఇదిగూడ అన్నివిషయములలోను యురేనస్ మాదిరిగా నుండును. గోళముయొక్క స్థూల్యతగూడ యించుమించుగా సమానము. సాంద్రత 1.6. పై ఉష్ణోగ్రత 200 డిగ్రీలు. ఇంతచల్లబడియున్నను దీని వాతావరణమున నీటియావిరి యుండుటాశ్చర్యజనకముగా నున్నది.

10. ప్లూటో :- ఇది క్రొత్తగా గుర్తింపబడిన గోళము. 21 జనవరి 1980 సంవత్సరమున 'టోంబోల్' అను గోళపరిశీలకుడు గుర్తించి యున్నాడు. దీని యుపరిభాగ ఉష్ణోగ్రత - 240 డిగ్రీ లుండునని యూహించుచున్నారు. సూర్యప్రచక్షిణకాలము 249.17 సంవత్సరములు. దీని కక్ష్య సూర్యకుటుంబములోని యన్నిగోళముల కంటె అతి కోలగాను వక్రముగాను ఉన్నది. అంతేగాక తొమ్మిదవ గ్రహమైన నెప్ట్యూన్ కు చాల దూరమున ఉన్నది. సూర్యుని నుండి 365 కోట్ల మైళ్ళ దూరములో నున్నది. కుటుంబములోని మిగత గ్రహము లన్నియు

నొకదాని ననుసరించి మరొకటి దగ్గరదగ్గరగా నుండుటయు, ప్లాటో విసరి దూరముగా పారవైవబడిన ట్లది దూరమున నుండుటయు, కక్ష్య యందుగూడ కుటుంబములోని మిగతి గ్రహములవలెగాక యెక్కువ కోలగా నుండుటను బట్టియు నిది సూర్యమండలమునుండి యుత్పత్తి యైనది గాదేమో అని సంశయము తోచుచున్నది. ఇతర సూర్య మండలములనుండి యుత్పత్తియై తల్లిగోళమును వీడి విశాలబ్రంహ్మాండ ములో త్రోవ తెన్ను లేక యిచ్చునచ్చినరీతి పర్యటించుతరి మన సూర్యుని యాకర్షణ ఆవరణలోనికి రాగా, ఆకర్షింపబడి, సూర్య కుటుంబములో జేరిచున్నదా యని యూహించుటకు గావకాశ మిచ్చుచున్నది.

గమ్యస్థానము

సూర్యుని గురించియు, సూర్యకుటుంబమును గూర్చియు తెలుసు కొనిన పిదప నివి యెల్లకాల మట్లే యుండునా? లేక మార్పులు కలుగునా? అను ప్రశ్న యుదయించుట సహజము. ఈ ప్రశ్న జవాబుకై యనేకమంది చిరకాలము పరిశీలనలు చేసిరి. అందు ముఖ్యులు, 1. హెర్షల్, 2. రిచ్చార్డ్స్, 3. వీవెల్, 4. వాలెస్, 5. సైమన్ మొదలైనవారు. సుమారు 30 సంవత్సరము లతిశ్రద్ధగా గ్రహవేధలు చేసి 'హెర్షల్' అను పాశ్చాత్యసిద్ధాంతవేత్త యినమండలము సకుటుంబముగా దక్షిణమునుండి యుత్తరమువైపుకు సరివేగముగా వ్రయాణము చేయుచున్నట్లు కనుగొనియున్నాడు. ఏమండలము వైపుకు బోవుచున్నదను విషయమునుగూర్చి పరిశీలనలు సాగించి తుదకు శ్రవణానక్షత్రమునకు సమీపముననున్న "హెర్క్యులిస్" మండలము గమ్యస్థానమై యుండునని నిశ్చయించినాడు. గమనవేగమును లెక్కింపగా దక్షిణమునకు 12 మైళ్ళ చొప్పున, అనగా గంటకు

నలుగురిమూడు వేల రెండువందల మైళ్ళ వంతున నపరిమిత వేగముతో బోవుచున్నట్లు తెలియనచ్చినది. 'హెర్షల్' తదనంతరపు పరిశోధకులైన 'ఓచ్చాక్ట్', 'ఏసెల్', వాలెస్ ప్రభృతులు హెర్షల్ గారి సిద్ధాంతము నామోదించుచు సూర్యకుటుంబము యొక్క గమ్య న్నాసము హెక్యులిస్ మండలము గాదు, దాని సమీపమున నున్న మరియొక పెద్ద జ్యోతి యని సంస్కరించియున్నారు. ఈ పెద్ద జ్యోతి హెక్యులిస్ కంటె శ్రవణానంతమున కెక్కుడు సన్నిహితముగా నున్నది. దీనినే హింహుసిద్ధాంతము బ్రహ్మమండలముగా వ్యవహరించు చున్నారు. ఈ మండలసమీపముననే విష్ణు శేష మండలములు గూడ నున్నవని యూహింపవచ్చినది. కొంతకాలమునకు, అనగా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరములకు బ్రహ్మాండలము సూర్యకుటుంబమును పూర్తిగా తనదగ్గర కాకర్షించుకొని, తనలో లయము చేసుకొను నని సాశ్చాత్య హింహుసిద్ధాంతము లుభయులు ఊహించుచున్నారు. పై యభిప్రాయము జనసామాన్యమున కాశ్చర్యకరముగా నుండుటయే గాక యనుమానాస్పదముగా గూడ నుండును. ఎట్టిపరిశీలనాంత ములవలన యీ యభిప్రాయమునకు సిద్ధాంతములు వచ్చిరో విఫలముగా తెలియజేసినచో అట్టి సందేహము లన్నియు సదృశ్యమై, సర్వజనులు దీని నామోదించుటకు సావకాశ మున్నది. అందుచే నీవిషయమును విఫలముగా చర్చించుచున్నారు.

మనము చెట్లు వొత్తుగానున్న అరణ్యములో రుజువుగా నున్న ఒక మార్గమున బోవుచున్నా మనుకొనుట. అప్పుడు మన కెదురుగా నొక యరమైలు దూరములో నున్న చెట్లు మన కవి పరస్పరము దగ్గరగా నున్నట్లు కనిపించును. అటువలెనే వెనుకవైపుకు తిరిగి చూచినచో కొన్ని చెట్లు సహజముగా నవి దూరమున నున్నను, దగ్గరసాయున్నట్లు కనిపించును, ఎదురుగా దూరముననున్న రెండుచెట్లను,

వెనుకవైపు దూరముగానున్న రెండు చెట్లను బాగుగా లక్షించి మనము ముందుకు నడుచుచున్నచో యెదుట గుర్తించిన రెండుచెట్లు క్రమముగా చూడమగుచున్నట్లును, వెనుకవైపున చెట్లు మొదట చూచిన వానికంటె దగ్గరగా చేరుచున్నట్లును కనిపించును. చెట్లదగ్గరకు నచ్చుసరికి మనము తదేకదృష్టితో లక్షించుచు నచ్చిన, చెట్ల సహజదూరము తెలియును. ఇది మన మరమైలు చూడములో నిడివరకు చూచి యూహించినదానికి కొన్ని రెట్లుండును. వెనుకవైపున గుర్తించబడిన చెట్లు క్రమముగా సన్నిహితములగుచు నచ్చి, మనము వాటినుండి మైలుదూరము నడచి చూచినచో మొదట చూచినవాని కంటె మిక్కిలి దగ్గరగా నున్నట్లు కన్పించును. రైలులో ప్రయాణము చేయుచున్నపుడు బయటికి చూచినచో ఈ దృశ్యానుభవమును పొందుచున్నాము. ఋజుమార్గమున ప్రయాణముచేయు వ్యక్తి కంటికి యెదురుగా నున్న వస్తువులు పరస్పరము క్రమముగా చూడమగుచుండుటయు, వెనుకవైపున చూడబడునవి సన్నిహితము లగుచుండుటయు, వ్యక్తి యొక్క సంతతచలనము దప్ప వేరు కారణము లేదు. సిద్ధాంత వేత్తలు దక్షిణమున దూరముగానున్న రెండు జ్యోతులను బలమైన దుర్బిణీసహాయమున గుర్తించి వాటిని లక్షించి యనుదినమును కొన్ని సంవత్సరములపాటు చూచిరి. అదివరకు వారు గుర్తించిన దూరము కంటె నవి క్రమముగా పరస్పరము సన్నిహితములగుచున్నట్లు తోచినది. అటువలెనే ప్రతిదినమును ఉత్తరదిశగా నున్న రెండు దూరపు జ్యోతులను జూచుచువచ్చిరి. ఈ జ్యోతులు క్రమముగా పరస్పరము దూరముగా జరుగుచున్నట్లు కనిపించినవి. దక్షిణభాగపు ఆకాశములో మొదట లక్షించిన రెండేగాక, మరి యే యితర రెండుజ్యోతులను జూచినను నవి పరస్పరము సన్నిహితము లగుచున్నవి. అటువలెనే యుత్తరపువైపున ఋజువుగానే రెండు దూరపుజ్యోతులను జూచి

నను, అవి మొదటి దృశ్యముకంటె పరస్పరము దూరమగుచున్నట్లు గోచరించుచున్నవి. ఈ రెండు వింత దృశ్యానుభవములకు కారణము భూమి దక్షిణమునుండి యుత్తరమునకు ప్రయాణము చేయుచుండుట తప్ప మరియొకటి గాదు. ఒక్క భూమియే యిట్లు ప్రయాణము చేయుచున్నదా? లేక యితర సూర్యకుటుంబముగూడ యటువలెనే ఏగుచున్నదా? యను నియోకప్రశ్న యుదయించుచున్నది. ఎప్పుడు చూచినను, భూమికి సూర్యునికిని గల దూరము, భూమికి యితర గ్రహములకును గల దూరము సమానముగా మార్పులేక కన్పించుచుండుట చేత సూర్యుడు సకటుంబముగా దక్షిణమునుండి యుత్తరమునకు ప్రయాణము చేయుచున్నట్లు నిశ్చయముగా తెలియుచున్నది. అనేకమంది వినిధరకములుగా పరిశీలనలు, పరిశోధనలు, గణితము చేసి సూర్యకుటుంబము కేకనుకు 12 మైళ్ళివేగముతో నుత్తర దిశగా శ్రవణానక్షత్రము వైపుకు పోవుచున్నదని కనిపెట్టిరి. ఈ నక్షత్రమును బ్రహ్మామండలముగా హిందూసిద్ధాంతములు వాడుకచేయుదురు. దీనికి గూడ స్థిరత్వములేక అంతకంటెను పెద్దదియైన విష్ణుమండలము వైపుకు పోవుచున్నట్లు తెలియుచున్నది.

ఈ విషయమును కొంతవరకు సూచించు పూర్వశ్లోములు కొన్ని యీ క్రిందివిధమున నున్నవి.

ఊర్వోత్తరా బుషిభ్యస్తు, ద్రువో యత్రాస్తివై స్పృతః
 ఏతద్విష్ణుపదం దివ్యం, తృతీయం వ్యమ్ని భాస్వరమ్
 ధర్మద్రువాద్యా నిష్ఠంఠి, యత్యవై లోకసాక్షిణః
 తత్సాష్టోకత్పన్నయోచేద్దా, సద్విష్ణోః పరమంపదమ్
 యత్రోతమేతక్ప్రౌతంచ, యద్భూతం నచరాచరమ్
 ఖవ్యంచ విశ్వం మైత్రేయ, తద్విష్ణోః పరమంపదమ్
 దీవివ చక్షరాతతం, వితతం యన్నహత్మనామ్

వివేకజ్ఞానదృష్టించ తద్విష్ణోః పరమంపవమ్
 యస్మిన్ స్రతిష్ఠితో భాస్వాః, మేఘభూతస్వసుంద్రువః
 ద్రువేవ సర్వజ్యోతింపి, జ్యోతిష్త్వం భోముచోద్విజ
 ఏవమేతత్పదం విష్ణా స్తుతియ మమలాత్మకం
 ఆధారభూతం లోకానాం, త్రయాణాం పృథ్వికారబమ్
 తతః ప్రభవతి బ్రహ్మణ, సర్వపాపహరా సరితే
 గంగా దేవాంగనాంగానా, మనులేపనపింజరా !

భూమండలోత్పత్తి

సూర్యకటుంబములోని యితర మండలముల మాదిరిగా నివ్వడు భూమియని పిలువబడునది పొగచుట్ట ఆకృతిగల తేజోవాయువునందు కొంతభాగమైయుండి కేంద్రీకరణమువలన నొక బంధినికారమును పొందెను. (11 వ పటము చూడు.) ఇట్టి తేజోవాయు వ్యవస్థలో గల గోళమునకు సాంద్రతయు, గురుత్వాకర్షణశక్తియు (Gravity) స్వల్పముగా నుండును. ఇప్పటికంటె గమనవేగ మధికముగా నుండుటచే నాభీ బహిష్కరణశక్తి ప్రబలముగా నుండెను. వస్తుతత్వమునుగూర్చి యోచించినచో నది యనుకూల (ధన), ప్రతికూల (ఋణ) విద్యుదణువుల సముదాగుమై యుండెను. పై రెండు విద్యుదణువులను ఆంగ్లమున (Positive) ప్రోటాన్సు, (Electrons) ఎలక్ట్రాన్సు అని పిలుతురు. ఈ వ్యుదణువులు విద్యుచ్ఛక్తియుతము లగుటచే వాటి కా పేరు సార్థక మగుచున్నది. వీటి పరస్పరసమ్మేళనమువలన మూల వస్తువుల పరమాణువు లేర్పడుచున్నవి. ఒక అనుకూల విద్యుదణువు మరొక అనుకూల విద్యుదణువు నాకర్షింపక బహిష్కరించును. అట్లే యొక ప్రతికూల విద్యుదణువు మరియొక ప్రతికూల విద్యుదణువును బహిష్కరించును. ఒక అనుకూల విద్యుదణువు మరొక ప్రతికూల విద్యుదణువు నాకర్షించును. అంతేగాక కొన్ని అనుకూలవిద్యు

దాగువులు కలిసి యొకచో కేంద్రీకరించి, కొన్ని ప్రతికూల విద్యుదగువుల నాకర్షించును. ఎల్లప్పుడూను అనుకూలవిద్యుదగువు కేంద్రమునందుండి దానిచుట్టను ప్రతికూల విద్యుదగువును త్రిష్కకొనుచుండును. ప్రతికూల విద్యుదగువు కేంద్రమునందుండి యనుకూల విద్యుదగువులను చుట్టును ఖిష్కకొనుట సంభవించదు. ఒకటిగాని, కొన్నిగాని యనుకూల విద్యుదగువులు కేంద్రముగా నేగ్పడి వాటితక్కిచేత నొకటినిగాని కొన్నింటిని గాని ప్రతికూల విద్యుదగువుల నాకర్షించి చుట్టును త్రిష్కకొనుచుండుటచేతి ననేకకకములైన మూలవస్తువుల పరమాణువు లేర్పడుచున్నవి. రెండుగాని, కొన్నిగాని పరమాణువులు గుంపులు గుంపులుగా పరస్పరము నాకర్షించి జట్టుగా నుండుటచే నగువు లేర్పడుచున్నవి. అణువులను మాలిక్యులు (Molecules) అందురు. పరమాణువులను ఏటమ్స్ (Atoms) అందురు.

ప్రతికూల విద్యుదగువు లన్నియు సమానములే. వాటిలో భేదములు లేవు. అవి యనుకూల విద్యుదగువులతో ననేకకకములుగా సమ్మేళించుచుండుటచేత వివిధములగు మూలవస్తువుల పరమాణువు లేర్పడుచున్నవి. అట్టి సమ్మేళనము తేజోఉష్ణ వాయువులు క్రమముగా చల్లబడుటచేత కల్గుచున్నది. అనేకకోట్ల సంవత్సరములకు గాని తేజో వాయువు చల్లబడుట కలుగదు. మూలవస్తువుల పరమాణువు లేర్పడగా నవి ముందు వాయురూపములో నుండును. మరికొంతకాలము నరకు చల్లబడినచో నవి ద్రవ, ఘనావస్థలను నరుగగా బొందును.

చంద్రమండలోత్పత్తి

భూమి తన తేజో వాయు రూపమున నున్నప్పుడు యిప్పటికంటె అధికవేగముతో తిరుగుచుండెడిది. ఇప్పుడు తన యిరుసుమీద ఒక మూడు చుట్టును తిరుగుటకు నుమారు 24 గంటల కాలము వట్టు

చున్నది. వాచుచూపమున నున్నపుడు దినప్రమాణ మింతయుండక చాల తక్కువగా నుండెడిది. అంతవేగమున తిరుగునప్పుడు కేంద్రాకర్షణశక్తి (Gravitation at force), నాభిబహిష్కరణశక్తి యించు మించు సమానములము గలవై యుండనోవును. అట్టి పరిస్థితులలో యే యితర మండలమైనను సమీపముగా నచ్చుటచేతగాని, లేక ఆస్కాపదక్షిణవేగాధిక్యతలన గాని భూమి తనయందుగల తేజోవాచువును కొంత అనలకు విసర్జింపె చెను. అట్లుపోయిన పదార్థ మొక గోళాకారమును పొంది భూమియొక్క ఆకర్షణ ప్రపంచమును దాటి యానలకు బోలేక, మొదటి విసురుకు 50 లక్షల మైళ్ళదూరము పోయి యుండుటచే తిరిగి యాకర్షింపబడక అందే యుండవలసివచ్చెను. అట్టి గోళమే చంద్రుడు. మొదటనే భూవ్యాసమునకు రెండున్నరలక్షల దూరమునకు లోపల పడియుండినచో తిరిగి భూమిచేత నాకర్షింపబడి యుండుటకు గానకాశమున్నది. ఆలాసంభవించని కారణమున నది యందే యుండి భూమిచుట్టును తిరుగుట కలిగెను. చంద్రమండల పదార్థము లేచిపోయినచోట లోతైన పల్లవుప్రదేశ మేర్పడెను. కొంత వరకు నితర మెంకప్రదేశములనుండి పదార్థ మివల్లములోనికి సర్దుకొనినను పూర్తిగా మెట్టగానున్న ప్రదేశములో సమానము గాజాలక పల్లముగానే యుండెను. అట్టి పల్లవుప్రదేశములలో యిప్పుడు సముద్రము లున్నవి. వాటిలో నన్నిటికంటె పెద్దది పసిఫిక్ సముద్రమగుట చేత దానిని చంద్రమండల పదార్థము భూమినుండి యావలకు పోయిన చోటుగా భావించుచున్నారు.

చిన్నమండల మగుటచే నీ చంద్రుడు త్వరితముగ చల్లబడి ఘనావస్థను బొందెను. ఇప్పటి చంద్రమండల వ్యాసము 2 వేల మైళ్ళు. దీనిని అత్యధికముగా నాభియందుగూడ వేడిపదార్థము లేకుండ పూర్తిగా చల్లబడిన మండలముగా నెన్నుచున్నారు. ఇందు వాతా

వరణముగాని, నీరుగాని యున్నట్లు తోచుటలేదు. వాతావరణమున్నచో సంపూర్ణ గ్రహాకాలమందు భూమియొక్క ఛాయస్విగుణోపతమై గన్పింపవలసియుండును. అట్లు కన్పింపని కారణమున నందు వాతావరణము లేనట్లు తెలియుచున్నది. నీరున్నచో సూర్యరశ్మికి ఊషుములేర్పడి మండలముచుట్టను వ్యాపించి సంవత్సరములో కొంతకాలమైనను దుర్భిణీలకు పూర్తిగా నందున్న విశేషములు గోచరింపకపోవుట తటస్థించును. అట్లుగాక యెల్లప్పుడు దుర్భిణీయంత్రములద్వారా చూచుటకు ఏలుగా నుండుటచే నందు నీరు లేనట్లు తెలియుచున్నది. ఇందు మచ్చలుగానున్న ప్రదేశము లందుగల పర్వతపంక్తుల శిఖరముల నీడలుగా తోచుచున్నది. కొన్ని పర్వతములయొక్క నికుపు, డెత్తు మొదలైనవి కొలిచియున్నారు. చల్లబడిన కారణమున దీని వేగముగూడ సన్నగిలిపోయినది. అందుచేత ఆత్మప్రదక్షిణకాలము, భూమిని చుట్టినచ్చు కాలము ఒక్కటిగా నున్నవి. అనగా 30 రోజులలో నొకసారి తనచుట్టు తాను తిరుగును. అదేకాలములో, భూమిచుట్టునుగూడ తిరుగుచున్నది. కనుక దుర్భిణీద్వారా పరీక్షించు నప్పుడు సహా ఒకవైపుమాత్రమే చూడగలుగుచున్నారు.

భూమంతల వయస్సు

భూమండల వయస్సునుగూర్చి వివిధరకముల యభిప్రాయములు గలవు. 50 కోట్ల సంవత్సరములని కొందరును, 100 కోట్ల సంవత్సరములని మరికొందరును, హేనోకసిద్ధాంత ప్రకారము 200 కోట్ల సంవత్సరములనియు నభిప్రాయ పడుచున్నారు. నవీన శాస్త్రజ్ఞులు సముద్రమునందలి ఊరమునుబట్టి భూమివయస్సును లెక్కకట్టిరి. ప్రతిసంవత్సరమునందును నదులద్వారా సముద్రమునకుచేరు ఉప్పు పరిమాణమును లెక్కకట్టి ప్రాణిపదికలో యేవిధమైన ఊరము లేనట్లుహించి, యిప్పటి

సముద్రపు నీటియందుగల క్రోమము నంచనావేసి, యింతకొరము జేరుట కై న కాలమునుబట్టి వయస్సును నిర్ణయించిరి. ఇది స్థూలముగా నున్న వద్దతి. దీనికంటెను సాక్ష్యవద్దతిని రేడియమ్ అను గ్వయం ప్రకాశముగల లోహముయొక్క మార్పులనుబట్టి భూమండలవయస్సు 200 కోట్ల సంవత్సరములకు తగ్గియుండవని నిర్ణయించిరి. యురేనియమ్ లోహము తనయందుగల కొన్ని విద్యుద్రావులను క్రమముగా పోగొట్టు కొని, రేడియమ్ మొసలగు యితరలోహములుగాను, చివరకు సీసము గాను మారుచున్నది. ఈ మార్పులయొక్క కాలపరిమితినిబట్టి పైనిర్ణయమునకు వచ్చిరి. హిందూసిద్ధాంతవేత్తలుగూడ 195 కోట్ల సంవత్సరములని తెలుసుకొని యున్నారు. కనుక రెండు స్వతంత్ర సిద్ధాంతములద్వారా తెలియుచున్న యీ భూమి వయస్సు నిర్ణయించుట ముగా నంగీకరింపవచ్చును. సంఖ్యానీకము పెద్దది అగుటచేత తరుచు పరిభాషలో ప్రశంసించుటకు సులువుగా నుండుటకై దీనిని దిన పరిమాణమైన 24 గంటలకు కుదించి వ్యవహరించుచుండును. ఈ ప్రకారము భూమివయస్సు గడియారమున 12 గంటలు గడచినచో 100 కోట్ల సంవత్సరములు భుక్తియైనదని యర్థము. అవసరమైన ప్రతిసారి 100 కోట్ల సంవత్సరములని వాడుటకంటె 12 గంటలని చెప్పినచో సులభముగా నుండును. దీనినిబట్టి యొకగంటయనిన 8 కోట్ల 88 లక్షల సంవత్సరములు. ఒక నిమిషమనగా 14 లక్షల సంవత్సరములు. "హిమవత్సరవృత్తములు, చాల నవీనములు, చిరుత వయస్సు గలవి. ఇవి కడపటి 10 నిమిషములలో జననమొంది ఉన్న"వని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుదురు. దాని యర్థము మామూలు సంవత్సరముల లోనికి మార్చినచో నొక కోటి, నలభై లక్షల సంవత్సరములుగా మారును. ఈ విధముగా కోట్లకొలది సంవత్సరములలో భూమియందు గలిగిన మార్పులను విశేషములను సులువుగా చర్చించుకొనుటకు

నీ దినపరిమాణవర్ధితి సౌకర్యముగా నున్నది. దీనివలన విద్యార్థులు యితర వాతకులు గ్రహించుటకు గూడ సులభమగును.

భూమండల వయస్సు రెండు భాగములుగా చేయబడినది. అందు మొదటిది 12 గంటలు (100 కోట్ల సంవత్సరములు), తరువాతది 12 గంటలు. ఇందు మొదటి భాగము 'ఆర్కైయిక్ కాల' (Archaik Period) మందును. 'వ్రా' యను నక్షరమందు బహు ప్రాచీనత స్ఫురించుచుండుటచే నీ కాలమును ప్రాగ్భాగముగా చెప్పవచ్చును. ఈ కాలములో భూమియందు జరిగిన మార్పులను విపులముగా గ్రహించుటకు దగిన సూచారములు లేవు. కాని యూహించుటకు వీలున్నది. పొగచుట్ట ఆకారముగల తేజోవాయువునుండి తన ప్రత్యేకతను బొంది, గురుత్వనాభి యాకర్షణము వలనను, అతి వేగముగ నద్దలకారమున కిసుగుచుండుటచేతను గోళాకారమును పొందినది. ఆదిత్యమండలమునకు దూరముగా నుండుటచే క్రమముగా చల్లబడుట కారణించినది. అప్పు డనుకూల ప్రతికూల విద్యుదణువుల స్పందన వేగములు క్రమముగా క్షీణించి యవి దగరగావచ్చి యనేక రకములుగా సమ్మేళించి, మూలనస్తువుల పరమాణువు లేర్పడెను. ఈ విధమున సేర్పడిన మూలనస్తువులను (Elements) యింతవరకు 98 ని గుర్తించి యున్నారు. ఉదాహరణ కొర కిందు కొన్ని మూలనస్తువులను బేర్కొనుచున్నాను. 1. అల్యూమినియమ్ 2. ఎంటిమొనీ 3. ఆర్గన్ 4. ఆర్సెనిక్ 5. బేరియమ్ 6. బేరివిలియమ్, 7. బిస్మత్ 8. చొర్రా 9. బ్రోమిన్ 10. కాడ్మియమ్ 11. కాసియమ్ 12. కాల్షియమ్ (సున్నమునుండి తీయబడునది.) 13. కార్బన్ (బొగ్గు) 14. సిలియమ్ 15. క్లోరిన్ 16. క్రోమియమ్ 17. కోబాల్ట్ 18. కాపర్ (రాగి) 19. డైస్ప్రోసియమ్ 20. ఎర్బియమ్ 21. యురోపియమ్ 22. ఫ్లోరిన్ 23. గెడోలినియమ్ 24. గేర్మియమ్ 25. జెర్మానియమ్ 26. గోల్డ్

- (చుగారము) 27. హాల్మియమ్ 28. హీలియమ్ 29. లిథియమ్
 30. సోడియమ్ (ఉపజని) 31. ఇండియమ్ 32. నియోబియమ్
 33. ఇండియమ్ 34. ఐరన్ (యినుము) 35. క్రోమియమ్
 36. లెంథేనమ్ 37. లెడ్ (ససము) 38. లిథియమ్ 39. లుటీసి-
 యమ్ 40. మెగ్నీషియమ్ 41. మాంగనీసు 42. మెర్క్యూరీ (పాపరసము)
 43. మోలిబ్డెనమ్ 44. నియోజైమియమ్ 45. నియోబియమ్ 46. నికెల్
 47. నియోబియమ్ 48. వైక్రొజన్ 49. ఆస్మియమ్ 50. ఆక్సిజన్
 51. ఫ్లోరిన్ 52. ఫాస్ఫరస్ (భాస్వరము) 53. గ్లాసెనమ్ 54. పొటా-
 సియమ్ 55. ప్రేజియోజైమియమ్ 56. రేడియమ్ 57. రేడన్ 58. రోడి-
 యమ్ 59. రుబిడియమ్ 60. రుతీనియమ్ 61. సమారియమ్ 62. స్కెన్డి-
 యమ్ 63. సేవినియమ్ 64. సిలికాన్ 65. స్ట్రోన్టియమ్ (కెంపి) 66. సోడియమ్
 67. స్ట్రోన్టియమ్ 68. సుల్ఫర్ (గంధకము) 69. టాండేలమ్ 70. టెల్లూరి-
 యమ్ 71. టర్బియమ్ 72. తేలియమ్ 73. తోరియమ్ 74. తులియమ్
 75. టిన్ (తగరము) 76. టిటానియమ్ 77. టంబ్లెన్ 78. యురేనియమ్
 79. వెనేడియమ్ 80. వ్హనోన్ 81. యుర్బేనియమ్ 82. యట్రియమ్
 83. జింకు 84. డిస్కోనియమ్ మొదలైనవి.

పరమాణు స్వరూపము

పై నస్తువుల పరమాణుతత్వ మెట్లున్నదో తెలిసికొనినచో నవి యెట్లుదృఢించుటకు సావకాశమున్నదో సులువుగా నూహించ వీలగును. మూలవస్తువులన్నిటికంటెను బహుతేలికయైనది 'సోడియమ్' ఇది మామూలు శీతోష్ణములయందు వాయురూపములో నుండును. మంచుగడ్డకంటె అతిశీతల పరిస్థితు లేర్పరచినచో నిది ద్రవరూపమును, తదుపరి ఘనావస్థను బొందును. దీని పరమాణువుయొక్క బరువు నవీన

యంత్రామగ్రితో విశేషముగా పరిశోధించి తూచగా 0.000,000, 000,000,000,000,000,0014 గ్రామ్ ఉన్నట్లు తెలియచిన్నది. దీనిని బట్టిచూడ పరమాణువు హాకం దని యల్పస్థితిలో నున్నవనుట నిర్వివాదాంశము. ఒక ప్రతికూల విద్యుదణువు వ్యాసము పరమాణువు యొక్క వ్యాసములో యాదృశ వేలవంతుండను. 'హైడ్రజన్' (ఉదజని) పరమాణు స్వరూపమును విమర్శింపగా నందు మధ్య నొక అనుకూల విద్యుదణువునది, దానిచుట్టును నొక ప్రతికూల విద్యుదణు వద్దుత వేగ ముతో తిరుగుచున్నట్లు తెలియచున్నది. దాని పరిస్థితి వటమున ఒకేకీలించినచో సుఖోధకమగును. (21 వ పటము చూడుడు.)

అనుకూల విద్యుదణువునందు బహు స్వల్పముగా ననుకూల విద్యు చ్చక్తియు, ప్రతికూల విద్యుదణువునందు ప్రతికూల విద్యుచ్ఛక్తియు గలవు. ఆ రెండుశక్తులు ఒకదాని నొకటి యెల్లప్పుడు నాకర్షించును గాన నా శక్తియుతములైన పదార్థరేణువులు పరస్పరము నొకదాని నొకటి యాకర్షించి తత్ఫలితముగా పరమాణుస్వరూపమును ధరించి యున్నవి. ఇందు ప్రతికూలవిద్యుదణు వనుకూలవిద్యుదణువుకంటె అనేకసంఖ్య రెట్లు చిన్నది. అనుకూలవిద్యుదణువు తన శక్తివలన ప్రతికూలవిద్యుదణువు నానలకు పోనీయక యాకట్టుచున్నది. ప్రతికూల విద్యుదణువు అనుకూల విద్యుదణువుయొక్క ఆకర్షణప్రపంచము నుండి తప్పించుకొనలేక తనయందుగల శక్తి నుపయోగించి యను కూలవిద్యుదణువు చుట్టును ఆత్యద్భుత వేగముతో నియమితకక్ష్య యందు తిరుగుచున్నది. ఒక మూలనస్తువుయొక్క సంద్రత ముఖ్యముగా దాని యనుకూలవిద్యుదణువు బరువుమీద ఆధారపడి యుండును. అన్నివస్తువులకన్న 'హైడ్రోజన్' పరమాణు స్వరూపము సూక్ష్మమైనదియే గాక నిరాడంబరమైనది. అందుచే తారతమ్య సంద్రతలో నిది యద్వితీయమైన తేలిక పదార్థము.

హాలియమ్ పరమాణువు :

ఈ పరమాణువునందు నాలుగు అనుకూలవిద్యుదణువులు, రెండు ప్రతికూలవిద్యుదణువులు కలిసి యొక నిశ్చల కేంద్రస్థ అణువుగా నైనవి. వాటిని 'న్యూట్రాన్స్' అని పిలుతురు. దానిచుట్టును రెండు ప్రతికూలవిద్యుదణువు లొకే కక్ష్యలో యెక్కువ వేగముతో తిరుగుచున్నవి. (13 న పటము చూడుడు).

బొగ్గు పరమాణువు :

ఈ పరమాణువునందు 12 అనుకూలవిద్యుదణువులును, 6 ప్రతికూలవిద్యుదణువులును గలసి కేంద్రనిశ్చలాణువైనది. దానిచుట్టును రెండు ప్రతికూలవిద్యుదణువులు మొదటి కక్ష్యలోను, నాలుగు ప్రతికూలవిద్యుదణువులు మరొక కక్ష్యలోను తిరుగుచున్నవి. (14 న పటము చూడుడు.)

సోడియమ్ పరమాణువు :

ఇందు 11 అనుకూల 12 ప్రతికూలవిద్యుదణువుల కేంద్రమును, మూడు కక్ష్యలలో 2, 8, 1 ప్రతికూలవిద్యుదణువులును ప్రవక్షిణించుచున్నవి. (15 వ పటము చూడుడు)

ఇటువలెనే క్లోరిన్, ఆర్గన్ పరమాణువుల స్థితి గమనింపుడు. (16, 17 పటములు చూడుడు.)

ఇంతవరకు చూపబడిన పరమాణు స్వరూపపటముల నుండి ముఖ్యముగా తెలియనగు విషయమేమన, ఒక అనుకూలవిద్యుదణువు శక్తిని యుపసంహరించుట కొక ప్రతికూలవిద్యుదణువు చాలియున్నదను సంశయము. కేంద్రమునందు గల అనుకూలవిద్యుదణువులను ప్రతికూలవిద్యుదణువులు కొన్ని వాటిలో చేరి మిగతవి చుట్టును తిరిగి సంతృప్తి పరచుచున్నవి. ప్రతి పరమాణువునందును కేంద్రమునందు గల ప్రతికూలవిద్యుదణువుల సంఖ్యయు, చుట్టును తిరుగు వాటి

మొత్తిమును కలిపినచో చనుకూల విద్యుదగువుల సంఖ్యకు సహజముగ చున్నది. అందుచేత కొన్ని యనుకూల విద్యుదగువులతో సరిగా నన్నియే ప్రతికూల విద్యుదగువులు చక్కగా నుండిగాని, చుట్టును అనేక కక్ష్యలలో దిరుగాడుచుండుటచే గాని సంబంధ మేర్పరచు కొనుట చేత వివిధరకములై చ మూలనస్తువుల పరమాగువు లేర్పడుచున్నవి.

ఇంతియగాక పరమాగుస్వరూపముల సామరస్య, భేదములను బట్టి కొన్ని విశేషాంశములను తెలుసుకొనవచ్చును. రెండు సమాన స్వరూపములుగల మూలనస్తువులు రసాయన మిశ్రమములలో సమానముగా ప్రవర్తించుట కల్గుచున్నది. ఈ విషయమింకొకటి యుదాహరణ వలన విపులమగును.

సోడియమ్, పొటాషియమ్ :

(19 వ పటము సోడియం, 20 వ పటము పొటాషియం చూడుడు) పరమాగు స్వరూపములలో చినరయుంగరములయందు -8, -1 ప్రతికూల విద్యుదగువు లుండుటచే నీ రెండు మూలనస్తువులు రసాయన మిశ్రమములలో సరిపోల్చగిన ప్రవర్తన కలిగియున్నవి. అసగా నీ రెండు మూలనస్తువులు సనేక యితరనస్తువులతో త్వరగా కలసి మిశ్రమనస్తువు లేర్పడుటయం దాసక్తిని చూపుచుచున్నవి. ఈ రెండు మూలనస్తువులకు జెందిన యన్ని యువ్వలు నీటిలో కరుగునవియే యైయున్నవి. ఇట్టి యితర నస్తువులతో మిశ్రమమగుటకు గల యాసక్తికి కారణము, వీటి పరమాగు చట్రములో గల యంత్య ప్రతికూల పరమాగువుగా భావించుచున్నారు. ఈ విషయము మరికొన్ని పరమాగుస్వరూపములవలన గూడ విశదమగుచున్నది. క్లోరిన్ పరమాగువునందు (16 వ పటము చూడుడు.) చినర జేసి సంఖ్యగల ప్రతికూల విద్యుదగువులుండుటచే నీ మూలనస్తు వత్వంతము చురుకుగా నితర నస్తువులతో సమ్మేళన పొందగలుగుచున్నది. దానికి

స్వతిరేకముగా ఆర్గన్ పరమాణువు (17 వ పటము చూడుము.) నందు చినర సరిసంఖ్యగల ప్రతికూల విద్యుదణుసంఖ్య యుండుటచే నిది యే యితరవస్తువులతోను రసాయనసంయోగము చెందుట లేదు. ఎన్ని యితరవస్తువుల వాయువులతో కలిపి వేజీచేసినను, వాటితో కలియనేరక, యేకాకిగా యుండును. అందుచే నొక వస్తువు యొక్క గుణగతములు దాని పరమాణు అంతస్వరూపము మీద పూర్తిగా నాధారపడియున్నదని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ విషయమే బ్రోమిన్ పరమాణుస్వరూపము నలన గూడ విశదమగుచున్నది. ఈ పరమాణువులో క్లోరిన్ లోవలె కొనను 7 ప్రతికూల విద్యుదణువు లుండుటచే రసాయన సమ్మేళనములందు క్లోరిన్ లోవలె చురుకుగా ప్రవర్తించుచున్నది. క్రిప్టోన్ నందు ఆర్గన్ లోవలెనే చినర 8 అనగా సరిసంఖ్యగల ప్రతికూల విద్యుదణువు లుండుటచే ఆర్గన్ లోవలెనే రసాయన సంయోగములలో హింద్యతను కనపరుచుచున్నది.

ఈ విధముగా 98 మూలవస్తువులు తమ పరమాత్మ స్వరూపమున భేదములు గల్గియుండుటచే ప్రత్యేకవస్తువుగా నుండి వివిధరకములైన చూప, రస, గంధ గుణములను గలిగి వర్తించుచున్నవి. ఇటీవల పరిశోధనల నలన యొకే మూలవస్తువు రెండు రకముల పరమాణువులను కలిగియుండవచ్చునని తెలియుచున్నది. ఇందులకు తార్కాణముగా క్లోరిన్ యందును (16 వ పటము చూడుడు), హైడ్రోజను యందును, చ్రాణవాయువు నందును రెండేసి రకములైన పరమాణువులు గుర్తింపబడినవి.

రెండవరకపు పరమాణువునందు కేంద్రాణువు పెద్దది గనుక బరువు హెచ్చు. అందుచే హైడ్రోజన్ కంటె మొదటిరకపు క్లోరిన్ 35 రెట్లు బరువుగలదిగాను, రెండవరకపు క్లోరిన్ 37 రెట్లు బరువుగలదిగాను

ఉన్నవి. మిగతా విద్యుదణుచట్రము రెంటికి నొకేటిని నుండుటచే రెండును ఒకేవిధముగ ప్రవర్తించుచున్నవి. ఈ విధముగా ప్రాణ వాయువునందుగూడ 16 రెట్లు, 17 రెట్లు హైడ్రోజన్ కంటే బహుపుల పరమాణువు లున్నవని 'వప్టర్' శాస్త్రజ్ఞుడు గుర్తించియున్నాడు. అందు నీ రెండవకపు పరమాణువులు భూమి సూర్యునినుండి వీడినప్పటి యుత్పత్తి పరిస్థితులలో, నత్రజని పరమాణుచట్రము విచ్ఛిన్నమై ప్రాణ వాయు పరమాణువు లుద్భవించి యుండవలయునని యూహించి యున్నారు. ఇట్టి సగటునలకు గావకాశమున్నట్లు నవీన పరిశోధనలే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.

ప్రాతిపదికలో పరమాణువుల యంతస్వరూపమును తెలుసుకొనుటకు ప్రోత్సాహపరచినది రేడియమ్ ను గురించిన పరిశోధనా ఫలితములు. పాశ్చాత్య దేశములలో యథర్ ఫర్డ్, మేసవీ, బోహ్, విల్సన్ అను వార లీ విధమైన పరిశోధకులలో ముఖ్యులు. 1895 లో ఎక్స్ పరే అను విలక్షణమైన తేజస్సును కనుగొనియున్నారు. ఈ తేజోకిరణములు బహు చిన్న కెరటములు గలవియైన శారణమున మానవుని శరీరములో దూరిపోగలవు. అట్లు దూరిపోగల్గుటచేత మానవశరీరములో యేమున్నది చూడగల్గుచున్నారు. మామూలు సూర్యకాంతియే గాక అన్నిరంగుల కాంతులు, అన్నిరకముల కాంతులు గూడ కెరటముల వలెనే ప్రవహించుచుండును. (21 వ పటము). అందు 4 రకములైన కెరటములు చూపబడినవి. ఒక కెరటము పొడవు కెరటమునందుగల రెండు గొవ్వల పొడవుగా తీసికొనియున్నారు. మామూలుగా తెల్లనికాంతుల కెరటముల పొడవు ఒక అంగుళములో 50 వేల వంతు లుండును. కాంతియొక్క రంగునుబట్టి కెరటముయొక్క పొడవు నిర్ణీతమై యిండును. ఇంద్రధనుస్సునం దనేక రంగుల కాంతులు గన్పించును. వాటిలో ఎరుపు లగాయతు యూదారంగువరకు మధ్య అనేక రంగు

లుంపను. ఆ రంగుల కాంతు లన్నిటికిని మేరు మేరు పొడవులు గల కెరటము లుండును. అందు యెరుపురంగు కాంతుల కన్నిటికంటె పొడవైన కెరటములుండి ననుసగంగా కెరటము పొడవు తగ్గుచు వచ్చి సగాభరింపగల యుగాదారంగుగల కాంతులు బహు చిన్న కెరటములు గలవియై యున్నవి. ఈ ఎక్కురేసు కాంతులు వాటికంటెను బహు చిన్న కెరటములు గలవి. వీటి కెరటముల పొడవు అంగుళములో నొకకోటినిం తుండును. ఇంత మిక్కిలిపొట్టి కెరటములు గలవి యగుటచే 'ఎక్కురే' కాంతులు మానవ శరీరములో నుండి దూరిపోయి, లోపలనున్న పరిస్థితులను చూపగల్గుచున్నవి. విలక్షణములైన యీ కాంతులను కనుగొని వాటి తత్వము బోధపడినపిదప ఇటువంటి సూక్ష్మ కాంతులను మరికొన్నింటిని కనుగొనవలెనను పిపాస శాస్త్రజ్ఞులకు కలిగెను. అంతట నూతనకాంతు లెచ్చట గోచరించినను, వాటిపై బుద్ధిబలమును కేంద్రీకరింపజేసి అతి దీక్షతో పరిశోధనలు నాగింపజొచ్చిరి. అట్టి పరిశోధనల ఫలితముగా 'రేడియమ్', 'తోరియమ్' అను మూలనస్తువులను కనుగొని, అవి యీనూకాంతులను గూర్చి విమర్శించిరి. దీనికి సంబంధించిన యొక వృత్తాంతి మిందు సంగ్రహముగా డెల్పుట యుచితమని తోచుచున్నది.

యూరేన్ ఖండమునందు 'సారో చొన్ని' అను వట్టణమం గొక పదార్థ విజ్ఞానశాస్త్ర (Physics) పరిశోధనాలయము గలదు. అందు మేరియా 'స్లెడ్జోవిస్కా' అను పేరుగల పేదపిల్ల చిన్న పనులకు నౌకరుగా జేరెను. ఆమె పని గాజుపాత్రలు, ప్రయోగసామగ్రి జాగ్రత్తగా శుభ్రపరచి యొకచో నుంచి కాపాడుచు, అడిగినప్పుడల్ల వాటిని శాస్త్రజ్ఞుల కందిచ్చుట. ఆ పరిశోధనశాలకు ప్రధాన శాస్త్రజ్ఞుడు 'లిప్పిన్'. రంగుల ఛాయాచిత్రములను గూర్చుట కనుగొనిన వాడు యితడే. 'స్లెడ్జోవిస్కా' యిట్లు కొంతకాలము పనిచేయు

సరికి ప్రధానశాస్త్రజ్ఞుడీమె సూక్ష్మబుద్ధికి విధేయతకు మెచ్చుకొని వేతనము హెచ్చించుటేగాక సామానులను శుభ్రపరచుచిన్న పనిలోనుండి తగ్గించి, పరిశోధనలు చేయు నప్పుడు సహకారిగా నుండు ఉన్నతోద్యోగ మిప్పించినాడు. ఇప్పు డీమె పని పరిశోధనలకు సామానులు సమకూర్చుట, వాటిని పేర్చుట, ప్రయోగానంతరము వాటిని తిరిగి విప్పి దాచుట. పరిశోధకులు లేని సమయములో ప్రయోగములను కనిపెట్టుకొని చూచుచుండెడిది. ఇట్లుండగా నా పరిశోధనశాలలో “క్యూరియా” యను నొక యువకుడు పరిశోధనలు చేయుటకు వేతనమునకు జేరెను. అప్పటినుండి నాయువతీయువకులు పరస్పరసహకారులుగా పనిచేయుచుండుటచే వారిద్దరకు ననురాగ మంకురించి వృద్ధిపొంది సతీపతులుగ నైరి. వివాహానంతరమామె పేరు “మేడమ్ క్యూరియా”గా మారినది. దంపతులైన తర్వాత గూడ వారిపురు నాపరిశోధనశాల యందే చిరకాలము పరిశోధనలు సాగించిరి.

ఫ్రాన్సిస్కోలో “యురేనియమ్” లోహముగల ఉప్పు ప్రకాశము నిచ్చుచుండుట “మేడమ్ క్యూరియా” కనుగొనెను. 1896 లో కాంతుల నీను పదార్థము లింకను గలవనుమాట మొదట కనుగొనిన వాడు “బేక్వీరెల్” అను శాస్త్రజ్ఞుడు. అటు తర్వాత “యురేనియమ్” మిశ్రితపదార్థములలో కాంతుల నిచ్చు భాగములు కొన్ని కాననచ్చినవి. రసాయన ప్రయోగముల వలన తేజోమయ భాగములను మిశ్రమపదార్థములనుండి యీమె విడదీసి, అట్లు వచ్చిన వస్తువు అత్యధికకాంతితో నుండుట చూచి యీ పదార్థమునకు “రేడియమ్” యను పేరుపెట్టెను. ఈ పరిశోధనలకే యీమె 1911 న సంవత్సరములో “నోబిల్” బహుమానమును పొందినది. ఇంతకు ముందు 1908 లో తన భర్తతో సహా మొదటి బహుమానమును

పొందెను. స్త్రీలలో “నోబిల్” బహుమానమును పొందుటయం దీమె చుద్దొత్తీయ. అంతేగాక రెండుసార్లు నోబిల్ బహుమానమును పొందుటలో నీమె ప్రథమురాలు.

ఈమె కనుగొని ప్రత్యేకించిన రేడియమ్ నుండి వెలువడు కాంతి లను గురించి చునేకులు పరిశోధనలు గావించిరి. వాటి పర్యవ సాసముగా నా కాంతిలు, పరమాణువులు బద్దలగుటచే వెలు వడుట కల్గుచున్నదని స్థిరపరచిరి. “విల్సన్” అను నతడు పర మాణువునందు కేంద్రగతమై యొక సూక్ష్మాణువు ఉన్నదనియును, దానిచుట్టు ఒకటిగాని చునేకముగాని చుత్యంత సూక్ష్మాణువులు మిక్కిలి వేగముగ తిరుగుచున్నవని మున్నుండుగా ఊహించియున్నాడు. ఈ పరిస్థితికి కారణము విద్యుచ్ఛక్తియే చునియు, నందు కేంద్రాణు వనుకూల విద్యుత్తు గలదనియు, చుట్టును దిరుగు సూక్ష్మాణువు ప్రతి కూల విద్యుత్తుగలదనియు గ్రహించిరి. కేంద్రాణువుచుట్టును దిరుగు సూక్ష్మాణువులను తన ఆకర్షణావరణను దాటిపోవీయక నరికట్టు చుండును. ఎప్పుడైనను కేంద్రాణువు బలహీనమైనదై ప్రదక్షిణించు సూక్ష్మాణువుల నట్లరికట్టలేక పోయినచో నట్టిసూక్ష్మాణువులు స్వతం త్రించి పరమాణుచక్రమును వీడి బయటకు పోవుచుండును. అవి చుట్లు పోవునప్పుడు వాటియందు గర్భితమైయున్న శక్తి తేజముగా మనకు కన్పించును.

పరమాణువులోని బరువంతయు కేంద్రాణువునందే యుండి, ప్రద క్షిణించు ప్రతికూల విద్యుదణువు లనేకవేలరెట్లు తేలికగలవగుటచే ప్రతి కూల విద్యుదణువసమూహమైన కాంతి బరువు కనుగొనుట ప్రస్తుత మసాధ్యముగానే కన్పట్టుచున్నది. సూర్యునినుండి ప్రతినిమిషమునందును వెలువడుకాంతి 80 కోట్ల టన్నులబరువు కలదిగా యంచనా వేయబడినది.

కాంతి యొక పదార్థమే యనుటకు నొక చిన్న యుదాహరణ గలదు. ఒక సీసపుడిమ్మవూడ మధ్య నొక గన్నని రంధ్రము చేసి యందు కొద్దిగా రేడియేషన్ ను వేసినచో కాంతికెరటములు నిలువుగా పైకి పోవుచుండును. (22 వ పటము చూచుడు.) అప్పు డొక సూదంటు రాయిని అడిమ్మవూడ పెట్టినచో నిలువుగా ప్రసరించు కొన్ని కిరణములు సూదంటురాయి పైపుకు వెంగును. మరికొన్ని సూదంటురాయికి నెదుటిపైపుకు వెంగును. మూడవకపు కిరణములు నిలువుగానే యెప్పటివలె ప్రసరించును. కాంతిలు పదార్థస్వరూపములు గానిచో సూదంటురాయియొక్క ధృవముపైపునగుటకు హేతువు కన్పించదు. అందుచేత కాంతియనునది ప్రతికూల విద్యుదగువుల సమూహమనుట యథార్థము. 22 వ పటములో పై విషయము వివరముగా గ్రహింపనగును.

ఒక మూలవస్తు పరమాణుచక్రమునుండి ప్రతికూల విద్యుదగువులను నావలకు పంపవలెనన్న నొక గొప్పకృత్తిచే నా మూలవస్తు పరమాణు చక్రమును భేదించవలసియున్నది. అట్లు భేదించినచో ప్రతికూల, అనుకూల విద్యుదగువులు చెదరిపోయి కాంతిగా ప్రసరించును. ఇట్టి సంఘటనలు కొన్ని ప్రకృతిలో గలవు. అందు ముఖ్యముగా పేర్కొనదగినది 'యురేనియమ్' అను లోహము. ఈలోహపరమాణుచక్రముందు గల అనుకూల విద్యుదగువులకు, ప్రతికూల విద్యుదగువులకు పరస్పరబలములు విషమముగా నుండుటచేత కొన్ని ప్రతికూల విద్యుదగువులు సమపరిస్థితి ఏర్పడువరకు నావలకు పోవుచుండును. యురేనియమ్ పరమాణువు కొన్ని ప్రతికూల విద్యుదగువులను గోలుపోయి "ఆయోనియమ్" గా మారును. ఇదియు మరికొన్నింటిని పోగొట్టుకొని "రేడియేషన్" లోహముగా మారును. కొంతకాలము రేడియేషన్ గూడ పై ప్రకారము ప్రతికూల విద్యుదగువులను పోగొట్టుకొనుచు, ఎక్కినియ

మళ్ళీ. ఈ లోహముగూడ మఱికొన్నింటిని బోగొట్టుకొని చివరకు స్థిరమైన పరమాణుచక్రము గల సీసముగా మార్పు జెందును. యు డేని యన్ నుండి సీసము తయారగుటకు కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు పట్టును. నవీన శాస్త్రజ్ఞులు స్వతస్సిద్ధముగా పరమాణువునందు తన ప్రతికూల విద్యుదగుణులను పోగొట్టుకొనుకొని క్రియున్నను, లేకపోయినను యంత్ర, తంత్ర ప్రక్రియలనల్ల యొకనస్తువు స్థిరపరమాణు చక్రమును చేదించి కొన్ని విద్యుదగుణుల నానలకు బంపి యానస్తువుయొక్క స్వరూపమునే మార్చగల్గుచున్నారు. ఈ విధముగా సీసమును భాస్వరముగాను, భాస్వరమును యినుముగాను, పాదరిసమును బంగారము గాను మార్చగల్గుచున్నారు. అందుచే నొక నస్తువుయొక్క పరమాణుచక్రమునందు గల విద్యుదగుణులసంఖ్యలో మాత్రమే ప్రత్యేక గుణ స్వరూపములు గలవని స్పష్టమగుచున్నది.

ప్రతికూల విద్యుదగుణువు సూక్ష్మోత్తినాక్ష్మమైనను, అది యానలకు పోవునప్పుడు మానవుని నగ్నదృష్టికి కన్పించునంత తేజోలేశమును గల్పించుచుండుటచే నది అమోఘమైన శక్తి యంతర్గతమై యున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఈ శక్తిని వినియోగించు కొనుటకై యనేక పరిశోధనలు జరిగినవి. రెండున్నర తులముల బరువుగల రేడియమ్ నందలి పరమాణువుల నన్నిటిని చేదించగా బయల్పడు శక్తి యొక పెద్ద యగ్ని పర్వతము వెదజల్లువేడికి సమానమగుచున్నది. నవీనయద్ధములందు ప్రయోగింపబడిన (అనగా హిరోషిమా, నాగసాకిలలో అమెరికా వారు ప్రయోగించిన) ఏటంబాంబులో ఇట్టి రకమైన పరమాణు చక్ర విచ్ఛేదనమే కల్పింపబడినది. అది బ్రద్దలగుటచే సుమారు 2000 డిగ్రీల వేడి విడుదలయి 5 మైళ్ళు అర్ధవ్యాసముగల ప్రదేశమంతటిని భస్మీ పటలము గావించెను. సూర్యపదార్థమంతయు నస్థిరమై వినురుగా నలువైపుల సంచరించు ననుకూల ప్రతికూల విద్యుదగుణ సముదాయమై

యున్నది. అట్టి విద్యుద్దగ్గువుల ప్రవాహమే కాంతి. ఇట్టి పరిస్థితులనుండి సూర్యకుటుంబములోని యన్ని గ్రహములందు ననుకూల, ప్రతిక్షూల విద్యుద్దగ్గువునమ్మేళనము వలన స్థిరమైన పరమాణుచక్రములు వివిధ తరగతులుగా చల్లబడుటవలన నేర్పడి యిప్పటి గ్రహమండల స్వరూపములను పొందినవి.

తేజస్వీగాక, విద్యుత్తుగూడ పరమాణు స్వరూపము గలదిగా కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు పరిగణించుచున్నారు. విద్యుత్తులోని పరమాణువులు హైడ్రోజన్ ఒక మాణువుకంటెను చాల చిన్నవి. వాటినిగూర్చి విపులముగా చర్చించుట యననసరమేగాక యీ గ్రంథముయొక్క యాశయముగూడ కాదు.

చల్లబడి ఘనానస్థను పొందిన భూమియందు గల 98 మూలనస్తువులు సమనిష్పత్తిలో సంఘటింపబడక హెచ్చుతగ్గులుగా నేర్పడి యున్నవి. ఈ హెచ్చుతగ్గులకు వాటి పరమాణుచక్రములోని భేదములే కారణమై యుండవచ్చును. భూమియొక్క వదార్థమును కాగాయనికవిభజన చేసి చూడ ఈ క్రింది విషయములు తెలియుచున్నవి. భూమిలో (1) ప్రాణవాయువు 47% (2) సిలికన్ 28% (3) అల్యూమినియమ్ 8% (4) ఇనుము 5% (5) సున్నము 3.5% (6) పొడియమ్ 2.75% (7) పొటాసియమ్ 2.5% (8) మెగ్నీషియమ్ 2.25% మొత్తము 99.1%. తక్కిన 0.9% ఇతర నస్తువులన్నియు గలసి పూరించుచున్నవి.

వివిధవస్తువులముద్ర

ముందు వినవించినకీర్తిని యీ పరమాణువులు రెండు, మూడు, నాలుగు నొకచోనుండి యొకటిగా నర్థించుచుండుటచేత నణువు లేర్పడుచున్నవి. ఒక మూలనస్తుపరమాణువులు కొన్ని మరయొక

మూల వస్తువుల పరమాణువులు కొన్ని కలిసి పరస్పర ఘర్షణచే మిశ్రమ పదార్థముయొక్క అణువులుగా ప్రసరించుచున్నవి. అట్టి మిశ్రమాణు సముదాయము, మూల వస్తువుల రెంటిని బోలక నూతన రూప, రస, గంధ గుణములతో నర్తించుచుండును. ఇంటియగాక నొక వస్తువుయొక్క రెండు పరమాణువులు గలిసి యణువులైన పదార్థమునకును, మూడుగాని, యంతకు మించిగాని కలిసి యణువులైన పదార్థమునకును గూడ రూప, రస, గంధ, గుణములు వేరుగా నుండును. ఉదాహరణకు ప్రాణవాయు పరమాణువును తీసుకొన నచ్చును. ఈ పరమాణువులు రెండేసి యొక జంటగా జేరి యణువులై, అది ప్రాణవాయువుగా పరిగణింపబడుచున్నది. దీనికి రుచి, వాసన, రంగు లేవు. అట్టి యీ ప్రాణవాయు పరమాణువులే మూడు, మూడుగా చేరి యొక యణువుగా నర్తించు పదార్థమును 'ఓజోన్' (Ozone) అందురు. ఈ ఓజోన్ గాలి నీలిరంగుగా నుండి, యొకవిధ మైన రుచి, వాసన గల్గియున్నది. ఇది నీటిలో సులువుగా విలీనమై పోవును. ఇది కుళ్ళిన గ్రుడ్లవాసనను కలిగియున్నది.

అందుచే నొక వస్తువుయొక్క రూప, రస, గంధ గుణములు దాని యందలి యణుస్వరూపమునుబట్టి కల్గుచున్నవి. ఇంతకంటెను విశేషమైనది మరొకవిషయము. పరమాణువులు యొకటి యొకటి యుండి, యవి యణువులుగా సంఘటింపబడుటలోగూడ మార్పులేక ఒక తీరుననే యున్నను, యీ యణువులకూర్పు వివిధరకములుగానున్నచో, నవి యన్నియు వివిధ పదార్థములుగా వాడబడుచున్నవి. ఇందు కుదాహరణముగా వర్తించునది బొగ్గు, లాంతరుగ్లాసులోని మసి. ప్రతిదినమున వంటచేరకుగా నుపయోగపడు బొగ్గు, గ్రాఫైట్ అను భూగర్భమున దొరకు వస్తువు, రాక్షసబొగ్గు, అనేక లక్షలు ఖరీదు కల్గి స్వచ్ఛమై పారదర్శకమై యుండు వజ్రమును, బొగ్గుయొక్క వివిధ

స్వరూపములై యున్నవి. వీనికన్నిటికిని పరమాణు అంతస్స్వరూప మొక్కటియే. అణువులలోనుండు పరమాణుసంఖ్యగూడ నొక్కటియే. కాని యణుసముదాయములు వివిధరకములుగా నమర్పబడియుండుటచే నీ వివిధ వస్తువులకు భేదములు కలుగుచున్నవి. బొగ్గులోని యణువులు చింకరపందరగా నమకూర్పబడినవి. ఆ యణువులే వజ్రమునందు త్రిభుజగోపురము (Tetradron) హూదిరిగా నియమితదూరములలో సరళశ్రేణులలో కుడింపబడినవి. అందుచే కాంతికెరటములు సరళముగా నణువులమధ్య కాణ్డీలములలో ప్రవహింపగల్గుటచే గాజువలె స్వచ్ఛమై, వాగదర్శకమై, కఠినమై యున్నవి. వజ్రమును కాల్చినచో బొగ్గుగాహును. అటులనే బొగ్గునుగూడ వజ్రస్వరూపమును బొందువల్లు చేయవచ్చును. ఈ చేయు కొన్ని కార్థానాలు పాశ్చాత్య దేశములలో గలవు. బొగ్గును వజ్రముగా మార్చు విధానమును వివరించుటయు, వివరించినది యర్థము చేసుకొనుటయు మిక్కిలి సులభము. కాని యది చేయుటహాత్రము దుస్సాధ్యము. ఈ విషయమును చదువగులు తెలుసుకొనుట కుత్సహింతురు గనుక యిందు సూత్రవ్రాయముగా వివరించుచున్నాను. బొగ్గు, కరిగిన యినుమునందు నీటిలో వేసిన పంచదారవలె కరిగి యందు లీనమై పోవును. కఠిలేని బొగ్గును, ద్రవరూపముననున్న యినుములో వేసి కరగించి యాద్రవమును హఠాత్తుగా చల్లపరచినచో యందు లీనమైన బొగ్గు వెడలగ్రక్కబడును. ఈ సంఘటన హఠాత్తుగా జరుగుటచేత నా బొగ్గు యిరుపార్శ్వముల నున్న యినుము వలన నత్యంతమైన యొత్తిడికి లోనై వజ్రరూపమున బయల్పడుచున్నది. అట్లు తయారుకాబడిన వజ్రముల ననేక పనుల కుపయోగించుచున్నారు. ప్రకృతిలోగూడ రాక్షసబొగ్గు గనులందు వజ్రము లేర్పడుటకు ఒత్తిడియే కారణము. బొగ్గుగనులున్న ప్రదేశములలో

భూమి క్రమించినప్పుడు గనులు కదిలి యా మహాత్తరమైన ఒత్తి డికి నందున్న బొగ్గు వజ్రములుగా సంఘటింపబడుచున్నవి.

ఈ విధముగా పరమాణువుల స్వరూపభేదము నలననేగాక, అణువులందు గల పరమాణు సంఖ్యాభేదములవలనను, అణువుల సమ కూర్పులలోని భేదములవలనను, వివిధరకములైనట్టి యనేకమూలనస్తువు లేర్పడినవి. రెండు మూలనస్తువుల పరమాణువులు పరస్పరము నాకర్షించుకొని కలిసి యొక అణువుగా నేర్పడగలవు. అప్పు డవి మిశ్రమాణువు లగును. అట్టి యణువులచే నిర్మింపబడునవి మిశ్రమపంచాంగములు. అనేక మూలనస్తువుల పరమాణువులు కలిసి సంయుక్తాణువు లేర్పడి సంయుక్తవస్తువు లుత్పత్తి జెందుచున్నవి. వివిధమూలనస్తువులనేకతరగతులుగా సమ్మేళనపొంది లక్షలాది నూతన సంయుక్తవస్తువు లేర్పడుచుండును. కాని, యీ సంయుక్తపదార్థములందు పరస్పరాకర్షణ బలము కొన్నిటిలో హెచ్చుగాను, మరికొన్నిటిలో హీనముగాను ఉండును. అందుచేత కొన్ని మిశ్రమనస్తువులు వేడిచేసిన మాత్రము ననే వాటియందు గల కొన్ని మూలనస్తుపరమాణువులను గోల్పోయి తమ స్వభావమును, స్వరూపమును మార్చుకొనుచున్నవి. తేలికగా నర్థమగునవియ, నిత్యజీవనమున ననుభవములోనికి వచ్చునవియు నగు కొన్ని మిశ్రమ వస్తువుల యంతస్వరూపము నిందు తెలియపరచెదను.

మిశ్రమపదార్థములు

1. నీరు:—ఈ మిశ్రమపదార్థము యొక్క యణువునందు రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులును, ఒక ప్రాణవాయు పరమాణువును గలసి యున్నవి. భూమండల బాల్యదశయందు యీ మిశ్రమాణువులు విస్తారముగా నేర్పడి భూమ్యుపరిభాగము నావరించినవి. అవి క్రమమున చల్లబడి నీటియావిరి యయి మేఘము లేర్పడెను.

(28 వ పటము) పిదప మేఘములు చల్లబడుటచేత వర్షములు కురియుట కారంభించెను. ప్రాణపదికలో నందలాది సంవత్సరము లేళ్ళధారగా వర్షములు కురియుటచే భూమి పైభాగ మంతయు జలమయ మయ్యెను. ఈ చలవకు నితర మిశ్రమాణువులు, నానావిధములయిన వన్నియు గూడ చల్లబడి వాటి ఘనావస్థను బొందుటచేత భూమి చుట్టును, గట్టి పదార్థ మొక తెట్టు గట్టినట్లుగా నేర్పడెను. ఈ తెట్టు క్రింద మొదట సూర్య తేజోవాయువు, కొంత వాయురూపమును, కొన్ని చోట్ల చల్లబడుటచే ద్రవరూపమును బొందియున్నది. ఇట్టి పరిస్థితిని మన పిండివంటలలో బూరెతో సరిపోల్పవగును. బూరెయందు గల పూర్ణము మొదటి తేజో వాయు ద్రవ పదార్థములు. పూర్ణముయొక్క పైభాగమున నున్న తొక్కను, యీ తెట్టుగా సరిపోల్పవగును. తెట్టుక్రింద నున్న వాయు ద్రవపదార్థము లత్యంత ముష్ణముగా నుండుటచే దీనిని బసాల్ట్ అను పేరుతో పిలుతురు. దీనియందన్ని రకముల నస్తువులు తమ ద్రవ, ఘనావస్థలలో నున్నవి.

2. ఉప్పు : సోడియమ్ పరమాణు వాకటియు, క్లోరిన్ పరమాణు వాకటియు గలసి యీ ఉప్పు పరమాణువు లేర్పడినవి.

సా ● — ● క్లోరిన్

3. బొగ్గుపులుసువాయువు : ఇది ప్రాణవాయు పరమాణువులు రెండేసి యొక బొగ్గు పరమాణువుతో కలిసియుండుటచేత నేర్పడినది.

ప్రా ● — ● బొ — ● ప్రా

4. వంచదార (గ్లూకోజు రకం) : ఈ యణువునందు, బొగ్గు పరమాణువు లారును, హైడ్రోజన్ పరమాణువులు పండెందును, ప్రాణ వాయు పరమాణువు లారును గలసి యున్నవి.

5 స్పింధి బియ్యము : పిండియందు 6 బొగ్గు పరమాణువులును, 10 హైడ్రోజన్ పరమాణువులు, 5 ప్రాణవాయుపరమాణువులు గలసి యున్నవి.

6 'క్లోరోఫిల్' : ఈ హరితపదార్థ హుకులయందుండుటచే నవి పచ్చగా కన్పించుచున్నవి. దీనిని సంస్కృతమున హరితము అని పిలువవచ్చును. ఈ పదార్థము జీవసృష్టికంతకు నాధారభూతమై యున్నది. ఇది సూర్యరస్మికుపయోగించి యాకులలో గ్లూకోజ్ పంచ దారను తయారు చేయగల్గియున్నది. ఈ సంఘటనను కిరణజన్య సంయోగక్రియ (Photosynthesis) యందురు. వీటి యణువులను, బొగ్గువులును వాయువణువులను సమ్మేళించినచో గ్లూకోజులోనుండు సంయుక్తాణువు లేర్పడుచున్నవి. ఈ సమ్మేళనము ఏ యితర విధములగాను కానేరదు. అట్టి దుర్బలమైన సమ్మేళన యీ 'క్లోరోఫిల్' (హరితమువలన జరుగుచున్నది. జీవసృష్టి యంతయు బొగ్గుపరమాణువులుగల సంయుక్త పదార్థముల మూలముననే వృద్ధి బొందుచున్నది. మొక్కలు, జంతువులు, జీవించుటకు గ్లూకోజు, పిండి పదార్థములు మూలాధారములు. ఈ రెంటిని యాహారముగా గొని ప్రాణులన్నియు జీవించుచున్నవి. అట్టి గ్లూకోజును, సూర్యరస్మిని చీల్చి ఈ 'క్లోరోఫిల్' హరితము మాత్రమే తయారు చేయగలదు. ఆకులలో ముందు గ్లూకోజు తయారయి, వెంటనే పిండి పదార్థముగా మారును.

ఇట్టి 'క్లోరోఫిల్' సంయుక్తాణు స్వరూపమును గూర్చి విమర్శితము. ఇది నాలుగు మిశ్రమవస్తువుల స్నేహముచేత సంఘటించబడుచున్న అత్యంత క్లిష్టమైన సంయుక్తపదార్థము. అవి యీ క్రింది విధమున నున్నవి :

- (1) బొ₈₆ హై₇₀ ప్రా₈ న₄ మె₁ (దీనిని 'ఎ' క్లోరోఫిల్ అందురు.)
- (2) బొ₈₆ హై₇₂ ప్రా₈ న₄ మె₁ (దీనిని 'బి' క్లోరోఫిల్ అందురు.)

(3) బా₄₀ హై₅₆ (జెంఝోఫిట్)

(4) బా₄₀ హై₅₆ పా₂ (కెరోటిన్)

బా = బాగ్సు, హై = హైడ్రోజన్, ప్రా = ప్రాణవాయువు,
న = నత్రజని, మె = మెగ్నీషియమ్ లోహము.

ఈలా సంయుక్తమగుటచేత నీ పదార్థమునకు కిరణజన్య సంయోగ క్రియచే స్లూకోజు అణువులను సంఘటింపగల యద్భుత సామర్థ్యము కలుగుచున్నది.

ఈ విధముగా ననేక తరగతులలో నగున్న హేమములనలస యద్భుతశక్తులు గల్గిన సంయుక్త పదార్థము లనేకములు లక్షల కొలది దేర్పడుచున్నవి. మూలనస్తువులు, మిశ్రమనస్తువులు గాక వీటినిలన నణుసముదాయనస్తువు లను నింకొక తరగతి సంయుక్త వస్తువు లేర్పడుచున్నవి. మిశ్రమనస్తువులయొక్కయు, అణుసముదాయ నస్తువులయొక్కయు స్వరూపము పటము మూలమున దెలియ నగును. (24 వ పటము చూడుడు.)

రెండవపటములో చూపినమాదిరి యణుసముదాయ వస్తువులందు నాల్గు, పది మొదలు నందలు, వేలు అణువు లొకగుంపుగా జేరి యొకటిగా వ్రనర్తించుచుండును. ఈ యణుగుంపులు మామూలు అణువుల కంటె కొన్నివందలు, వేలరెట్లు పెద్దవియై యున్నవి. వీటిని అణువులని సంబోధించుట యుచితమని తోచుచున్నది. ఈ రకపు వస్తువులను కొల్లాయిడ్స్ (colloids) అందురు. వీటికి నీరును పీల్చుకొని పలచన యగుటయు, ఉష్ణాధిక్యమైనచో దానిని వదలి గట్టిపడుచుండుటయు స్వభావము. వీటి కుదాహరణములు : తుమ్మజిగురు, వేపజిగురు మొదలైనవి. వీటియందుగల జణువులు మామూలు దృష్టికి కన్పింపజాలనంతటి చిన్నవి. ఎక్కువశక్తి గల యనగా 8000 వేలరెట్లు

హెచ్చింపుగల సూక్ష్మదర్శిని యంత్రము (Ultra Microscopes) ల ద్వారా చూడగలము. అప్పుడైనను, బహుచిన్నవిగా కన్పించుటచే వివరములు తెలుసుకొనుట దుర్లభము.

జీవశక్తి గల పదార్థ మిహితి పదార్థములలోనిది. దీనిని 'ప్రోటో ప్లాజమ్' (Protoplasm) అందును. ప్రతిజీవియందును నిది యుండును. ఇది లేనిదే స్థానిరజంగమములకు జీవితమే లేదు గావున, ప్రాణము నిచ్చుటకు మూలాధారమై యున్నది. పై యర్థమును బోధించుచు దీనిని చూత్పభాషలో చెప్పవలెనన్న "జీవప్రాపు" అన్నచో కుదురు నని తోచుచున్నది. థామస్ హెన్రీ హక్సులే యచు పైచ్చానికుడు "ప్రోటో ప్లాజమ్ నునది భౌతిక జీవనమునకు మూలధార" (Protoplasm is the physical basis of life) మని చెప్పియున్నాడు. ఈ యభిప్రాయము నందు నిమిడ్పవలెనన్న ప్రాపుశబ్దమునకు నాధారమని యర్థముండుటచే, జీవాధారమని యర్థమిచ్చును. అర్థ గాంభీర్యమునను, అక్షర సంకుచితత్వము నందును, "జీవ ప్రాపు" అనునది 'ప్రోటో ప్లాజమ్'కు సరియైన తర్జుమాగా సాతకలోక మంగీకరించునని నా యాశ. ఈ జీవపదార్థము (జీవప్రాపు) యొక్క నిరంతర చర్యలే జీవనము. దీని నిశ్చలస్థితి లేక నిశ్చేష్టితమే మరణావస్థ. రసాయనశాస్త్ర ప్రకారము జీవనమును శాస్త్రజ్ఞులు "మాంసకృత్ పదార్థముల అణువుల నిరంతర తృప్తి, యసంతృప్తులే జీవన" (Life consists in sedulous and recurrent satisfaction and dissatisfaction of protudegenous molecules) మని నిర్వచించియున్నారు. ఇది బహు క్లిష్టమైన యభిప్రాయము. దీని యంతరార్థ ముదాహరణలవలన మాత్రమే స్పష్టముగా తెలియనగును.

ఉదా : మన శరీరములోని రక్తము నిత్యము ప్రవహించుచుండుట జనసామాన్యమునకు గూడ తెలిసిన విషయము. ఈ రక్త ప్రసారము

నందు గలుగు రసాయన సంఘటనలను గూర్చి తెలుసుకొనినచో పై యభిప్రాయము సులువుగా నర్థమగును. రక్తమందుగల నైరకణములలో నొక యెర్రని పదార్థమున్నది. దీనిని హెమోగ్లోబిన్ అందును. ఇది యొక క్లిష్టమైన సంయుక్త పదార్థము. ముందు పత్రములలో విశదీకరింపబడిన 'క్లోరోఫిల్' (హరితము) అను సంయుక్త పదార్థముతో సరిపోల్చు దగినది. హరిత సంయుక్తాణువు చక్రమంతయు నట్లే యుంచి యందులో చిగురుననున్న మెగ్నీషియమ్ పరమాణువునకు బదులు ఒక యినుము పరమాణువును జేర్చినచో హెమోగ్లోబిన్ సంయుక్తాణువు వగును. హెమోగ్లోబిన్ అణువు లుండుటచేతనే రక్త మెర్రని రంగు గలిగి యున్నది. ఈ హెమోగ్లోబిన్ సంయుక్తాణువు ఆసంతృప్తి గలది. అనగా దీనియందున్న యితరవస్తువుల యణువు లొక దాని నొకటి యాకర్షించి గాఢ సంయోగమున నుండుటేగాక యేకై నను, ఇతర వస్తువుల యణువుల నాకర్షించుటకు నికను నొంత శక్తి మిగిలియున్నది. ఈ విషయము నాకలిగొన్న యొక మనుష్యుని భోజనముతో సరిపోల్చు నగును. కావలసిన పదార్థము లన్నిటిని భుజించి చివర మజ్జిగలో గూడ భుజించిన వానికి వాని యాకలి యంతయు సంతృప్తి పడుటచేత నిక నేపదార్థమును దిన నొల్లదు. అట్లుగాక మూడువంతులు భోజనముచేసి చివర మజ్జిగ యన్నము భుజింపకుండ లేచిన మానవునకు కొద్దిగా నసంతృప్తిగా నుండును. ఆ కారణమున మరి యేయితర పదార్థమునైనను దిన నిష్పము జూపును, అందుచేత నతనిని యసంతృప్తునిగా నెన్నవచ్చును. మూడువంతులు యాకలిని యితర పదార్థముల వలన సంతృప్తిచేసి యుండుటచే నీతని కొద్దిపాటి యసంతృప్తునిగా నెన్నవలసి యున్నది. హెమోగ్లోబిన్ సంయుక్తాణువు నిట్టి యసంతృప్తుని లాంటిది. అందుచే

నేయితర పరమాణువులైనను నొరకినచో నాకర్షించుటకు కొద్దిపాటి శక్తి యింకను మిగిలియున్న సంయుక్తాణువుది.

రక్తము హృదయమునుండి యూపిరితిత్తులలోనికి పంపబడగానే అందు బహు చిన్న గొట్టములద్వారా ప్రవహించి, యా గొట్టము (నాళములు)లకు చుట్టునున్న ఆక్సిజన్ (ప్రాణవాయువు)లో సన్నిహితమగును. అప్పుడు హెమోగ్లోబిన్ సంయుక్తాణువులు ప్రాణవాయు పరమాణువుల నాకర్షించి వాటితో ననుబంధము నేర్పరచుకొనును. ఇట్లేర్పరుచుకొనుటచేత ఆక్సి హెమోగ్లోబిన్ అను నూతన సంయుక్తాణువు లేర్పడుచున్నవి. అదివరకు లేత యెరుపు రంగుగల హెమోగ్లోబిన్ ఈ యనుబంధ మేర్పడిన పిమ్మట ముదురు యెరుపు రంగు గలది యగును. ఈ స్థితిలో తిరిగి హృదయ కుహరమునకు వచ్చి శరీరమంతట వ్యాపించుటకు నాళములద్వారా యావలకు పంపబడును. శరీరమున ప్రవహించునప్పుడు సీసబలముగా ననుబంధింపబడిన ఈ ప్రాణవాయుపరమాణువులు, కండరములచే నాకర్షింపబడి హెమోగ్లోబిన్ సంయుక్తాణువునుండి జారిపోవుచుండును. రక్తము వ్రేళ్ళ చివరకు, కొసలకు ప్రవహించుసరికి ప్రాణవాయుపరమాణువు లన్నింటిని గోలుపోయి రక్తము తన పూర్వరూపమైన లేత యెరుపురంగు గలినదగును. ఈ స్థితియందు సంయుక్త హెమోగ్లోబిన్ అణువు లసంతృప్తిని బొందుచున్నవి. అచ్చటినుంచి సన్ననిసిరలద్వారా పెద్దనాళముల లోనికి వచ్చి యవి యనేకము లేకీధవింతుటచేత చివర కొక గొట్టముద్వారా తిరిగి హృదయమును జేరును. ఈ యసంతృప్తస్థితిలో యూపిరితిత్తులలోనికి బోయి యచ్చట తిరిగి ప్రాణవాయు పరమాణువుల సంయోగముచేత తృప్తిపడి శరీరములో ప్రవహించును. ప్రవాహగతిలో నసంతృప్తమై హృదయమును చేరును. ఇట్టి పరిస్థితియే జీవనము. ఈ క్రియలు సాగనిచో నది మరణావస్థ. ఒక్క రక్తప్రసారమందేగాక

అనేక చోట్ల నిట్టి తృప్తి యసంతృప్తులు మాంసకృత్ జగువులందు నిరంతరము సాగుచుండుటచే శరీరములు చేతనాస్థలో నుండును. అతియగాక జీవప్రాపు (జీవపదార్థము) తనయందుగల మిశ్రమపదార్థములను కొన్నిటిని మార్పుచేయుచు, మరికొన్నిటిని ఉత్పత్తిచేయుచు నుండును. ఇది యనేక సంయుక్త పదార్థముల కూటమి. ఇందు మాంసకృత్తులు, పిండిపదార్థములు, కొప్పుపదార్థములు, పంచదార జాతికి జెందిన పదార్థములు, విటమినులు, ఎస్జైము మొదలైన అనేక పదార్థములు కూడియుండును. దీనిని 45° పైన వేడిచేసినచో నిందుగల జీవశక్తి నశించును. అటులనే 15° ల చల్లదనముగుండ అది నిర్జీవమగు చున్నది. వేడిచేసిన మాత్రాన బానిస్వరూప స్వభావములు వెంటనే సూరిపోవుచుండుటచేత నింతనరకును జీవప్రాపుయొక్క యభాస్వరూపము తెలుసుకొనుట కలవిగాకున్నది. అతియగాక చరి యే యితర రసాయనవిమర్శకునుగూడ నందక యవిశ్లేయముగా నున్నది. దీనికి 1. ఆహారస్వీకరణము, అనగా యితర పిండి, పంచదార మొదలగు పదార్థములను గ్రహించి తనయందు లీనము జేసుకొని తద్వారా పెరుగుట. 2. తనయందు గల పంచదార జాతికి చెందిన పదార్థములను విభజింపగా బాగువులునువాయువును, నీరుగా ప్రాణవాయుస్వీకరణమునలన చేయుచు, యీ ప్రక్రియయందు కొంతశక్తిని ఉష్ణరూపమున పొందగల్గుచున్నది. 3. పెరుగుదల, ఆహారమును వెచ్చించి స్వపదార్థమును విస్తరింపజేయుశక్తి గల్గియున్నది. 4. సంకానము నుత్పత్తిచేయుశక్తి, అనగా తనవంటి జీవనశక్తిగల్గిన యింకొక, మరికొన్నిటిని ఉత్పత్తి జేయుచున్నది. 5. అతియకగాక జీవప్రాపు జ్ఞానమును కల్గియున్నది. నీరు, చలన, ఉష్ణము, తేజస్సు, చీకటి, గురుత్వాకర్షణశక్తి మొదలైన వాటిని గుర్తించి, తన కనువుగా వాటి యొక్కవలకు సర్దుకొని

కు మాత్రమున సరిపెట్టుకోగల్గిన శక్తిగల్గి యున్నది. పై నుదాహరించిన ఈ యైదు శక్తులును జీవప్రావును దాని సంయుక్తానుకూలకములను పొందుచున్నవి. ఈ యద్భుతశక్తులు లభించుటవలన జీవప్రావృత్తిములను నెరవేర్చు కలుగుచున్నది.

భూమండల పరిణామము

భూమండలసయస్సు 200 కోట్ల సంవత్సరములుగా నిర్ణయించిన వరకే తెలుపబడినది. ఈ మహాకాలము నయిదు భాగములు గి.

వయస్సు :

1. ఆర్కెజోయిక్ మహాయుగము (Archaean) 80 కోట్ల సంవత్సరములు.

2. ప్రొటెరోజోయిక్ మహాయుగము (Proterozoic) 65 కోట్ల సంవత్సరములు.

3. పేలియోజోయిక్ (Paleozoic) కాలము 35.5 న్నర కోట్ల సంవత్సరములు.

4. మెసోజోయిక్ (Mesozoic) కాలము 13.5 కోట్లు.

5. సినిజోయిక్ (Cenozoic) కాలము 6 కోట్ల సంవత్సరము.

మహాయుగములయందు జరిగిన మార్పులనుగూర్చి తగు వివరముగా విచారణ చేయుదము. ఇందు ఆర్కెజోయిక్ మహాయుగము కాలపరిమితిలో నన్నిటికంటె బెద్దదియును మొదటిదియున్నది. అవారవిస్తారమైన యీ మహాయుగమందు భూమండలము కారమును బొందుటయు, నందుగల విద్యుదగువుల సృష్టములవలన 98 మూలనస్తువుల యుద్భవమునకు కారణములు.

నున్నవి. అట్టి తొప్పులలో నిరంతరము క్రిందనున్న యగ్ని పైకి వచ్చుచుండును. సూర్యముననుండి సూర్యోల్కునద్ద చూచినచో పొగనొట్టము నుండి పొగవచ్చిన చందమున సత్యుష్ణమైన తేజోవాముపు వేగముగా నాకాశపథములోనికి బోవుచుండును. వీటిని యగ్నిపర్వతిము లందును. ఈ యగ్నిపర్వతములకు సమీపముననున్న కొండలుగూడ కరిగి నలువైపుల ద్రవించుచుండును. అగ్నిపర్వతములం దుద్భవించు తేజోవాముపుసెక్కు యుష్ణోగ్రత 4000 ల డిగ్రీలకు మించి యుండును. సాధారణముగా నిట్టి యగ్నిగుండములు పర్వతి పంక్తుల నడుమనే కానవచ్చుటచేత నట్టి గుండములుగల్గి వాటిని యగ్నిపర్వతిములని పిలుచుచున్నారు. ఒక్కొక్కచో నిట్టి యగ్ని బ్వాలలు సముద్రనుధ్యమునుండి గూడ వచ్చుచుండును. చుట్టను చల్లని యావరణ ముండుటచే నీ తేజోవాముపు అగ్నిపర్వతములదూరమువదిన రీతిని పలువది యాకాశములోనికి పోక వెంటనే చల్లబడి యచ్చట నొక గట్టివేల ద్వీపముగా నేర్పడును. ససిఫీక్ మహాసముద్ర మందుగల యనకవేల ద్వీపము లీ విధమున నేర్పడినవియే. తెట్టు క్రింద మాహాగ్నిగుండుటచే దానికి సమీపమున నున్న భూగర్భ పోరలు ఉష్ణాధికతకలిగి యుండును. ఆ యుష్ణము పైపోరలకు గూడ నెగబ్రాకుచుండును. అందుచే భూమిపై భాగము, స్థానర, జంగమ శీవులు భరించదగిన యుష్ణముగలదిగానున్నను, మన మొకపెద్ద గొయ్యిని మైశ్యకొలది లోతున దీసినచో పోనుపోను క్రింది పోర లధికోష్ణము గలవిగా నుండును. భూమ్యుపరిభాగపు ఉష్ణోగ్రత. కంటే స్రతి 100 అడుగుల లోతునకు నొక డిగ్రీ యధికమగుచుండును. అమెరికాలో 4000 అడుగుల క్రింద 113 డిగ్రీల ఉష్ణముండును. ఆఫ్రికాలో 8000 అడుగుల క్రింద 100 డిగ్రీలు మాత్రమే గలదు. ఇంగ్లండు దేశమున 3000 వేల అడుగుల క్రింద 170 డిగ్రీలు ఫారా

కోట్ అనగా 80 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉండును. భూగర్భమందు గల ఈ మహాగ్ని ప్రాతిపదికలోనుండి క్రమమున చల్లబడుచు రాగా విగీలిన శేషమని పూర్తిగా చెప్పటకు వీలులేదు. ఏలన, భూగర్భమందుగల ఫ్లోరియమ్, యురేనియమ్ మొదలైన మూలనస్తువుల వరకు రేణువులు నిరంతరము బ్రష్టలగుచుండుటచే కలువడు మహత్తర అగ్నికోలలు గూడ నిందు కలిసియుండును.

భూగర్భమందుగల వేడి ద్రవమునకు సాంద్రత 12. చల్లబడుటచే నది పిన్డరింగ్ గడ్డగట్టుటచేత నీ తెట్టుయొక్క సాంద్రత 4.5 మాత్రము. ఈ తెట్టు పొరలు పొరలుగా నేర్పడియున్నట్లు గన్పించుచుండును. ఒక్కొక్క పొరలో నొక్కొక్క తరగతి వస్తువులు కన్పించుచుండుటచేత నీ పొరలకు వయోనిర్ణయము చేయుటకు వీలున్నది. ఒకపొరలో బంగారపు గనులు దొరకును. వేరొక పొరయందు పాదరసము లభించును. మరొకదానియందు బొగ్గు, సైంధవలవణము, సూరేశకారము, మైలు తుత్తము మొదలైన వస్తువులు దొరకుచుండును. ఇంకొకటి నయస్సుగల పొరలమధ్య చిరుతవయస్సుగల పొరలుగూడ ఉండును. పొరలవయస్సు అందుండు రసాయన పస్తుసామగ్రిని బట్టియు, సిలీమయ మగు నృక్షకాండములనుబట్టియు, అందుగడు జంతు అస్థివంజరములను బట్టియు, వాని యావలులను బట్టియు నిర్ణయింపనగును. విపుల పరిశీలన జేయుతరి యీ పొరలందు తెట్టు మధ్యమధ్య కదల్చబడి నానావిధములైన స్థూలకణములు పొందినట్లు గోచరించును. ఒక నస్తువు కొన్ని లక్షల సంవత్సరములలో నొక తరగతి రూపమును జెందును. మరికొన్ని లక్షల సంవత్సరములు గడచునరీకి పూర్వరూపముపోయి నూతన రూపమును ధరించును. ఇందు కుదాహరణగా నిసుకను దీను కొనవచ్చును. ఇసుకయందు బహుసన్నని రాతి రేణువులు గన్పించును. అనేక చోట్ల నొకకు యిసుకల నొకచోనుంచి వర్షించినచో

నందు ముతక, సన్నము, యీ ముతక సన్నములకును మధ్య అనేక తర గతులు కన్పించును. కొన్నిచోట్ల చిన్న రాళ్ళకు యిసుక రేణువులకు నగుమ మధ్యరకపు సన్నరాళ్ళు నొరకును. రాక్షాశ్వరమున్నదీవి (పాంబ్) పరిసరములలో కొన్ని స్థానముల పొడవున చన్నియు కంట గింజలంత రాళ్ళు గలవు. వీటిని చూచినవారి కెల్లరకు, గులకరాళ్ళు క్రమక్రమముగా శిఖలములైపోయి యిసుకగా మారియుండవలయునని తోచక మానదు. ఇట్టిమార్పు జరుగుటకు కొన్నిలక్షల సంవత్సరములు వట్టును. మరికొన్నిచోట్ల యిసుక నేలను లోతుగా త్రవ్వచున్నప్పు డందు యిసుకగడ్డలు కన్పించును. ఈ గడ్డలయందు యిసుక రేణువు లన్నియు కలసియున్నట్లు ప్రత్యక్షముగా చూడవచ్చును. అట్టి గడ్డలు మామూలుగాళ్ళవలె గట్టిగానుండును. ఇట్టి కొన్ని రాళ్ళను జూడగా నవి త్రొడు మాదిరిగా మెలిదిరుగుటగూడ జూడవచ్చును. ఈ దృశ్య మును జూచిన వారికి యిసుకతిన్నెల యందు లోతుననున్న యిసుక, పైనున్న బరువుచే ఒత్తిడికిలోనై కొన్ని లక్షల సంవత్సరములకు గాయిగా మారుచున్నదని తెలియును. ఇట్టి మార్పు లనేకములు భూగర్భమునందు జరుగుచుండును. అంతియగాక, భూగర్భితమైన యగ్నిద్రవము (లావా) పైకి ఉద్రేకించి పోవునప్పుడు మండలమధ్య మున బరువును సర్వకొనుటలో ననేక మార్పులు జరిగి వాటి ఫలిత ముగా భూమి కంపించును. ఇట్టి భూకంపములు వచ్చినప్పుడు కొన్ని పర్వతములు క్రిందకు దిగిపోవుట, నీటి సరస్సులు పెద్దపెద్ద నెరలుదీసి యండలినీరు హరించిపోవుట, దూరముగనున్న రెండుకొండలు దగ్గరగా వచ్చుట మొదలైన యనేకమార్పులు జరుగును. లావా సముద్ర మధ్యంబున నుద్రేకించి ద్వీపము లుత్పత్తియగుతరి వందలాది యడుగుల యెత్తున కెరటములు బయలుదేరి మెరకభూమిపైబడి యనేక మార్పులను కలుగ జేయుచుండును.

అంతియగాక దగ్గరగానున్న రెండు దీవులు పరస్పర మాకర్షించు కొని కొంతకాలమున కవి కలసి యొక పెద్ద దీవిగా నేర్పడును. సముద్ర మందుగల యంతర్వాహినుల తాడనమువలన కొన్ని పొడవుగానున్న పెద్ద దీవులు, రెండుగాను, మూడుగాను విభజింపబడుటయు గల్గును. శాంబా ద్వీపమునకు దగ్గరగా, సుమారు 8, 10 మైళ్ళ దూరమున, క్రూసె ద్వీపములు మూడు గలవు. అవి బహు చిన్నవి. వాటి చుట్టు కొలత యొక మైలుకు మించియుండదు. ఈ మూడు ద్వీపములును ప్రస్తుతము దూరదూరముగా నున్నవి. వాటిమధ్య సుమారు 1, 2 మైళ్ళ పర్యంతము లోతైన సముద్ర మున్నది. అవి మూడును రెండువందల సంవత్సరములకు బూర్వము కలసి యొకే పెద్ద పొడవైన ద్వీపముగా నుండెడినట. కొన్ని లక్షల సంవత్సరములకు బూర్వ మిప్పటి ప్రపంచ పటములోనున్న మాఝిగా పరిస్థితులు లేవు. అప్పు డీ మధ్యధగాన ముద్ర మింత విస్తరించి లేదు. స్పెయిన్ (Spain) దేశ మాఫ్రికా ఖండ ముతో గలసియుండెడిది. ఇటలీ దేశపు భూభాగముగూడ నాఫ్రికా గడ్డతో నైక్యముగా నుండెడిది. అప్పు డెర్రసముద్ర మింత పొడుగుగా నుండక అరేబియా దేశమునకును, ఆఫ్రికాకును మధ్య కొంతదూరము మాత్రముండుటచే నరేబియా దేశ మాఫ్రికాతో కలిసిపోయి యుండెడిది.

పషియాఖండములో కాశ్మీర దేశము లగాయతు కలకత్తా వరకు భూప్రదేశ మేర్పడక, యిప్పుడు హిమాలయపర్వతములచే నావరింప బడిన ప్రదేశ మంతయు సముద్రముగా నున్నది. వింధ్యపర్వతము లగాయతు హిందూ దేశపుగడ్డ త్రిభుజాకారముగా సింహళముతో నేకీ భవించి యుండెడిది. అప్పు డీ గడ్డ యన్ని వైపులను సముద్రముచే చుట్టబడి యొక దీప్వమువలె నుండెను. చైనా, టిబెట్టు మొదలైన దేశములు గల గడ్డ కొన్ని వందలమైళ్ళవరించి యున్న సముద్రమున కావలియొక్కన నుండెడిది. ఇట్లుండిన పరిస్థితిలో నీరెండు భూగడ్డలు

ఒకదాని నొకటి యాకర్షింపఁగానినవి. దానిఫలితముగా నీగడ్డలు దగ్గర బడుట కారణించినవి. అప్పుడు నీటి మధ్యనున్న సముద్రము క్రమముగా లోతు తగ్గిపోవుట కారణించి మొరక వేసుకొని పోగానెను. ఈ సంఘటనను కాంటి నెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అని యందురు. కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు గడుచు సరికి సముద్రపులోతు తరిగిపోయి భూభాగములో సమానమట్టమునకు వచ్చుటేగాక ఆ ప్రదేశములో నెత్తైన పర్వతములు గూడ యుత్పన్నమగునంతవరకు నీరెండు భూగడ్డలు దగ్గరగా వచ్చినవి. వాటి యొత్తిడి మూలమున మధ్య ప్రదేశమున హిమాలయ పర్వతము లేర్పడినవి. ఈ చుట్టుతరస్థుటన మాశ్చర్యకరముగాను, దురూహ్యముగాను గన్పట్టినను. ఒక చిన్న యుదాహరణ మూలమున నిది యేలా సంభవమో నిరూపింపవగును. ఒక చిన్న యిసుకనేల గల గుంటలో దిగి 4, 5 అంగుళముల లోతున మాత్రము నీరున్న చోటున రెండు చేతులు దూరముగా నిసుకలో కూరి, అవి దగ్గరనా గాబట్టిన, క్రమముగా చేతుల మధ్యనున్న నీరానలకుబోయి యచ్చట మొరక యగుచునచ్చి, రెండు చేతులు బహుసన్నిహితములైనప్పుడు వాటి మధ్య యిసుక యొక ఎత్తైన గొప్పగా నేర్పడును. ఇది జనసామాన్య అనుభవము. అటువలెనే, దక్కను భూగడ్డయు, టిబెట్టులగాయతుగల ఏషియా భూగడ్డయు నొకదాని నొకటి యాకర్షించి సన్నిహితమగునప్పుడు వాటిమధ్య నున్న భూప్రదేశ మిరుకెలంకుల ఒత్తిడికి లోనై యెటు సర్దుకొనుటకును వీలులేక మధ్య వేసుకొని యచ్చట నొక గొప్పగా నేర్పడును. ఆ విధముగా హిమాలయ పర్వతము లేర్పడినవి. అందుకు తార్కాణముగా హిమవత్పర్వత ప్రాంతములలో నందందు పరిశోధకులు ద్రవ్వినప్పుడు బహు పురాతనములైన సముద్రపుచేవల యస్థి పంజరములు గాన్పించుచున్నవి. ఇప్పుడు నేలగా కన్పించు ననేక

ప్రదేశములు కొంతకాలము క్రిందట సముద్రములో నున్నవని నిర్ణయించుటకు ననేక గుర్తులు గలవు. సముద్ర ప్రాంతముల నున్న కొన్ని యిసుకకొండలు దీనికి నాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి. విశాఖపట్టణమందు గల యెత్తైన యిసుకదిబ్బలు, కొంతకాలము క్రిందట ఆ భూప్రదేశము సముద్రముక్రింద నుండుటచే నుత్పన్నమై యుండవలయును. అట్లుగానిచో నవి యేర్పడుటకు మేఘ కారణము గానరాదు.

ఇంతియగాక ఇప్పటి నల్లసముద్రమును, వర్షియా సముద్రమును, గలసి యొక పెద్ద మధ్యధరాసముద్రముగా నుండెడివి. రానురాను అవి విడిపోయి రెండు సముద్రములుగా మారినవి. బరహంపూరుపైన కలకత్తాకు బోవు రైలు మార్గమున గప్పట్టు చిలకసరస్సు పెద్దకాలము క్రిందట బెంగాలు సముద్రముతో నేకీభవించి యుండినది. కాని యిప్పుడట్లుండక నది యొక సరస్సు మాదిరిగా నుండి దానికిని సముద్రమునకును మధ్య భూభాగ మేర్పడియున్నది.

ఆకారములోనే గాక భూమండలములోని వాతావరణ స్థితులలో గూడ ననేక మార్పులు కలిగినవి. పూర్వపు మహాయుగములలో వాన లభికముగా కురియుచుండెడివి. గాలినానలు, ఉప్పెనలు, భూకంపములు గూడ నిప్పటికంటె ననేకరెట్లభికముగా నుండెడివి. ఇప్పటి రష్యా, యూరప్ లలో కొంతభాగము, ఇంగ్లండున్న ప్రదేశము, ఉత్తర సముద్ర ప్రదేశము, డెన్ మార్కు, ఫిన్ లాండు మొదలైన ప్రదేశములు ఒక పెద్ద మంచుగడ్డ వలన నావరింపబడి దానిక్రింద లక్షలకొలది సంవత్సరము లున్నవి. వీటిని “గ్లేషియర్స్” అందురు. ఈ యుగమును మంచుమహాయుగ మనవచ్చును. క్రమముగా మంచు కరిగిపోయినచోట్ల నంతటను భూభాగము బయటబడుచు వచ్చెను. ఇట్టి మంచుమహాయుగములు ఒకటేగాక భూమికి, రెండు, మూడు

చడిచినట్లు తెలియుచున్నది. మంచుమహాయుగములు మింగోయిక్ మహాయుగమం దుండెడివి.

సీటియావిరి నర్వముగా మారుట ప్రారంభించిన తర్వాత నవి కొండలమీద కురిసి వాగులు నదులు ప్రవహించుట శారంభించినవి. పత్రికాలున నొకే నియమితహార్గమున పోక ఒక్కొక్క సంవత్సర మొక్కొక్కహార్గము ననుసరించి పల్లపుప్రదేశములోనికి పోయెడివి. కొన్నివేల సంవత్సరము లట్లు ప్రవహింపగా వాటివారిలోని గాఢ్యులరిగి పల్లమై యొక నియమితహార్గ మేర్పడినది. దానిగుండా ప్రవహించుట కల్గిన తర్వాత యవిస్థిరహార్గము లైనవి.

కొన్నిలక్షల సంవత్సరములకు పూర్వము హిమనత్పర్వతప్రాంత మిప్పటికంటె యెక్కుగా నుండెడిది. తరుచుగా పెద్దవర్షములు వాటి మీద కురిసి యాకొండలమీది రేగడ క్రిందికి నదులమూలమున కొట్టు కొని పోయినది. ఈ నదులు ప్రాతిపదికలో చాల తక్కువలోతుగల్గి యెక్కువ నెడల్పున ప్రవహించుచుండెడివి. గానుగాను నదిత్రోవలో నున్న రేగడ సముద్రములోనికి కొట్టుకొనిపోబడి యవి లోకై నవి. ఇందు కుదాహరణగా నైనాయం దిప్పటికిని నియమిత హార్గమును పొందక సంవత్సరమున కొకహార్గమున ప్రవహించు నది యొకటి గలదు. అట్టి నదులవలన నేలేకూ యపరిమితమైన జననప్రమా, గృహనప్రమా కల్గుచుండును.

కొన్నివేల సంవత్సరములు హిమనత్పర్వతములమీది రేగడ మన్ను పైన వినరించిన మాదిరిగా కొట్టుకొని పోవుటచే నావ్రదేశము లన్నియు నల్ల రేగడ గల్గి బహుగారనంతమైన భూములుగా నున్నవి. బెంగాల్ నందు కొన్నిచోట్ల నొక ఫ్లాంగులోతువరకు నీ రేగడ కన్పించుచున్నది. సింధు గంగా మైదాన ప్రదేశమంతయు నించు మించుగా నీ విధముగానే యుండుటచేత హిమనత్పర్వతము లొకప్పు

డత్తున్న తములై యుండెడివని చెప్పకలేప్పదు. గోగావరి, కృష్ణ, కావేరి మొదలైన నదులన్నియు లక్షలకొలది సంవత్సరములకు పూర్వ మింతలోతుగా ప్రవహించెడివిగావు. తక్కువ లోతుగల్గి యిరువైపుల యిరువది, పాతికమైళ్ళ వెడల్పున ప్రవహించుచుండెడివి. వాటిమాన్దమంతయు నల్లరేగడలో నింపుచు వచ్చినవి. అందువలన యీ నదుల కిరుపార్శ్వములయందు పదిహేనుమైళ్ళవరకు నల్లరేగడ భూము లేర్పడియున్నవి.

ప్రాతిపదికలో పాపాణమయమైన యీ భూగడ్డ యెండలకు పగిలి చిన్న చిన్న రాళ్లుత్పత్తియైనవి. నదుల ప్రవాహవేగమున యొరిపిడివలన రాళ్లు సన్నగిలుచువచ్చి చివరకు యిసుక రేణువులైనవి. ఇట్టి మాప్పు నూపించుటకు వీలుగా రామేశ్వరమువద్ద కందిగింజంత పరిమాణముగల యిసుక రేణువులుగల విశాలములైన యిసుక తిన్నెలు యిప్పటికిని కలవు. ఎత్తైన ప్రదేశములలోనున్ననీరు “నదీనాం సాగరో గతిః” అను న్యాయ ప్రకారము సముద్రములో కలియుట, తిరిగి సముద్రజలములనుండి మేఘము లుత్పన్నమగుట ప్రారంభమైనది. దీనినే వాడుకలో జలచక్రమందురు. కాలచక్రములో జలచక్రమొక యంతర్భాగము. ఈ రెండు చక్రములు చిరకాలమునుండి సాగుటవలన భూమ్యుపరిభాగమున సన్నని రేణువుల పూతలు ఏర్పడుచు వచ్చినవి. కొన్ని వేలసంవత్సరములకు యీ పూతలు చాల దళసరిని పొంది మన మిప్పుడు వాడే పంటభూములుగా మారినవి.

మన్నులోను, గాళ్ళలోను ఉండే ఔరము నీటిలో కరిగి, యట్టి నీరేతా సముద్రములో కలియుటచేత సముద్రజలము మొదట మంచి నీరేయైనను క్రమముగా ఔరోదకమయ్యెను.

వదిలక్షలు ఒక మిలియన్. భూమండలమందు జీవసృష్టి పరిణామమును తెలుసుకొనుటకు మిలియన్ల సంవత్సరములలో యెట్టి

హూమ్బలు కలిగినవో యూహించి యున్నారు. ఆ పరిణామము మెట్లు మెట్లుగా నుండి అనరోహణముగా కన్పించుచున్నది. ఈ క్రింది పట్టిలో జీవస్మృతి పరిణామావరోహణము సులభముగా ప్ర. హింపనగును.

సం॥ మొదటి మిలియను ల్లో	మహాయుగములు	ఆంతర్వికరములు	జంతుస్మృతి	వృక్షస్మృతి
50	నినోజోయిర్	క్వార్టేసరీ తెర్షియరీ	పారియ్య జంతువులు, వజ్రలు	పువ్వులు కాయలు కాయ మొక్కలు
100 150 200	మిసోజోయిక్	క్రీటేషస్ జూరేసిక్ బ్రయాసిక్	సజ్జీలు, బల్లి, మొసలి వంటి జంతువులు	పువ్వులు, కాయలు శేఖండా గింజలు మాత్రం గల చెట్లు
250 300	అపెర్షియస్ మహాయుగము	మేజ్యూస్ కార్బోనెస్	వీటిరోసు, మెక్సీకీ గూడ సవనంచగం జంతువులు కప్పమొద.	గింజలు కూడ కలిగి యుండని చెట్లు పెరిస్సు.
400		డెవోనియన్ వైబారియన్	చేపలు, వాటిలాంటి వీటి జంతువులు	శేరికరకవు పెరిస్సు. చెట్లుగా నేంపీక పాకు మొక్కలు మా పెస్సు.
450 500 550		అర్థోవీషియన్	వెన్నెముక లేని సముద్రపు జంతు జాలము, వంటభూముల పరిణామము	నారులు వీటిరోనే యండి జీవించినవి జంతువులవలె సంకల్ప గమనంగల మొక్కలు జీవవర్ణాస్మృతి.
600 700 800 900 1000		అపెర్షియస్	పర్వరములు నడులు ఏర్పడినవి. భూమి చల్లబడి యుండుట. నీటియావిరి తయారై మేఘము కర్పరినవి. తెలు యేర్పడుట కారంబుచెఱు.	జీవవర్ణాస్మృతి.
2000			భూమండలము వాయు గోళముగా మన్న వీతి.	

జీవపదార్థము

కాలక్రమమున ముందుప్రకరణములలో వివరించిన రీతిని అనుకూల ప్రతికూల విద్యుద్దాగువుల సమాగమముచేత చూలన స్తువుల పరమాణువులును, వాటి సంఖ్యీకృత సంఘటనలనల్ల నాణువులును ఏర్పడినవి. పిదప నీ యాణుపరమాణువులు అనేక లక్షల తెరగులుగా మిశ్రమముయి, మిశ్రమపదార్థము లేర్పడినవి. ఈ మిశ్రమపదార్థములు లక్షలాదిగా నున్నవి. 1. అచేతన మిశ్రమనస్తువులు 2. చేతన సంఘటనల నస్తువులు. మొదటి తరగతి మిశ్రమపదార్థము లన్నిటియందూ బొగ్గు మినహా మిగత మూలనస్తువు లుండవచ్చును. రెండవతరగతి నస్తువులలో బొగ్గుపాలు తిన్నకముండును. బొగ్గుపాలుగల పదార్థములన్నియు చేతనప్రపంచమువలననే సంఘటించబడవలసియున్నవి. మొదటి తరగతి పదార్థముల కా యిబ్బందిలేదు. అచేతన నస్తువుల సమ్మేళనల వలన సులువుగా నేర్పడగలవు. రెండవతరగతి పదార్థములు ఎక్కువగా బొగ్గు పరమాణువు నీటి యాణువులతో ననేక రకములుగా కలియుట చేత యేర్పడినవి. ఇవి చక్కెరలు, పిండిపదార్థములు. ఈ మిశ్రమ పదార్థములలో నత్రజని, గంధకము, భాస్వరముగూడ కొన్ని పాళ్ళలో కలిసి మిశ్రమపదార్థము లేర్పడినచో వాటిని (ప్రోటీన్స్) అందురు. వీటినే మాంసకృత్తులనిగూడ పిలుతురు. ఒక్కొక్క యోషధియందొక్కొక రకపు మాంసకృత్ పదార్థ ముండును. అనగా ప్రతియొక యోషధి తా నొక ప్రత్యేకమైన మాంసకృత్ పదార్థమును తయారు చేసుకొనుచుండును. అందువలన ప్రపంచములో మొక్కలెన్ని జాతులుగలవో యన్ని రకములైన మాంసకృత్తులున్నవని తలంపవలెను. అందు మానవునకు కొన్ని యుపయుక్తములు, మఱికొన్ని అనుపయోగములైనవి యగుచున్నవి. జంతు, మానవ శరీరపోషణలకేగాక

నీ మాంసకృత్తులు కొన్ని వ్యాధులను నివారించుటకుగూడ నుపయోగించును. నవీన వైద్యశాస్త్రమైన హోమియోపతియందు ప్రత్యేక మాంసకృత్తుల ప్రభాసము విఫలముగా వివరింపబడుచున్నది.

చేతన మిశ్రమ పదార్థములలో నీ మాంసకృత్తులే గాక, కొవ్వు పదార్థములు, కొవ్వుపదార్థరసములు, ఆల్బులాయిడ్స్, పెప్టోసీస్సు మొదలైన అనేక పదార్థములు గలవు. ఈ పదార్థముల సమ్మేళనము వలన నూతనపదార్థము లేర్పడుచున్నవి. ఎన్జైముస్, విటమినులు అనునవి బహు సంకీర్ణ సంయుక్త మిశ్రమ పదార్థములు. పై నుదాహరించిన పదార్థము లన్నియు ననగా ప్రోటీన్సు, కొవ్వుపదార్థములు వాటి రసములు, ఎన్జైముస్, విటమినులు మొదలైన అనేక స్తువులు ఒక రకపు నిష్పత్తిలో గుమిగా కలసి, అందు కొన్ని యొకదానిలో, నొకటి లీనమగుచును, మరికొన్ని విడివిడిగానుండియు, సంకీర్ణముగా నొకచో సంయుక్తమయిన పదార్థము, జీవపదార్థము (Protoplasm). ఈ పదార్థము బహు క్లిష్టమైనదియై యుండుటచేత రసాయన విమర్శకు లొంగదు. విమర్శకు వేడి హెచ్చించినచో యీ పదార్థ సముదాయము విడిపోయి యొక్కసారిగా ననేక మార్పులను జెందును. అందువలన దీనియందుగల మిశ్రమ పదార్థముల పరస్పర పరమాణువు లేనిస్పత్తిలో నున్నవో తెలుసుకొనుటకు వీలు చిక్కకున్నది. తెలుసుకొనుటకు వీలైనంతవరకు విమర్శించి చూడగా నందు నూటికి తొంబది సాళ్ళు నీరు, మిగత పదిసాళ్ళ యందును అయిదువాళ్ళు చేతన పదార్థములు, మిగిలిన ఐదుసాళ్ళు అచేతన మిశ్రమ పదార్థములు కలిసి యున్నట్లు తెలియుచున్నది.

అచేతన పదార్థములలో సామాన్యముగా నుండునవి 1. భాస్వరము, 2. నత్రజని, 3. గంధకము మొదలైన వస్తువుల ఔరములు,

లోహములలో, యినుము, మెగ్నీషియమ్, పొటాషియమ్, సోడియమ్, కాల్షియమ్ మొదలైనవి తరుచుగా నుండును. చేతనపదార్థ బాతి లోనివి, ప్రోటీన్సు, ఎన్ జైము, కొవ్వు, పిండి, చక్కెర వగైరా మిశ్రమ పదార్థములు. ఇంగు “ఎన్ జైము” అను బాతి చేతన మిశ్రమ పదార్థములు; జీవపదార్థమున కెక్కున ఉపయోగకరములు. వీటి సహాయమువలన ఒక మిశ్రమ పదార్థము, మరియొక మిశ్రమ పదార్థముగా మారుచున్నది. ఉదాహరణకు కొన్ని వినరింటును. స్ట్రాకోజు పిండి పదార్థముగాను, పిండి స్ట్రాకోజుగాను అతి సులభముగా మార్చుగును. అట్టి మాయులు చేయగల్గిన ఎన్ జైము (Engyme) పేరు డయాస్టేజు (Diastase). ఒక్కొక్క ఎన్ జైము యీలాంటి మాయులను ఒక్కొక్క పదార్థముకు మాత్రమే తీసుకొని రాగల్గును. అటువలెనే ప్రోటోయోక్ అను ఎన్ జైము ప్రోటీన్సు స్ట్రాకోజుగాను, స్ట్రాకోజు ప్రోటీన్సుగాను మార్చగలుగుచున్నది. లిపేజు అను ఎన్ జైము నూనె పదార్థమును స్ట్రాకోజుగాను, తిరిగి స్ట్రాకోజును నూనెపదార్థముగాను మార్చుచేయగలదు. ఇటువంటి ఎన్ జైములు, సూర్యకొలది యున్నట్లు తెలియుచున్నది.

చెట్లయొక్క ఆకులలో ‘క్లోరోఫిల్’ అను హరితవర్ణము గల పదార్థమున్నది. ఇది నీటి యణువులను, గాలిలోనుండు బొగ్గువులును వాయువణువులను సూర్యరశ్మి సహాయమున సంయుక్తము చేయుచుండును. అరు నీటి యణువులు, అరు బొగ్గువులునువాయువణువులు సంయుక్తము చేయగా ఒక స్ట్రాకోజు అణానయి అరు ప్రాణవాయు వణువులు మిగులును. ఇవి యారును బహిర్గతమగును. అకులలో నిట్టి క్రియ పగలంతయు జరుగుచుండును. దీనిని కిరణజన్యసంయోగక్రియ (Photo Synthesis) అందును. తయారయిన స్ట్రాకోజంతయు నీటిలో కరగిపోవును. అట్లు స్ట్రాకోజు ఎక్కువగా కరగియున్న నీటి కొక

విధమైన యాకర్షణశక్తి కల్గుచున్నది. దీనిని "ఆస్మాసిన్" అందును. కరిగిన పంచదార యెక్కువగా నున్నచో నీ శక్తి యెక్కువగును. తక్కువగా కరిగియున్నచో తక్కువగా నుండును. ఆకులలోనున్న ద్రవమునం దీశక్తి మామూలుకంటె యధికమైనచో నది యిబ్బందికర మగును. కనుక తయారయిన గ్లూకోజు తయ్యపుట్టినచోటనేయున్నచో 'ఆస్మాసిన్' శక్తి మిక్కుటమై యనర్థహేతు పగుచుండును. ఆకారణమున వెంటనే గ్లూకోజును పిండిగా మార్చినచో, పిండి నీటిలో లీనముగా నేరదు గనుక ఆస్మాసిన్ శక్తి పెరుగుట కవకాశముండదు. అప్పుడు డయాస్టేజి ఎంజైము గ్లూకోజును వెంటనే పిండిగా మార్చివేయును. పిండికి, గ్లూకోజుకు తేడా ఒక నీటియణువు. గ్లూకోజు అణువునుండి ఒక నీటియణువును బయటకు పంపినచో నది పిండియణువు అగుచున్నది. పిండియణువు కొక నీటియణువు సంయుక్తము చేసినచో నది గ్లూకోజగుచున్నది. ఈ మార్పు చిన్నదిగా కన్పించినను, రసాయన శాలలలో చేయవలెనన్న దుస్సాధ్యము. ఇంతవరకును అట్టిమార్పులు చేయగల్గిన శాస్త్రజ్ఞులు కన్పింపరు. అంత దుస్సాధ్యమైన మార్పులను ఎంజైము అత్యంత సులభముగా మామూలు ఉష్ణపరిస్థితులలో సంఘటింపజేయగల్గుచున్నవి. కనుక నిట్టి జీవపదార్థములు జీవపదార్థమున కత్యంతసహాయకారులు. దీనికి మరొక యుదాహరణ. కల్లునందు 'యీస్ట్' అను కుక్కగొడుగులజాతికి జెందిన మొక్క యొకటి యుండును. ఇది చాల నూత్నజీవి. భూతద్దములద్వారాగాని కన్పించదు, ప్రాణవాయుసహాయములేకనే యుచ్ఛ్వాసించును. జై మేజ్ అనే ఎంజైము సహాయమున గ్లూకోజు అణువులను భంజించి, ఒక్కొక్క గ్లూకోజు అణువుకు, రెండుసారాయి అణువులు (Alcohol), రెండు బొగ్గుపులుసువాయువణువులు తయారుచేయుచుండును. ఈ విభజన క్రియలో బయల్పడు శక్తివలన నది జీవించును.

ఎక్కడై ములవలెనే విటమినులుగూడ చేతన మిశ్రమ పదార్థముల తరగతివి. ఇటీవల వీటిని గురించి యధికముగా పరిశోధనలు సాగించిరి. మనము తిను పదార్థములయందు పాలు, పెన్న, ఆకుకూరలు, పండ్లు మొదలైన వాటిలో నీ విటమిను లధికముగా నున్నవి. ఇని అన్నియు మానవశరీరము నారోగ్యవంతముగా నుంచుటకు సహాయకారులు. మామిడిపండ్లయందు ఎ, బి, విటమిను లధికముగాగలవు. ఉసిరికకాయ లందును, నారింజపండ్లయందును 'సి' విటమిను చాల కలదు. 'ఇ' అను విటమిను గోధుమలయందును, బీజాంకురము జరుగునప్పుడు కొబ్బరి కాయలోపల పెరుగు పువ్వునందును కలదు. విటమినులన్నియు జీవ పదార్థమున కత్యంతసహాయము చేయుచుండును.

జీవపదార్థము స్థూలదృష్టికి ఒక జిగురు మాదిరిగా ప్రవర్తించు చున్నట్లు కన్పించును. జిగురు నీటిని బీల్చి ద్రవావస్థను బొందుటయు, నీటిని వదలి ఘనావస్థను బొందుటయు సహజము. జీవపదార్థముగూడ నట్లే నీటిని పీల్చుటకు, వదలుటకు సామర్థ్యము కలిగియున్నది. ఇది వర్ణరహితమై స్వచ్ఛ స్ఫటికముగా, ఘన, ద్రవావస్థలకు మధ్యరకముగా నుండు జిగురు పదార్థము. పోటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ నందు కరిగి పోవును. 45 డిగ్రీలకు మించనియు, 5 డిగ్రీలకు తగ్గనియు ఉష్ణోగ్రత యందు మాత్ర మీ పదార్థము జీవశక్తి కల్గియుండును. అట్లుగాక అధిక ఉష్ణముగాని, శీతలముగాని ఉన్నచో నీ పదార్థము తన జీవ శక్తిని గోల్పోవును.

జీవపదార్థసామర్థ్యములు

అనేక మిశ్రమపదార్థముల సముదాయమగుటచేతనో మరి యే యితర దైవికసంకల్పముననో గాని, యీ జీవపదార్థమునకు ఉత్కృష్ట సామర్థ్యములు గల్గినవి.

1. ఆహారస్వీకరణము :- తనకంటె భిన్నమైన పదార్థములను తనలోనికి తీసుకొని, వాటిని జీర్ణించుకొని తననంటి పదార్థమును సృష్టించుట. జంతువులన్నియు కండరములు, రక్తమాంసములు కలవి. అవి తిను ఆహారము పచ్చిక, ఆకులు మొదలైనవి. వీటిని జీర్ణించుకొని జంతువులు తమ కండరముల నభివృద్ధి చేసుకొనును.

2. మలవిసర్జన :- అరిగించుకొనగా మిగిలిన పదార్థములను శరీరమునం దుంటే హానికరములని యీ జీవపదార్థ మనేకవిధములుగా నావలకు త్రోసివేయుచుండును. అందుచేత, అనసర, బేయవ సరములను తెలుసుకొను జ్ఞాన మీ పదార్థమునకు గలదు.

3. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు :- ప్రతి జీవపదార్థముగూడ ప్రాణ వాయువును గైకొని బొగ్గువులుసువాయువును విడుచుచుండును. ఈ క్రియయందు కొంత ఆహారము వెచ్చింపబడి ఉష్ణశక్తి విడుదలగుచుండును. ఉష్ణరూపముననున్న శక్తి యన్ని జీవులకు జీవనాధారమై యున్నది.

ఈ క్రియ జీవులు జీవించియున్నంతకాలము జరుగవలసినదే. అది యాగిపోయిన స్థితి మరణావస్థ. జంతు జాతులయందు రక్తమనే ద్రవ పదార్థము ప్రతి శరీరమందును ప్రవహించుచుండును. అనేక చేతన మిశ్రమ పదార్థము లీరక్తమం దుండును. అవి కడపటి మార్పులో గ్లూకోజుగా నయి, ప్రాణవాయు స్వీకరణము వలన ఈ గ్లూకోజు అణువులు విడగొట్టబడి, ఆరు నీటి అణువులు, నారు బొగ్గువులుసువాయు అణువులు విడుదలగుచుండును. ఈ విచ్ఛిన్న క్రియయందు శక్తి యుష్ణరూపమున బహిర్గత మగును.

4. చైతన్యము :- అనగా బాహ్యప్రపంచములో గల యితర శక్తులు జీవపదార్థముపై యావేళించి నప్పుడు దానిని గుర్తించి

తడనుగుణముగా వ్రవర్తించు సామర్థ్యము (Irritability). ఈ సామర్థ్యము చేతనపదార్థములకు లేదు. జీవపదార్థములన్నియు కాంతి, ఉష్ణము, నీరు, మొదలైనవి సన్నిహితములైనప్పుడు వాటిని కావలసినంతవరకు గ్రహించుట, అవసరమైనదానికంటె పరిమాణ తీక్షణత యెక్కువగా నున్నప్పుడు పైవాటియందు విముఖత్వము కనపరుచుట మొనలైన క్రియలు జరిగించు సామర్థ్యమే చైతన్యముగా భావించుచున్నారు.

5. సంతానకాంక్ష :— ప్రతి జీవికి ముఖ్యమైనకోరికలు రెండు: అందు మొదటిది-స్వశరీరపోషణ, రక్షణ. రెండవది-సంతానకాంక్ష. ఈ రెండు కోరికలులేని జీవి సృష్టియందులేదు, తననుబోలిన మరికొన్ని జీవుల నుత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యము జీవులకే యున్నది. ఒకరాతికిగాని, యినుపముక్కకుగాని ఈ సామర్థ్యములేదు.

6. సృష్టిచక్రము :— అనగా జననము, పోషణము, ముదిమి, మరణము మున్నగు యవస్థలు ప్రతి జీవికిని గలవు. ఇది జీవధర్మము.

పై స్వభావ సామర్థ్యములు జీవపదార్థమునకు కలుగుటకు దాని యంతస్వరూపముగాని, దైవసంకల్పముగాని కారణములు గానచ్చును. ప్రాతిపదికలో యీ పదార్థమునుండి (Viruses) వైరస్ జీవు లుత్పన్నమైనవి.

వైరస్ జీవులు

ఇవి సూక్ష్మోతిసూక్ష్మజీవులు. నేటివరకు కనిపెట్టబడిన భూతద్దములుగూడ వీటిని గోచరింపజేయజాలవు. వీటియునికి మానవులకు, జంతువులకు, వృక్షములకు వచ్చు రోగములవలన గుర్తింపబడుచున్నది. మానవులలోవచ్చు స్ఫోటకము, పొంగు మొదలైన వ్యాధు లీ తరగతి జీవులవలన కలుగుచున్నవి. చంటిపిల్లలకువచ్చు ప్రమాదకరమైన

“డిఫ్టీరీయా” అను గొంతులోని రోగము, పక్షవాతముగూడ వీటి వలననే వచ్చుచున్నవి. మంచిగంధపు మొక్కలకు వృక్షజీ జబ్బుకూడ వైరస్సులవలననే అని కనుగొనబడినది. ఈ వైరస్సుచాతి జీవులను “బెర్నార్డ్” అను శాస్త్రజ్ఞుడు సీసాలయందు కొన్ని సంవత్సరములుంచి పిదప ప్రాణులమీద వదలగా నవి యథాప్రకారముగా జంతువులమీద, చెట్లమీద వృద్ధిపొంది వ్యాపించినవి. దీనినిబట్టిచూడ నవి కొన్నిసంవత్సరములపాటు ప్రత్యేకముగా గాలిలేని ప్రదేశముం దుంచబడినను సజీవులై యుండగల్గునని తెలియుచున్నది. సీసాలోనున్నంత కాలము వృద్ధి క్షయములు లేక ప్రోటీను క్రిష్టల్సు మాదిరిగా నుచ్చాస్యనిశ్వాస రహితములై యుండి, జీవులదేహములలోని కెక్కించినది మొదలు వృద్ధిపొందుట కారంభించుచున్నవి. చేతనస్పృష్టియం దంతటను ఉచ్చాస్యనిశ్వాసములు తప్పక జరుగుచుండును. అచేతనస్పృష్టికి జెందిన ఉష్ణ, రాళ్ళు, మైలుతుత్తమునందును, వృద్ధిక్షయములుగాని యుశ్వాసనిశ్వాసములుగాని కాన్పించవు. ఉనికినిబట్టి అచేతనస్పృష్టివలెను, చేతనస్పృష్టికి సంబంధించినవానివలెను గూడ కన్పించుచుండుట చేత సీ వైరస్ జీవులు, చేతనప్రపంచమునకును, అచేతన ప్రపంచమునకును మధ్యరకముగా నున్నవి. ఈ వింతజీవులు జీవస్పృష్టికి ప్రాతివదికలోని వనుటకు సందేహములేదు. అందుచేత చేతనమిశ్రమ పదార్థములనుండి సీవైరస్ జీవులును, వాటినుండి మామూలు జీవస్పృష్టియు నుత్పత్తి పొందియుండవలెననుట సమంజసముగాను సహేతుకముగాను ఉన్నది. అచేతన ప్రపంచము మాదిరిగానే, చేతనప్రపంచముగూడ పరిణామజన్యముగాని, హఠాత్సంభవముగాదు. అనుకూల ప్రతికూల విద్యుదణువుల సమ్మేళనమువలన పరమాణువులును, వాటి సాంఘికావస్థవలన అణువులును, యీ యణువుల మిశ్రితముల వలన మిశ్రమపదార్థములు, మిశ్రమపదార్థము లనేకములు సంయుక్తము లగుట వలన

జీవపదార్థము, ఆ జీవపదార్థ పరిణామమువలన వైరసస్ జీవులు నుద్భవించియున్నవి. ఈ జీవులు పరిణామమును బొంది. వీటికంటె పెద్దవైన జీవులన్నిటికంటె “బేక్టీరియమ్” లుద్భవించినవి.

బేక్టీరియములు

జీవసృష్టికి బూర్వము భూగోళమునందు జాల ఎక్కువ భాగము జలార్ణవమై యుండెను. ఆ జలము వేడిగా గూడ యుండెడిది. లక్షల కొలది సంవత్సరములు గడచిన పిదప నది చల్లబడెను. సముద్రజలములు నులిసెచ్చగా నున్న కాలమందు జీవసృష్టి యందు ప్రారంభమైనది. జీవపదార్థమునుండి వైరసస్ జీవులు ముందు పుట్టి యవి కొన్ని లక్షల సంవత్సరము బేక్టీరియములుగా పరిణామము బొందినవి. ఇవి ఒక సూక్ష్మమైనవి, చుట్టమైనవిగా నున్నవి. ఒక మిల్లిమీటర్ లో వెయ్యవవంతును “మైక్రా” అందురు. మామూలుగా నుండే బేక్టీరియములు 2.5 మైక్రానుల వెడల్పు, 6 మైక్రానుల పొడవు కలిగియుండును. ప్రపంచమందంతటను అనగా గాలియుండును, నీటియుండును, సుమారు పదియడుగులలోతువరకు భూమి యందును నీ బేక్టీరియములు నివసించుటకు. సర్వత్ర వ్యాపించియుండుటచే సర్వవ్యాప్తు లననచ్చును. వీటిని సూక్ష్మదర్శినిలద్వారా పరిశీలించగా నివి జీవపదార్థ రేణువులుగా కన్పించును. (25 వ పటము చూడుడు.) ప్రతి రేణువకును చుట్టును ఒక యావరణముండి మధ్య జీవపదార్థముండును. కొన్నిటియం దీయావరణ గోడ “సెల్యులోజు” అను పదార్థముచేతను, మరికొన్నిటియందు ‘కైటిన్’ అను పదార్థము చేతను నిర్మింపబడియున్నది. జీవపదార్థము వలన నుత్పత్తియై, దాని యందే యుండి దాని జీవధర్మములను సరిగా నడిపింపగలిగిన పదార్థమును “క్రోమోటోజ్” అందురు. ఏరంగునైన సతిశీఘ్రముగా గ్రహింప

గల శక్తి దీనికుండుటచేత దీనికా పెరు నచ్చినది. అట్టి క్రోమోటిక పదార్థ మీ బేక్టీరియములచుండు మిగత జీవసృష్టిలో నున్నట్లు కేంద్రీకరించి యొక ముద్దగాలేక, చిన్నచిన్న తునుకలుగా సర్వత్ర వ్యాపించి యున్నది. కొన్నిటియందు మధ్యను వంకరగీతల మాదిరిగా నుండును. వీటి ఆకారములనుబట్టి బేక్టీరియములను నాలుగు తరగతులుగా భాగించిరి: 1. కోకస్సులు 2. బేసిలస్సులు 3. స్పేరిల్లుములు 4. కామాలు. కోకస్సు తరగతివి గుండ్రముగా నుండును. అనేక కోట్లు కలసి యొక పూసల త్రాడుగా నున్నట్లుండును. 2. బేసిలస్సులు, చూళ్ళ కర్రల మాదిరిగా నుండి యొకదాని వెనుక నొకటి యుండును. స్పేరిల్లుములు, వంకరగా నుండును. 4. కామాలు, మనము రెండు వాక్యాల మధ్యను వ్రాసేకామాగుర్తు మాదిరిగానుండును. (25వ పటముచూడుడు)

బేక్టీరియములముల యునికి మానవ దేహమునకు నచ్చు వ్యాధులను గూర్చి పరిశోధనలుచేయగా తెలియవచ్చినది. ఈయ, కుష్టు రోగములకు కారణములైనవి, బేసిలస్సు తరగతికి చెందినవియేకాని బేసిలస్సుకు చెందిన బేక్టీరియములనియు నిట్టి యపకారులనుటకు వీలు లేదు. 'బేసిలస్కోలై' యనునది మానవుని చిన్నప్రెగులలోనుండి ఆతని జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుచుండును. వేరుశనగ, చిక్కడు, జనుము మొదలైన చెట్లవేళ్ళకు బాడిపెలు పెరుగును. ఈ బాడిపెలలో నివసించు బేసిలస్ రెడిసికోలా యను బేక్టీరియములు చెట్లకు మహోపకారులుగా నున్నవి. చెట్లనుండి పిండిపదార్థమును తీసికొని వాటికి మాంస కృత్తులు తయారుచేసి అందించుచుండును. జంతు వృక్ష శరీరములు చనిపోయినతర్వాత నవి మొదట ఏ యచేతనపదార్థములనలన నిర్మింపబడినవో అట్టి మూలవస్తువులుగా మార్పుచెందనలసియున్నది. అట్లు కానిచో, భూమిమీదగల పదార్థములన్నియు నెప్పటికైనను వృక్ష, జంతు శరీర నిర్మాణములలో ఖర్చువడిపోయి, నూతనసృష్టికి సాన

కాశ ముండకపోవును. బ్రహ్మేరియములు, తమ జీవితచర్యలలో ననంత రము చనిపోయిన జంతు, వృక్ష శరీరముల నాధారముగా జేసుకొని బ్రతుకుచు, వాటిని మూలపదార్థములుగా మార్చి, జీవసృష్టిని ఒక చక్రము మాదిరిగా నడిపించుట కాధారభూతము లగుచున్నవి. వీటి పేర్లు : 1. క్లోస్ట్రీడియమ్, పుట్రిఫికమ్, 2. నైట్రోసామొనాస్, 3. నైట్రో బేక్టరీ, 4. ఎజిట్ బేక్టరీ మొదలైనవి. కొన్ని బ్రహ్మేరియములు జీవించు జంతువుల రక్తములోనుండి జీవించుచుండును. మరికొన్ని బ్రహ్మేరియము లచేతనవస్తువులైన గంధకము, ఇనుము మొదలైన వస్తువుల నాశ్రయించి బ్రతుకుచుండును.

ఉచ్చాస్వని శ్వాసములు వీటి కుండుటచేత మామూలు జీవధర్మము నివి పాటించుచున్నవి. అందుచేత వైరస్సు జీవులకంటె యొకమె ట్టున్న తస్థితిలో నున్నవని చెప్పవలెను. సామాన్యముగా ప్రాణవాయు వును తీసుకొని, బొగ్గుపులుసువాయువును విడుచుచుండును. కాని వీటిలో కొన్ని రకములైనవి ప్రాణవాయువును తీసుకొనకయే, బొగ్గుపులుసు వాయువును విడుచుచుండును. బేసిలస్ ఏస్టికై అను నొక బ్రహ్మేరియమ్ మొదటి తరగతికి జెందినది. ఇది గారాయిని ఏసిటిక్ ఏసిసిడ్ గా మార్చును. బేసిలస్ లెక్టై అనునది మజ్జిగలోనుండును. కాచినచాలలో మజ్జిగ వేసినప్పుడు బ్రహ్మేరియమ్ అభివృద్ధి జెంది పెరుగుగా మార్చును. ఇది రెండవతరగతికి జెందినది. ఈ బ్రహ్మేరియములు వాటి జీవధర్మ నిర్వహణములో మానవున కనేకవిధముల నుపయుక్తములుగా నున్నవి. తేయాకునకును, పొగాకునకును మంచి మంచి రుచులు కలుగుటకు కొన్ని రకముల బ్రహ్మేరియములే కారణము. జనప, గోగు మొదలైన నారలు సులువుగా తీయుటకు గూడ నీ బ్రహ్మేరియముల సహాయమే.

వీటి యభివృద్ధి బహు సులువైన పద్ధతిని నత్యద్భుతముగా జరు గును. వీటియందు లింగభేదము లేదు. ప్రతి బ్రహ్మేరియము కొంత

కాలము పెరిగి, తర్వాత రెండు ముక్కలుగా భాగింపబడును. తిరిగి యీ రెండు ముక్కలు కొంతసేపటికి పూర్వపురీతిని భాగింపబడి నాలుగుగా నగును. సామాన్యముగా 30 నిమిషముల కొకసారి యిటువంటి విభజన జరుగును. ఆ రీతిని విభాగింపబడుచు నున్న యెడల ఒక్క బేక్టీరియము 24 గంటలలో 3 కోట్ల కోట్ల బేక్టీరియముల నుత్పత్తి చేయును. కాని యీ రీతిని ప్రతి బేక్టీరియమ్ అభివృద్ధి కాకుండుటకు ప్రకృతిలో ననేకాటంకములు గలవు. సూర్య కేరస్సు, వాముప్రసారము బేక్టీరియములను కోట్లకొలది చంపుచుండును. కొన్ని బేక్టీరియములు 100 డిగ్రీల వేడినిగూడ నిగ్రహింపగలవు. చల్లదనములో 190 డిగ్రీలు గూడ వీటిని బాధించదు. అలా అత్యధికతో స్థాదులను నిగ్రహించుట కవి తమచుట్టును కవచముగా వర్తించు నొక గోడను నిర్మించుకొనును. తిరిగి మామూలు పరిస్థితు లేర్పడగనే వాటి గూడును భేదించుకొని వెనుకటి రీతిని వృద్ధిబొందుట కారంభించును. ఈ స్థితిలో నుష్ణమధికము చేసినచో నవి తాళలేకయు, తిరిగి త్వరితముగా గూడు కట్టుకొనలేకయు మరణించుట సంభవించును. అందుచే నీటిని బేక్టీరియములనుండి పరిశుభ్రము చేయదలచినచో దానిని పొంగువచ్చువరకు కాచి, చల్లార్చి నెంటనే తిరిగి కావవలయును. అప్పుడందుగల బేక్టీరియము లన్నియు నశించును.

బేక్టీరియముల యందు జీవవదార్థము, జీవశక్తి రెండు కాన్పించుచున్నవి. జీవధర్మములైన యాహారస్వీకరణము, జీర్ణశక్తి, ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసములు, సంతానకాంక్ష మొదలైన గుణములు, నీటియందు పంకుచిత్తముగానైనను ఉండుటచేత నివి మొదటిజాతికి తెందిన వైరసస్సు జీవులకంటె అనేకవిధముల నున్నత స్థితిలో నున్నవి. వీటి కంటె నికొకమెట్టు ఉన్నతస్థితిలో జీవితధర్మములను నెరవేర్చుకొనుచున్నవి.

చంచల సూక్ష్మజీవులు

జీవసృష్టి ప్రారంభదశలోని చంచల సూక్ష్మజీవులందు జంతులక్షణములు, వృక్షజాతి లక్షణములు స్థూలముగా కన్పింపవు. అనగా నొక ఆవుకు, మందార మొక్కకు ననేక తేడాలు కన్పించుచున్నవి. మొదటిది చంచలజీవి. రెండవది మొలిచినచోట నేయండి పెనుగును. ఆవు తనకు కావలసిన యాహారమును తాను నిర్మించుకొనలేదు. మందార మొక్క తనకు కావలసిన యాహారమును తాను సూర్యరశ్మి సహాయమువలన నిర్మించుకొనగలదు. ఆవు ఘన, ద్రవపదార్థములను తినగలదు. చెట్టు ద్రవపదార్థమును మాత్రమే వేళ్ళద్వారా లోనికి లాగుకొనగలదు. జంతుజాతియంతయు సామాన్యముగా ఆవుకుపై నెచ్చిన లక్షణములును, వృక్షజాతియంతయు మందారచెట్టు విషయమై చెప్పిన లక్షణములును గలవి. సూక్ష్మదర్శినుల (Microscopes) ద్వారా మాత్రమే కన్పించు సూక్ష్మజీవులందు నీ తేడాలు చాలవరకు తక్కువగా నుండును. కొన్ని చంచల సూక్ష్మజీవులలో నీ రెండు జాతులకు తగిన లక్షణములు సమముగా నుండును. వాటిని జంతువులనదానికిగాని వృక్షములనదానికిగాని వీలులేకుండును. అందుచే ప్రాతిపదికలో వృక్ష, జంతుజాతులకు భేదము లేకయుండుటగాని, నామమాత్రముగా కన్పించుటగాని చూచుచున్నాము. ఇందు కుదాహరణగా మూడుసూక్ష్మజీవులను తీసుకొనవచ్చును. 1. యుగ్లినా, 2. క్లెమిడమోనాస్, 3. ఎమీబా.

ఈ సూక్ష్మజీవులయందు జీవధర్మములు నిర్దుష్టముగా నుండుటేగాక నవి నిరూపకముగా నిర్వర్తించుకొనుటకు తగిన యుపకరణము లేర్పడినవి. జీవకోటియం దీయుపకరణముల యభివృద్ధియే పరిణామ స్వరూపము. ఇందు మొదటిది, యుగ్లినాయందు జంతుజాతిలక్షణములు, వృక్షజాతి లక్షణములు గూడ నున్నవి. అందుచేత నీ జీవజంతువుల

కును. వృక్షజాతికిని మధ్యస్థముగా నున్నది. తొలకరి వానలు కురిసిన పివప యందగుల చిన్నగుంటలలో నిది యాకుపచ్చని తెట్టునలె కాన్పించును. సూక్ష్మదర్శినిద్వాచా చూచినచో నిది యించుమించుగా పడవ ఆకారముగలజీవి. (26వ పటము చూడుడు). ముంగొక గొంతుక, దానిచినర నిర్దులాకారమైన రంధ్రము, దానియంచు నాశ్రయించుకొని పొడుగుగా బయటకు సాగిన యొక మీసము ఉండును. మీసము నీటిలోజాడించి వెనకకు నెట్టుచుండుటచే యుగ్లీనా ముందుకు నీడు చుండును. ముందుభాగమున కన్నునంటి దొకయనయన మన్నది. కన్ను, మీసము ఆధారముగా నెచ్చటికి పోవలెననిన నచ్చటకు పోవుచుండును. జీవపదార్థముచుట్టను గోడలేదు. హరితస్రము (ఆకు లలో నుండే ఆకుపచ్చని పదార్థము (Chlorophyll). దీనియందండల మచ్చలు మచ్చలుగా నున్నది. ఆ కారణమున సూర్యరశ్మి సహాయ ముతో తనకు కావలసిన యాహారము 'పేరామిలమ్' అనునది తయారు చేసుకొనగలదు. దాని స్వభావములలో యీ శక్తి యొక్కటే వృక్ష జాతికి జెందినగుణము. కన్నును కల్గియుండి, దానిసహాయమున యిచ్చ నచ్చిన చోటికి చలించుట, జీవపదార్థము చుట్టను గోడలేకుండుట మొదలైననన్నియు జంతుజాతికి సంబంధించిన గుణములు. వెలుతురు లేనిచోటులందు నీటిలో కరిగియున్న చేతన మిశ్రమ పదార్థములను పీల్చుకొని జీవించును. అదికూడ దొరకనప్పుడు ఘనపదార్థమును బంతువులవలె మ్రింగుచు జీవించును. పై గుణములనుబట్టి ఇది జంతు వృక్షజాతులకు మధ్యరకముగా నున్నదని చెప్పక తప్పదు.

మిగత రెండు సూక్ష్మజీవులయందు క్లెమిడోమోనాస్ (27వ పటము చూడుడు) ప్రాథమిక మొక్కగాను, ఎమీబా (28వ పటము చూడుడు) ప్రాథమిక జంతువుగాను పరిగణింపవచ్చును. క్లెమిడోమోనాస్ నందుజీ వపదార్థ మొకగోడవలన చుట్టబడి యుండును. ఒక

కన్నుమచ్చ, రెండు మీసములు ముందుండును. వాటి సహాయమున యిష్టమునచ్చిన చోటికి నీటియం దీడును. క్రిందిభాగమంతయు నొక చిన్న గిన్నె యాకారముగల హరిత్రముచే నింపబడియుండుటచేత కిరణజన్యసంయోగక్రియ వలన తనకు కావలసిన యాహారమును నిర్మించుకొనగలడు. యుగ్లీనానలె యవసరమైనచో ఘనపదార్థమును మ్రింగలేడు. మిగతవృక్షజాతివలె ద్రవరూపమున నున్న యాహారమును మాత్రమే పీల్చుకొనగలడు. చలనశక్తి యొక్కటిమాత్రమే దీనికి జంతులక్షణము. మిగతనన్నియు వృక్షజాతి లక్షణములే. వృక్షజాతి లక్షణములన్నియు ప్రారంభదశలో దీనియందుండుటచేత దీనిని సృష్టిలో మొదటి మొక్కగా పరిగణింపవచ్చును.

ఎమీబా జంతుసృష్టిలోని కంటటికిని మొదటిదని చెప్పవచ్చును. జంతువుల లక్షణములన్నియు నీ సూక్ష్మజీవీయందు సంకుచితముగా కన్పట్టచున్నవి. జీవపదార్థమునకు చుట్టను గోడలేని కారణమున దీని కొక నియమితయాకార ముండదు. వీలైనట్లుగా జీవపదార్థము ప్రాకుచుండును. ఇది హరిత్రముగాని మరి యేయితర రంగుపదార్థముగాని లేని స్వచ్ఛమైన దేహి. జీవపదార్థమందు మధ్య నొక గుణగుళిక లేక నృష్టి (Nucleus) యుండును. ఆహారము తీసుకొనవలసినప్పు డిది దాని చుట్టను ఆవరించి మెల్లగా జీర్ణించుకొనును. నీటిలో లీనమైయున్న ప్రాణవాయువును గ్రహించి యుచ్ఛ్వాసింపును. సంచరించవలెనన్న నే దిక్కుకు పోవలయునో అటువైపు కాలుసాచినరీతిగా, జీవీయందున్న జీవపదార్థము ప్రవహించును. గుణగుళికగూడ మెల్లగా జరుగుటచేత వలసిన దిక్కుకు ప్రయాణము బహుమెల్లగా సాగించును. యుగ్లీనా, క్లెమిడమోనాసులవలె ఇది తనకు కావలసిన యాహారమును నిర్మించుకొనలేదు. పిండి, మాంసకృత్తపదార్థకణములు దగ్గరగా నున్నప్పుడు వాటిచుట్టను ఆవరించి క్రమముగా జీర్ణించుకొనగలడు. తాను

ప్ర:నగాణము చేయుచున్న దిక్కున నధికమైన యుష్ణ ప్రదేశముగాని మరియుక ప్రతిబంధకముగాని యున్నచో నెరింగి, మరలి మరియుక మార్గమును బట్టించును. అందుచేత చైతన్యలేశము గలవని ధృఢముగా చెప్పవలసియున్నది.

పై న వివరించిన మూడు సూక్ష్మజీవులందును గుణగుళిక లేక న్యస్తి (Nucleus) యుండుట సామాన్యలక్షణము. జీవపదార్థ మొకే కోశిక మాత్రము, అనగా ఒక గుణగుళికమధ్యన ఉండి దానిచుట్టును జీవ పదార్థ మావరించియున్నచో నది యొక కోశిక లేక శాల (Cell). ఈ నిర్వచన ప్రకారము పై మూడును నేకకోశికాజీవు లగుచున్నవి. ఇట్టి జీవులు అనేక తరగతుల మాన్యులు గలవి యనేకము లున్నవి. అట్టి మార్పులు, వికారములు, తదితరవిశేషములన్నియు, నీ మూడు రకముల జీవుల పరిణామ ఫలితములుగా నెంపవలసియున్నది. ఒక రాజు తన రాజ్యమును పరిపాలించుచు, సంరక్షించుచున్నటుల వీటి యందుగల గుణగుళిక లేక న్యస్తి చుట్టును ఆవరించియున్న జీవ పదార్థమును సంరక్షించుచు, శాసించుచు నుండును. గుణగుళికలేని జీవపదార్థము జీవింపనేరదు. ఈ గుణగుళిక క్రోమేటిన్ అను పదార్థముచేత నిర్మింపబడినది. ముందు ప్రకరణమున వివరింపబడిన బేక్టీరి యములయం దీక్రోమేటిన్ పదార్థము గుళిక మాదిరిగా మధ్య కేంద్రీకరించి లేక జీవపదార్థమం దంతటను చిన్న చిన్న తునుకల మాదిరిగా విస్తరించి యున్నది. ఆకారణమున బేక్టీరియముల కంటె నీ సూక్ష్మజీవు లొక మెట్టు ఆధిక్యతలో నున్నవని చెప్పవలెను.

న్యస్తి (గుణగుళిక) (Nucleus) స్వరూపము

గుణగుళిక బేక్టీరియములు మినహా సర్వ జీవులందును గలదు. ఇది జీవ పదార్థమును గ్రహించి పెరుగుచుండును. కోశికలలో నొక గుళిక

సరిగా రెండు సమభాగములై, ఆ రెండు చిన్న గుళికలు జీవపదార్థాగ్రాహనమువలన మామూలు పరిమాణము వరకు పెరుగును. గుళిక విభజన మూడు రకములుగా జరుగును: 1. స్థూలవిభజన (Amitotic division) 2. సూక్ష్మ విభజన (Mitotic division) 3. ప్రాస్థవిభజన (Meiotic division). స్థూల విభజనయం దొక గుళిక ఇంచుమించుగా రెండు సమమైన యుండలుగా భాగింపబడును. పైన వివరించిన మూడు యేకశాలాసూక్ష్మజీవులందును, స్థూల విభజనయే జరుగుచుండును. ఇట్టి విభజన ప్రాథమికజీవులయందే కాన్పించుచున్నది. చాల పరిణామమును బొందిన జీవులందు సూక్ష్మవిభజన జరుగును. జీవసృష్టి వృద్ధి కంతకు కారణమైన నీ గుణ గుళికా విభజనను గురించి తెలుసుకొనుట ముఖ్యము. ఇది నాలుగు దశలుగా జరుగును. (29 వ పటము చూడడు) పటమున గుళిక విభజనలో క్రమేణ జరుగు మార్పులు సులువుగా బోధపడును. నాలుగు మజలీలుగా జరిగే యీ విభజనను, నాలుగు మెట్లనిగాని యవస్థలనిగాని చెప్పి వివరించినచో తేలికగా నర్థమగునని యిట్లు భాగించిరి: 1. గుణావిచ్ఛానము. 2. గుణభిన్నము. 3. తిరోగమనము. 4. పునర్నిర్మాణము.

గుణగుళిక సూక్ష్మవిభజనయందు నాలుగవస్థలు ఒకటిలగాయతు తొమ్మిదవ బొమ్మవరకు చూపినట్లుగా జరుగును. మొదటిదగు గుణావిచ్ఛానదశయందు గుణగుళికనుండి గుణములు బయల్పడును. గుణము రేఖ (Chromosome) లు క్రోమోటిడ్ పదార్థ పూరితములైన చిన్న చిన్న దారపుతునుకలవంటి తునుకలును గుళికయం దివి యొకదానినొకటి యంటుకొని బాగుగాసాగి నన్ననయి యొక వలమాదిరిగా నల్లుకొని యుండును. విభజన ప్రారంభము కాగానే యీ క్రోమోటిడ్ త్రాటి వల క్రమముగా ముడుచుకొని లావెక్కి చిందరవందరగా చిక్కువడిన యొక సూత్రము (Spireme) గా మారును. ఈ సూత్రము మధ్య కొన్ని

చోట్ల తెగి యొకే నిశితసంఖ్యగల త్రాటితునుక లగును. ఏటినేగుణ రేఖలని చెప్పవచ్చును. ఏలన, ఒక మొక్కగాని జంతువుగాని కల్గియున్న గుణములన్నియు సీక్రోమేటిక్ త్రాటితునుకలలో సూక్ష్మాత్మిసూక్ష్మ రూపముగా నిమిదియున్నవి. ఆ తునుకలలో నొక్క తునుకను ఒకటకు లాగి వేసినచో నాజీవిలోనున్న కొన్ని బాహ్యగుణములు లోపించును. ఉదాహరణగా మానవశరీరమును తీసుకొందము. కొన్నికోట్ల కోట్ల చిన్నచిన్న జీవపదార్థకోశికల వలన మానవశరీర మేర్పడి యున్నది. అందుగల ప్రతిశాలయందును గుణగుళిక యుండును. ఈ గుణగుళికలో నిమిదియున్న గుణ రేఖలు(Chromosomes) 48. ఒక ప్రత్యేకవ్యక్తి లక్షణములైన పొడుగు, లావు, ముక్కుతీరు, కండ్లతీరు, పసిమీస లేక నలుపురంగు, వాని స్వభావగుణములు మొదలైనవన్నియు వాని 48 గుణ రేఖలను సూక్ష్మముగా నిమిదియున్నవి. అట్టి గుణ రేఖలు గుణనూత్రము లందందు తెగుటవలన నిశితమైనసంఖ్యలలో బయల్పడును. ఒక్కొక్కజీవికి నొక్కగుణ రేఖ సంఖ్య యుండును. ఆ సంఖ్య యెప్పటికిని మార్పుజెందదు. ఈ గుణ రేఖలు వెలునడిన పిదప గుణగుళిక చుట్టనున్న పొర జీవపదార్థమందు కలసిపోవును. అట్లే గుళికబిందువుగూడ నదృశ్యమగును. అప్పుడు జీవపదార్థములో గుణ రేఖల కిరువైపులను ధృవము లేర్పడి వాటినుండి జీవపదార్థయుతములైన త్రాళ్ళేర్పడును. ధృవములనుండి భయలుచేరిన త్రాళ్ళు గుణ రేఖలవరకు వ్యాపించును.

గుణభిన్నము :- అంతట గుణ రేఖలు కోశిక నుద్యప్రదేశమందు నిడివిగా నమర్పబడును. ప్రతిగుణ రేఖయు నిలువున రెండు సమభాగములుగా చీలిపోవును. ఆ విధముగా నొల్లు గుణ రేఖలున్నయెడల, ఎనిమిదిగుణ రేఖ చీలిక లగును. పిమ్మట ధృవములనుండి సాగివచ్చిన జీవపదార్థపు త్రాళ్ళు యీ చీలికలను తొలి బంధించును.

తెరగమనము:—వీవైవు ధృవపుత్రాభ్యు ఆ వైపుననున్న గుణ రేఖ చీలికలను బంధించుటచేత నాలుగు చీలిక లొక ధృవము వైపుకు, నాలుగు మరొక వైపుకు తిరుగును. అప్పుడు జీవదార్ధపు త్రాళ్ళు ముడుచుకొనుటచేత గుణ రేఖ చీలిక లొక్కొక్క ధృవమునకు నాలుగేసి చేరును.

పునర్నిర్మాణము :—ధృవములకు లొగబడిన గుణ రేఖ చీలిక లన్నియు నొకదాని చినర మరొకటి యతుకుకొని సరాసరి యొక త్రాడుగా వగును. ఈ త్రాడు చిక్కుపడిన దారపుతుట్టవలె వంకరలు గలిగి యుండును. తదుపరి వీటినుండి సన్నని యేళలు సాగి, అవియొక దానితో నొకటి కలిసి యల్లుకొనుటచేత తిరిగి క్రొమేటిఫవల యేర్పడును. గుణవిర్భాసకాలమున నంతగానమైన గుళిక చిందువు, గుళికపార తిరిగి యుత్పత్తి యగును. పిమ్మట నీరెండు చిన్న గుణ గుళికల మధ్య ప్రదేశమున నింక సన్నని గోడ యేర్పడును. వృక్ష జాతిలో “కెల్బులోజ్” అను పదార్థము వలన నీ గోడ యేర్పడుచున్నది. జంతుజాతిలో గుణగుళికలమధ్య గోడయనునది ఎన్నడును ఉత్పత్తి కాదు. ఈ విషయము వృక్షజంతుజాతులకు ప్రధానమైన భేదము. పై మూడు జీవులలోను ఆడు, మొగ యను భేద మేర్పడి యుండలేదు. యుగ్లీనా బాగుగా పెరిగిన మీదట నిలువున రెండు చీలికలుగా నయి, రెండు చిన్న యుగ్లీనా లుద్భవించును. అవి రెండును మామూలు పరిమాణమునకు పెరిగిన పిదప నిలువున చీలుకొని పోయి నాలుగు యుగ్లీనా లగును. ఈ విధముగానే యుగ్లీనా లభివృద్ధి జెందును. ఇందు లింగ భేదము లేకుండుటేగాక సహజముగా మరణించే పదార్థముగూడ లేదు. క్షైమిడమోనానునందు జీవపదార్థ మంతయు నాలుగు సమభాగములయి ఆ నాలుగు చిన్న చిన్న క్షైమిడ మోనానుల రూపమును ధరించి చుట్టనున్న గోడ బ్రద్దలగుట చేత

బయట నీటిలోనికివచ్చి యక్కేచచ్చగా తిరుగాడుచు పెద్ద క్లెమిడమోనాసు పరిమాణమునకు పెరుగును. నీరు తక్కువగా నుండి వాతావరణము ఉష్ణముగా నున్నప్పుడు క్లెమిడమోనాసులోని జీవపదార్థమంతయు 82 చిన్న సమభాగములుగావై, యీ తునుకలన్నియు క్లెమిడమోనాసు ఆకారమును ధరించును. అవి బయటకు వచ్చి నీటి కొంతకాల దూకులాకి రెండేసి జతలుగా నేర్పడును. తరువాత ఈ జతలు ముఖాముఖ కలుసుకొని యేకమై పోవును. (80 న వటము చూడుడు.)

కలసిన జతలను లింగకణము లనవచ్చును. కాని వీటియందు రూప, గుణ పరిమాణములలో నేవిధమైన వ్యత్యాసములు లేక రెండును నొక్క మాదిరిగా నుండుటచేత (స్త్రీ, పుంలింగములు వీటి కాఠోపించుటకు సావకాశములేదు. ఒక్కొక్క లింగకణమునం దొకగుణగుళిక యుండును. లింగకణములు కలసినప్పుడు వాటియందు గల రెండు గుణగుళికలు కలిసి ఏకమయి యొక పెద్ద గుణగుళిక యగును. ఒక్కొక్క గుణగుళికయం దొక సంఖ్య గుణ రేఖ లుండును. కనుక నీ రెంటి సమాగమమువలన నచ్చిన పెద్దగుళికయందు గుణ రేఖలు రెట్టింపుండును. రెట్టింపు గుణ రేఖలు గల గుళిక గనుక దీనిని “ద్విగుణి” యని వాసుకచేయుట సమంజసముగా కన్పించుచున్నది. కొంతకాల మీ ద్విగుణి నీటిలో నీది, దాని నాలుగు మిశ్రములను లోపలకు లాగుకొని, కోలగా నున్న యాకారమును క్రమముగా కుదించుకొని గుండ్రముగా నగును. బయటనున్న వేడిమిని ప్రతిఘటించుటకు ద్విగుణికణమందు గల జీవపదార్థ మొక గట్టి పెంకువంటి కవచమును తయారుచేసుకొనును. నత్తగుల్లలు వాటి గుల్లలలో నివసించును. శీతోష్ణాదులబాధ తగ్గించుకొనునీతిని నీద్విగుణికణము గూడ తన జీవపదార్థమును రక్షించుకొనును. కొంతసేపు విశ్రాంతి

తీసుకొనిన పిదప ద్విగుణియందుగల గుణగుళిక హ్రస్వ విభజనను బొంది రెండు గుణగుళికల నుత్పత్తిజేయును. ఈ విభజన యందు మామూలు గుణభిన్నానస్థలో గుణరేఖలు నిలువు చీలికలను బొందక, ఉన్న రేఖలలో సరిగా సగ మొక ధ్రువమునకును రెండవ సగము మరొకవైపునకును జేర్పబడును. ఆలా చేర్పబడిన గుణరేఖలు వున్నదిర్మాణ క్రియ యందు రెండు వైపులను గుణగుళికలుగా సంఘటింపబడును. ఈ రెండు గుణగుళికలు మరల మామూలు సూక్ష్మ విభజనను బొంది, నాలుగు గుణగుళిక లగును. వాటిచుట్టును అందున్న జీవదార్శము సమానముగా సర్దుకొనిన పిదప నవి క్లెమిడ మోనాసు ఆకారమును బొంది కవచము నుండి బయటకు నెచ్చును. అంతటినుండి యవి క్రమముగా పెరిగి పెద్ద క్లెమిడమోనాసు లగును. ఇందు ముఖ్యముగా గమనించవలసినది రెండు లింగకణముల యొక్కత, చాని ఫలితముగా ద్విగుణి యుత్పత్తి, కొంతకాలమునకు ద్విగుణి యందు హ్రస్వవిభజనము, అందువలన గుణగుళికలలో వెనుకటిగుణ రేఖల సంఖ్య తిరిగి వచ్చుట. ప్రతి యొక్కతయందును గుణరేఖల సంఖ్య రెట్టింపగుచుండును. ప్రతి హ్రస్వ విభజన వలన నా సంఖ్య సగముగుచుండును. లింగభేదములు గల్గిన ప్రతి జీవి యందును, ఐక్యతలో గుణరేఖ సంఖ్య రెట్టింపగుచుండుట, తిరిగి హ్రస్వ విభజన మూలమున మామూలు సంఖ్యగల గుణరేఖలను పొందుట కానవచ్చుచున్నది. అందుచేత నీ విషయము జీవసృష్టి పరిణామమునకు ముఖ్య కారణముగా కన్పట్టుచున్నది. పరిణామ సిద్ధాంతమును తెలిసికొనవలయునన్న, పై సంఘటనమును పూర్తిగా గ్రహించవలసి యున్నది.

ఎమీబా యందు విభజన యుగ్లీనాలోవలె జరుగును. ముందు గుణగుళిక స్థూల మార్గమున రెండుగా విభజింపబడి, జీవదార్శ మీ రెంటి

చుట్టును సమముగా విభజంపబడును. ఆ కేయి: జీవులు క్రమముగా విడిపోవును.

పై మూడు జీవులు జీవస్పృష్టికి ప్రాతిపదికనుండి ఉన్నననుకొనుట చేతను, వాటిలో స్త్రీ, పులింగ భేదములు కాన్పించకుండుటచేతను ప్రకృతి ప్రారంభమున నీ విచక్షణ లేదని తెలియుచున్నది. జీవస్పృష్టి ప్రారంభ మిప్పటికి సుమారు నూరుకోట్ల సంవత్సరములని తెలియుచున్నది. ఈ మహాకాలములో యుగీనా, క్లెయిడమోనాసుల వంటి జీవులనల్ల 239,500 మొక్కజాతులు పరిణామరీత్యా ఉద్భవించినవి. అటువలెనే ఎరియా వంటి యితర జీవులనల్ల 840,000 వేల జంతు జాతు లుత్పన్నమైనవి. జంతు వృక్షజాతులు రెండును ప్రాతిపదికలోనే విడిపోయి రెండు తెగలుగా పరిణామ మొందినవి. వృక్షజాతులలో గ్యాబుల్వము, హరితివ్రమును కలిగియుండుట ముఖ్య లక్షణములైనవి. జంతువులలో చలనస్వభావము, ఇండ్రియాన్నత్యము పరిణామ మొందినవి. ఘనపదార్థమును తిను సమర్థత, శాలచుట్టును గోడ లేకుండుట ప్రాముఖ్యమైన లక్షణములు. హరితిము (Chlorophyll) నకు బదులుగా జంతు దేహములందు ' హెమోగ్లోబిన్ ' పదార్థమున్నది మొక్కలకు హరితరస మెంత ఉపకారియో, జంతువులకు హెమోగ్లోబిన్ అంత ఉపయుక్తమైనది. ఈ రెంటిని రసాయన విమర్శ చేసి చూడగా నవి బహు సన్నిహితముగానున్న చేతన మిశ్రమ పదార్థములుగా తెలియుచున్నది. హరితరస అణువునం దొక మెగ్నీషియమ్ పరమాణు వున్నది. హెమోగ్లోబిన్ అణువునూడ అట్లే ఉండును గాని, మెగ్నీషియమ్ పరమాణువునకు బదులు ఇనుము పరమాణు వుండును. ఈ తేడా మినహాయించినచో రెండును సమాన మిశ్రమ పదార్థము లని చెప్పవచ్చును.

మొక్కజాతియందు హరిత ముడుటచేత సూర్యరశ్మి సహాయమున పంచదార, పిండిపదార్థములను, బొగ్గువులుసుగాలి, నీరు మొదలైన ముడిపదార్థములనుండి తయారుచేసికొన గల్గుచున్నవి. హరితరసము లేమినిజేసి జంతువులన్నియు తమకు కావలసిన యాహారమును తాము తయారుచేసుకొనలేక తమ యాహారముకొరకు వృక్షజాతిమీద నాధారపడియున్నవి. ఏ పదార్థము ఖర్చుపడి జీవులలో జీవశక్తి విడుదలగుచున్నదో యట్టి పదార్థమే ఆహారము. అట్టి యాహారము వృక్షజాతికి, జంతుజాతికి నొకటియే యయియున్నది.

పైన ఉదాహరించిన రెండున్నర లక్షల వృక్షజాతులు, ఎనిమిదిన్నర లక్షల జంతుజాతులు పరిణామము ఆరోహణముగా నడుచుటచేత ఉద్భవించినవి. నిర్గుణపదార్థమునకు క్రమముగా నొక్క గుణము కల్గి బహుగుణపదార్థ మైనటుల ఈ పరిణామ ఆరోహణక్రియ స్థాయిగా ననేక సోపానములమీదుగా జరిగియున్నది. ముందు వివరింపబడిన క్లేమిడమోనాసుయొక్క అతి సూక్ష్మమైన యేకశాల (Cell) జీవి నీటిలోమాత్రమే పెరుగగలదు. విశేషముగా విస్తరించుటకు తగిన ఉపకరణములేవియు లేవు. లింగవిస్తరణ (Sexual reproduction) నిర్వీకారముగా జరుగును. అదియునుగాక లింగకణములు (Gametes) నీటిలో విడువబడుటచేత వాటికి రక్షణలేదు. అందు చాలవరకు నశించి పోవుటకు సావకాశమున్నది. ద్విగుణి (Zygoti) కూడ స్వల్పరక్షణ గలది. దానియందుగల సంకుచితమైన యాహారపదార్థము ఖర్చుపడి పోయినచో నది నశించవలసియున్నది. ఎక్కువ యాహారమును శలవు చేయుటకు చోటులేని సూక్ష్మజీవి. ఈ లక్షణములనుబట్టి, తన శరీరమును శీతోష్ణోద్ధాదులను ప్రతిఘటించుచు విరివిగా పెంచుకొనుటకుగాని,

తనజాతిని యనంతముగా విస్తరింపజేసుకొనుటకుగాని తన యుపకరణములు లేవు. ఇందుకు న్యస్తీరేకమైన యొక బంతిమొక్కను ఉదాహరణముగా తీసుకొందము. దానికి నోకచో స్థిరముగా నుండుటకును, భూమినుండి నీరును ఇతర ముడిపదార్థములను స్వీకరించుటకు వేళ్ళున్నవి. కిరణజన్యసంయోగక్రియనలన కావలసినంత యాహారము (పిండిపదార్థము) నుత్పత్తిచేసుకొనుటకు విశాలమైన యాకులున్నవి. వాటికి సూర్యవశ్య విరివిగా నందులాగున ధరించుటకు కొమ్మలున్నవి. లింగవిస్తరణ పువ్వులు, కాయలు, గింజలద్వారా జరుగును. నీటి సరఫరా బాగుగానున్న నర్షకాలమందు మొలచి కీతకాలమునందు పెద్దదియై పూచి యసంఖ్యాకములైన చిన్నచిన్న కాయలను తయారు చేయును. నీటిలేమి, యుష్ణాధిక్యముగల మేవినాటికి దాని జీవితచక్రము పూర్తిచేసుకొని నశించును. మేవినంతయు నుష్ణమును భరించగలిగి విత్తన రూపములో నుండును. విస్తరణకు మేవీ కాలమును కూలము. అందుచేత నీ మొక్క తయారుచేసిన చిన్నకాయలు భూమిమీద బహుదూరము వ్యాపించి నర్షము కొరకు నెదురు జూచుచుండును. వానలు ప్రారంభించగానే విత్తనరూపములోనున్నచెట్లు మొలకలెత్తి యనేకచోట్ల వృద్ధిబొందును. క్షైమిడిమోనాసుకును, బంతిచెట్టుకును తారతమ్యము చూచినచో రెండవది మొగటిదాని కంటె తన జీవితధర్మమును నిర్వర్తించుకొనగల్గియుండుటలో ననేక పందలరెట్లు సమర్థతకల్గియున్నట్లు విశేషమగుచున్నది. ఇట్టి సమర్థ మొక్కలకు, జంతువులకుగూడ ఒక్కసారిగారాక క్రమక్రమముగా సోపానమార్గమున వచ్చినది. దీనినే జీవపరిణామము (Organic Evolution) గా తెలుసుకొనియున్నారు.

జీవసృష్టి వర్గీకరణము

వృక్షజాతి	చిరుజాతి
1. నీటిపసరులు, నాచులు Thallophyta	1. ఏకకోశిక క్రిములు Proto Zoa
2. తేమచూలులు Bryophyta	2. అంతరావకాశులు Coelenterata
3. నికుసుమములు Pteridophyta	3. ఎలుగుపాములు Annelida
4. ఓజవ్యాప్తులు Spermatophyta	4. చుకీమీనులు Echinodermata
(ఎ) బహిర్బీజులు Gymnosperms	5. సత్తబాతులు Mollusca
(బి) అంతర్బీజులు Anjiosperms	
అంతర్బీజులు	
(1) ద్విదళులు	6. పూసకట్టు పురుగులు Arthropoda
(2) ఏకదళులు	7. బల్లిజాతులు Reptilia
	8. పాలిచ్చుజంతువులు పక్షులు Mammalia & Aves


నీటిపసరులు, నాచులు, ఏక కోశిక క్రిములు : ముందు వివరించిన, యుగ్లీనా, క్లెమిడమోనాసులు నీటి పసరుల జాతికి చెందినవి. ఎమీబా ఏకశాలజీవి. మొదటి రెండును గూడి యేకశాల జీవులే. కాని విశేషము హరిత్రస్ర కలవి. ఈ మూడేగాక యీ రకపు జీవులనేక నందలు, వేలు గలవు.

ఈ రకపు నృక్షజాతి కంతము తమకు కావలసిన యాహారము తామే తయారుచేసుకొన గలిగిన శక్తి ఉన్నది. వీటి పై రంగునుబట్టి నాలుగు భాగములుగా విభజించినారు. 1. హరితములు (Chlorophyceae) 2. నీలహరితములు (Cynophyceae) 3. కఠితములు (Phacophyceae). ఉదా. సర్పాసము. 4. రోహితములు (Rhodophyceae) ఉదా : పోల్సైఫోనియా. వీటికి వివిధరంగులు నచ్చుటకు కారణము వీటిలోని రసములే. హరితరసమున్నవి మాత్రము పగచ దార, పిండిపదార్థములను తయారుచేసుకొనగలవు. మిగత రంగులు గలవి యితరములైన చేతన మిశ్రమ పదార్థములను తయారుచేసుకొని వాటివలన జీవించును. చాలవరకు నివ్వియు నీటిలో నుండునవి. ఎక్కువగా హరితములు, నీలహరితములు మంచినీటియందు పెరుగును. కఠితములు, రోహితములు సముద్రజలములందు పెరుగును. సుమారు డెబ్బది, ఎనుబదికోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వము జీవసృష్టి ఈ విధమైన చిన్నజీవులతో సముద్రమందు ప్రారంభమైనది. అప్పటి సముద్రజలములు మంచినీరుగాగాని కొద్ది చవకగాగాని యుండెడిదని యూహింప నలసి యున్నది. నృక్షజాతికి జెందినను, ఏకశాలాజీవులు చాలవరకు సంచారసమర్థత కల్గినవి. కొన్ని క్షైమిడమోనానువంటి ఏకశాలాజీవులు 16 చొప్పున కలసి యొకటిగా నినసించుట కలవాటుపడుటచేత పటములో చూపిన పెయ్లోరై నాజీవు లుద్భవించినవి. గుంపుగా నివసించుట తప్ప యీవదునారుజీవులకు ఇతర సంబంధమేమియును లేను. ఇటువంటి వేముప్పదిరెండుజీవుల గుంపు, 128 జీవులగుంపు, 2000 జీవుల గుంపులుగూడ ఉన్నవి. (81వ పటము చూడుడు). వాటిని వరుసగా యుయోరై నా, ప్లియోడిరై నా, వోల్వాక్సులని న్యవహరింతురు. పరిణామ యూరోహణము 'యుయోరై నా'వరకు వచ్చుసరికి కొన్నిమార్పులు సంఘటించబడినవి. అందు మొదటిది, జీవపదార్థ గొట్టముద్వారా ఈముప్పదిరెండును

ఒకదానితో నొకటి సంబంధించుట. అట్లు సంబంధించుటవలన నాహారపదార్థము సమముగా పంచుకొనుట ముఖ్య ఉపయోగము. ఇంతకంటెను పరిణామమార్గమున నున్న తదశలోనున్న ప్లియోజీరైనా, వోల్వాక్యులందు జీవపదార్థగొట్టములలోని యల్లిక రాను రాను ప్రాముఖ్యతను నహించినది. పెండ్లోరైనాలో పదునారు జీవులు పూర్తిగా నొకదానినిబోలి మరియొకటున్నది. వాటిలో రూపములో గాని, పరిమాణములోగాని, శక్తిసామర్థ్యములోగాని యొకదానికొకటి తీసిపోదు. యడోరైనాలోగూడ యల్లెయున్నవి. ప్లియోజీరైనా యందు గోళాకారముగానున్న యీ గుంపుజీవులకు ముందు వెనుకలు సూచింపబడినవి. ముందున్నజీవులు చూచుట గల్గునుగాన కంటి మచ్చలు వాటియందుపూత్రమే యున్నవి. వెనుకవైపు జీవులలో నవి హరించి పోయినవి. ముందు పెద్దవి, వెనుక వైపున చిన్నవి. వోల్వాక్యు నందు గోళము పెద్దది. అనేకవందల జీవులుండుటచేతను, చుట్టనున్న జీవు లందీదుటకు వినిగములున్నవి. చూచుటకు కంటిమచ్చలను కల్గి యున్నవి. క్లెమిడమోనాసు మొదలీ యొక జీవులందును ఆరోహణ మార్గముననున్న పరిణామము సుబోధకముగా నున్నది. వీటిలో గోనియమ్నుగూడ జేర్చవచ్చును. (31 వ పటము చూచుడు.)

పరిణామయారోహణము

ఇందు దేహ విస్తారతయం దేగాక లింగవిస్తరణక్రియయందు గూడ పరిణామము సుబోధకముగా నున్నది. ప్రాతిపదికలోనిదైన క్లెమి డమోనాసునందున్న లింగకణములు రెండును నొకే యొక స్వరూప, పరిమాణ, స్వభావములు గలవి. పెండ్లోరైనాయందు గల లింగ రేణువులు స్వరూపములో సమానములేయైనను పరిమాణ ములో తేడాగలవి. అందొకటి చిన్నది, రెండవది పెద్దది. చిన్నదానికి



31 వ పటము :

మొదటి మొక్కల పరిణామశాఖ


పులింగము, పెద్దదానికి స్త్రీలింగము నారోపింపబడినది. యుద్ధోజ్ఞాశా
 యందు పుట్టు లింగ రేఖవులలో స్వరూప, పరిమాణ, స్వభావములు
 మూడింటియందునుగూడ భేదమేర్పడియున్నది. పులింగ రేఖవులు
 చిన్నవి, గొండకాయ ఆకారముగలవై రెండు టాసములు మొదట
 నుండుటచేత నీటిలో చురుకుగా నీడి స్త్రీలింగ రేఖవులవద్దకు వచ్చును.
 స్త్రీలింగ రేఖవులు, పెద్దవి, గుండ్రనివి, టాసములు లేనివి, కదలక
 పుట్టినచోటనే స్థిరముగానుండును. ఇందు పుంస్త్రీలింగ భేదము
 పూర్తిగానచ్చినది. క్షియోడిరై నాయందీ భేదములు ఇంకను
 కొంచెము పరిణామమును బొందినవి. వోల్వాక్సునందీ భేదము
 లుత్తీర్ణత చెందినవి. స్త్రీలింగ రేఖవు గుండ్రముగా చాల పెద్దదిగా
 నుండును. సూనెచూపముననున్న ఆహారపదార్థమును నిలవజేసి నల్లగా
 నుండును. ఇది గుంపుచుట్టనున్న జీవులనుండి వ్రభవించును. అటు
 వంటి జీవినుండియే సుమాచు నూరువరకు పులింగ రేఖవులు తయారగు
 నును. నిడుపుగా నన్నముగా పొగచుట్ట ఆకారమున పనుపురంగులో
 నుండి యొక్కొకటి రెండేసి విాసములు కల్గియుండును. వాటి సహాయ
 మున నీటిలో నీదులాచుచువచ్చి. స్త్రీలింగ రేఖవులలో కలిసిపోవును.
 ఆలా కలసి ద్విగుణియగును. మేవవియం దిది తన చుట్టను కవచమొకటి
 నిర్మించుకొని యందుగల జీవపదార్థమును కాపాడుకొనును. అనుకూల
 వాతానరణ పరిస్థితులు వచ్చిన పిదప నందుగల గుణగుళిక మున్నందు
 వ్రాస్వవిభజన, తదుపరి యనేక సూక్ష్మవిభజనలకును లోనగును.
 క్షైమిడమోనాసునందు వ్రాస్వవిభజనతర్వాత నొక సూక్ష్మవిభజన
 మాత్రమే జరుగును. పెంజోరై నాయందు 3 జరుగును. యుజోరై నా
 యందు నాల్గు జరుగును. ప్లియోడిరై నాయందును, వోల్వాక్సునందును
 అనేకములు జరుగును. వీటి ఫలితముగా క్షైమిడమోనాసునందు నాల్గు
 జీవకణములు బయటకువచ్చి క్షైమిడమోనాసు లగును. పెంజోరై నా

యందు 16 వచ్చి యవి విడిపోక నొక గుంపుగా బయటబడును. అటువలెనే 32, 128, సుమారు 500 జీవకణముల గుంపులు బయటబడి పెనుగుట కారణించును. ఈ యైదు జీవుల వృత్తాంతమునను పరిణామ మార్గోపాసానముల మాదిరిగా సుబోధకమగుచున్నది. ఇది జంగమస్థితిగల పరిణామమార్గము. స్థావరములైన మొక్కలు గూడ క్రెడమోనాసునుండియే జన్మించినవని యాహింపబడుచున్నది. అట్టి పరిణామమార్గము మరియొకటి. ఉదాహరణకు మరికొన్ని జీవులను గూడ తీసుకొందము.


32 వ పటమున మొక్కలు జంతువులు సూక్ష్మములు. సూక్ష్మ దర్శినిలలో నెట్లు కన్పించునో యట్లు గీయబడినవి. మొదట చదివిన ఏకాశాలజీవులు గోళములవలె గుమిగుడుటవలన నుద్భవించినవి. గోళాకారనిర్మాణములో వోల్వ్యాక్సుకు మించిన పెద్ద జీవు లుత్పత్తిగాక ఆపరిణామమార్గ మంతటితో నంతరించిపోయినది. దానికి ప్రకృతి లోగల అనేక ఆటంకములే కారణము. స్పైరోసైరా (32 వ పటములో 4 చూచుడు) వంటి జీవులు ఎక్కువ బాహుళ్యముగా దేహమును విస్తరించుటకు సవకాశమున్నది. వది, వదిపేను గొట్టములవంటి శాల లొకదానిపెనుక నొకటి యతుకుకొనుట చేత నివి యేర్పడినట్లుండును. ప్రవహించు నీటికాలువలందు నివి సన్నని యాకుపచ్చ దారములవలె కన్పడును. యులోత్రిక్సు (33 వ పటము చూచుడు) కొండవాగులలో నుండును. కొలియోకీటీ తామరతూడులను అంటి పెరుగును. అల్వ్యా (33 వ పటము చూచుడు) సముద్రములో మునుగుచు పాటున బయల్పడుచుండు రాశ్యమీద మొలచును. అన్నిటిలోను స్ట్రోమిలియోజి పిండివదార్థములు తయారగును. అల్వ్యా సముద్రములో నివసించును. వీటిలో కిరణజన్యసంయోగము వలన పిండివదార్థము వంటి వేరొక క్లిష్టవదార్థము తయారగును. వీటిన్నిటియందును లింగ,



2. TRYPANOSOMA
ట్రైపానోజోమా



3. PARAMECIUM
పారామీసియమ్




1. PANDORINA
పాండోరినా



4. SPIROGYRA
స్పైరోజైరా

32 వ పటము ,
ప్రాథమిక జీవులు




యూలోత్రిక్సు
(ULOTHRIX)

అల్వా
(ULVA)

అల్వా జీవితచక్రము


33 పటము :

స్థావరత ననుకరించు మొక్కలు



34 వ పటము :

మరొక పరిణామ మార్గము



డిక్టియోటా



సర్గాసమ్



పోలిస్టోనియా



విల్లోఫారా


35 వ పటము :

కపితములు, రోహితములు

విలింగ విస్తరణలు గలవు. లింగవిస్తరణయందు రెండు సమానమైనవి గాని, యసమములైనవిగాని కలసి ద్విగుణి యేర్పడును. లింగ రేణువులు నీటిలో నీడి కలియుట సామాన్యముగా జరుగును. ద్విగుణి (Zygote) కొలది కాలము విశ్రాంతి బొందినపిదప ప్రాస్థవిభజనలకు లోనయి పిమ్మట సూక్ష్మవిభజనలను బొంది విలింగ రేణువుల నుత్పత్తి జేయును. అవి నీటిలో బయటబడి తల్లి మొక్కనరలో మొక్కలగును. ఈ నాచులన్నిటియందు నీ మూడురకముల సంయోగములు లింగవిస్తరణయందు కాన్పించుచున్నవి: 1. సర్వమాన లింగ రేణు సంయోగము. ఉదాహరణ కెలిడోమోస్. 2. అసమలింగ రేణు సంయోగము (Anisogony) 3. శుక్ల శోణిత రేణుసంయోగము. సంయోగ క్రియ పరిణామమును బొంది తత్ఫలితముగా శుక్ల శోణిత రేణుసంయోగము కల్గినది. ఈ పరిణామమార్గమున నిది యాఖరిమెట్టు. క్లెమిడమోనాసునుండి వోల్బాక్సు శాఖయేగాక యితర శాఖలుగూడ ఉండవచ్చునని తలంచుచున్నారు. అది మొదలు వాలమెల్లా, జెమినెల్లా, యులోత్రిక్సు, డ్రాపర్ నాల్డియా, కొలియోకీటీ శాఖగూడ ఉన్నది. (34 న పటము చూడుడు). స్థావరత ననుకరించు మొక్కలు హరితములైన క్లెమిడమోనాసు లగాయతు కొలియోకీటీవరకు నున్న పరిణామ మార్గమున నేగాక కపితములయందును, రోహితములయందును గూడ గలవు. (35 వ పటము చూడుడు.) డిక్టియోటా, సగ్రానమ్లు కపితములు. పోల్వీసైఫానియా, ఫిల్లోఫోరా అనునవి రోహితములు.

బూజులు, కుక్కగొడుగులు (Fungi): ఇవిగూడ పైనవివరించిన నాచులలాంటి దేహమునుకల్గియున్న జీవులే. కాని వీటియందు హరిత రసముగాని, మరి యేయితర వర్ణద్రవము (Pigment) గాని యుండదు. (36 న పటము చూడుడు.) ఆ కారణమున నివి స్వతః ఆహారమును తయారుచేసుకొనలేక, ఇతర జీవులవీరద నాధారపడి (Parasitism)

జీవించుటగాని, కుళ్ళిపోయిన చేతన మిశ్రమపదార్థములను పీల్చుకొని (Saprophytism) జీవించుటగాని జరుగును. వీటిని మూడు పెద్ద పెద్ద సర్గములుగా భాగించిరి. 1. ఫైకోమైసిటిస్ 2. ఏస్కోమైసిటిస్. 3. బెసిడియోమైసిటిస్. పాసిపోయిన తినుబండారములు, రొట్టెలు, చాలు మొదలైనవాటివీరూ పట్టెడి బూజులు మొదటి తరగతికి జెందును. ఊ. మ్యూకర్. (36 వ పటము చూడుడు.) కల్లులోనుండు బూజుమొక్కలు రెండవతరగతికి జెందును. కుక్కగొడుగులు, మొండి చేతులు మొదలైనవి మూడవ తరగతికి జెందును. (36 వ పటము చూడుడు.) వృక్షశాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయ మీ బూజురకము లన్నియు నాచుజాతులలో నుండి పరిణామరీత్యా యుదయించియుండునని నాచులు తమవర్ణదము (Pigment) ను గోలుపోయి, పరాధీనజీవనము చేయుట కలవాటుపడి బూజులుగామారినవి. ఈబూజులయందు దేహస్వరూపము రానురాను పరిణామ యారోహణము బొందుచుండగా, లింగవిస్తరణ మవరోహణమార్గమున నడిచినది. సామాన్యముగా నన్నిటి యందును విలింగవిస్తరణయే సహజము. లింగవిస్తరణ ప్రాథమిక జీవులలో నాచుజాతులలోనున్నట్లుండి రాను రాను సంకుచితము క్షుప్తము నైపోయినది. దీనినే పరిణామ యవరోహణ మందురు (Regress). బూజు జాతుల విస్తరణ అత్యల్పకాలములో నత్యద్భుతముగా జరుగును. నవీనవైద్యమం దనేక రోగములను నిశ్చయముగా నివారణ జేయుచున్న పెనిసిలిన్ మందును 'పెన్నిసిలియమ్' అను బూజునుండి తయారు చేయుచున్నారు. (36 వ పటము చూడుడు.) ఇనన్నియు నతి సులభముగా విలింగరేణువు (Spores) లను తయారుచేయును. అవి అత్యంత తేలికగాను, సూక్ష్మముగాను. నుండుటచేత గాలిలో నెగురుచుండును. తడిగానుండి కుళ్ళుచున్న యాహారపదార్థమేదైన నున్న యెడల దాని మీద వాలి రేణువు లచిరకాలములో బూజుల నుత్పత్తిచేయును.



36 వ పటము :

హరితస్రవహితములైన మొక్కలు (Fungi)

సం	అర్థ	విస్తర	పుట	సం	అర్థ	కలె
18	తెప్పకలసి	చెప్పకలసి	157	6	సంకలనము	కలె
26	యదుకైత	యదుకైత	158	21	కలెకలె	కలె
1	కాండ	నంటి		28	యనునప్పుడు	యనుచు
4	Archegoria	Archegonia		"	గొంతుక	యనుచు
12	కాలి	కాలి	159	8	కెళ్ళెట్లు	body)
5	వైస	వైస	160	18	కట్టె	y) వైస
14	ఆర్కెస్పోరియమ్	ఆర్కెస్పోరియమ్	160	1	కూచి	కూచి
20	కారి	కారి	"	9	కెళ్ళెట్లు	కూచి
38	పెరిడోప్టెలా	పెరిడోప్టెలా	163	2	Thallophyta	పంపిను,
6	Silotum	Psilotum	"	24	కెళ్ళెట్లు	active
13	Cryptogams	Cryptogams	165	3	కెళ్ళెట్లు	కూచి
	Ptuidophyta	Ptueridophyta		8	కెళ్ళెట్లు	కూచి
14	కెమోసియా	కెమోసియా	168	20	కొంతు	యది
17	కెమెస్పెరిస్	కెమెస్పెరిస్	168	2	కెళ్ళెట్లు	కూచి
22	కెమోసియా	కెమోసియా	"	3	కెళ్ళెట్లు	కూచి
29	యంకా	యంకా	"	18	కెళ్ళెట్లు	కూచి
30	వర్షించిన	వర్షించిన	172	6	Thesbasia	కూచి
28	కెమోసియా	కెమోసియా	"	9	Malvaceae	కూచి
32	కొండలు	కొండలు	"	18	పండినకొండ	కూచి
38	కెమో	కెమో	173	7	Orbanche	కూచి
	విరడోచన	విరడోచన	174	2	పంది అంతు	కూచి
36	కెమో	కెమో	"	18	కెమో	కూచి
19	కెమో	కెమో	176	18	కెమో	కూచి
137	కెమో	కెమో	178	"	Spainy	కూచి
138	కెమో	కెమో	182	4	Synanthopus	కూచి
140	కెమో	కెమో	"	8	కెమో	కూచి
141	కెమో	కెమో	"	18	కెమో	కూచి
16	కెమో	కెమో	183	8	కెమో	కూచి
20	కెమో	కెమో	"	21	కెమో	కూచి
148	కెమో	కెమో	184	24	కెమో	కూచి
144	కెమో	కెమో	185	4	కెమో	కూచి
147	కెమో	కెమో	186	10	కెమో	కూచి
148	కెమో	కెమో	191	11	కెమో	కూచి
150	కెమో	కెమో	193	8	కెమో	కూచి
152	కెమో	కెమో	198	9	Grigar	కూచి
18	కెమో	కెమో				

త ప్పా ప్ప ల వ ట్టి క

తప్ప	ఓప్ప	పుట	పంక్తి	తప్ప	ఓప్ప
క్యూతులే	చిన్నక్యూతులు	84	2	ర్ణముచేతన	ర్ణముచేతన
రకము	మాడవరకము	..	19	లైరసన్	లైరసన్
టి	ఈలాంటి	86	2	టొంది.	టొంది
డు	చూచి	..	3	జీవులన్నిటికంటె	జీవులు
లు	అగ్నికీలు	..	0	లైరసన్	లైరసన్
గుల	చండలమునగుల	..	10	సంవత్సరము	సంవత్సరములకు
	మర్క	..	14	గారియందును	గారియందును
లలో	తీక్షణవశీఃనలలో	..	24	క్రోమేటిన్	క్రోమేటిన్
కున్నారు	చర్చించుచున్నారు	87	8	ప్లైర్లములు	ప్లైర్లములు
యు	చుండుటకును	..	12	ములముల	ముల
చయు	చుండుటకును	..	15	లనియు	లన్నియు
రు	వృత్తియ	88	22	జేక్సీరియము	జేక్సీరియము
itation	Gravitation	88	5	జేక్సీరియము	జేక్సీరియము
force	force	..	8	కోట్లకొంది	కోట్లకొందిగా
cules	Molecules	..	21	వీటియందు	వీటియందు
చుచున్నవి	చూపుచున్నవి	..	26	కొనుచున్నవి	కొనుచున్నవి
లన	రసాయన				చందలసూక్ష్మ
శక్య	వరమాణు				జీవులు
బొమ్మ	పొకొబొమ్మ	80	8	యాహారముదు	యాహారమును
కస్కా	స్కోకోవిస్కా	81	20	జంతువుల	జంతువుల
ంకరకమై	శక్తినికరి	82	17	స్పష్టి	స్పష్టి
atedron	Tetrahedron	Nuceus	Nucleus
పియోగించి	రమ్మినుపియోగించి	88	13	నింక	నింక
ipin	వీర్చి	87	24	పిండును	పిండుడు
syni	లెకోటిన్	108	5	నన్నాసము	నన్నాసము
లెకోటిన్	ప్రాన్ (లేంకోఫిన్)	..	15	యంబెడిదని	యంబెడిదని
లైజిటీ	జియోఫిలి	106	8	క్రియోడిరై	క్రియోడిరై
లెనోజె-	Protiedege-	..	24	క్రిమిడమోనా	క్రిమిడమోనా
లెనోజె-	nous	108	8	క్రిమిడమోనా	క్రిమిడమోనా
లెనోజె-	నంయోక్రాణువిది	107	4	Zygoti	Zygote
లెనోజె-	గోణుపోయి తన	..	8	మొక్కవరలో	మొక్కవర
రకము తన		..	8	నర్వసూన	నర్వసూన
కాపును	జీవసాపు	..	0	క్రిమిడమోన	క్రిమిడమోన
నాణంబు	యాననాణంబు	..	10	Anisogany	Anisogamy
క	యినుక			nuclie	nuclie
నిను	నేర్పతెను			nuclie	nuclie
				Poriferni	

నాధారముగా వర్షకాలము, ముసురుపట్టినవోజులు వీటి విస్తరణకు చాల అనుకూలములు. పశిని-వోట్ల విలింగ రేణువులు మొలకలెత్తి చేతస్యూతము (Inter woven threads) గా చేయును. ఇవి పెంటలు, చెత్త, చదాడు మొదలైనవాటినుండి యాహారము నాస్వాదించుచు నభివృద్ధి బొందును. కొంతకాల మన్న కార్యము (Vegetative body) వృద్ధిబొందిన తర్వాత కామకార్యము (reproductive body) వృద్ధి నొందును. కుక్కగొడుగులయందీ యన్నకార్యము చిక్కువడిన బారములకుట్టలె యుండును. ఇది పెంటలలోపల వ్యాపించుచుండును, కొంత యాహారము నిల్వచేసిన పిదప కామకార్యము (reproductive body) వృద్ధిబొందును. దీనినే ఫలశరీరము (fruit body) అని కూడ వాడుదురు. మొవట పెంటలమీద చిన్న బొడిపినలె యుంకురించి, యది త్వరగా పైకెదిగి యొక గొంతుగు మాదిరిగా తయారగును. ఈ గొంతుగు క్రింద కేంద్రము లగాయుతు పరిధినరకు క్రిక్కిరిసి నన్నని బద్దలు వ్యాపించియుండును (Gills). విలింగ రేణువు లీ బద్దలనుండి యుత్పత్తి యగును. ఇంతకు మించిన వినరములు దీనిని గురించి జనసామాన్యమున కనననరమనియు విసుగుబుట్టించుననియు నుద్దేశించి నదలివేయు చున్నాను. ఇంత సుల్కువైన పూర్ణమున విస్తరింపగలవు గావున నివి ప్రపంచమందంతటను వ్యాపించియున్నవి. ఆ కారణమున ప్రాథమిక జీవులలో నివి యత్యున్నతస్థితిని బొందినవి. సుమారు 70,000 జాతులు ప్రపంచమందంతటను వ్యాపించియున్నవి. నాచు జాతుల మొత్తపు సంఖ్య 14 వేలు. బేక్టీరియములు 12 వేలు. ఈ తరగతి యల్ప జీవులలో బూజుల పరిణామము అత్యున్నతముగా నున్నది. పరిణామముయొక్క ఘనతను కొలుచుటకు, ఒక తరగతి జీవులలో వివిధ జాతుల సంఖ్యయే యొక కొలతబద్దగా వర్తించును. వాటి లింగవిస్తరణలోని క్లిష్టవివరములుగూడ ఘనతను సూచించును.

నీటివసరులు, నాచులు, బూజులు, బేక్టీరియములు నివి యన్నియు గలసియే ప్రాథమికవర్గ మగుచున్నది. వీటినిన్నిటిని గలిపి విభేదశాలా భూజము (Thallophyta) అని వాడుచున్నారు. కేలస్ అనగా ఒకే రకపు శాలలవలన నిర్మింపబడిన దేహము. పై వర్గమునకు జెందిన యన్ని జీవులలోను ఈ నిర్వచనము గోచరించును. శరీరములో నున్న జీవవదార్థశాలలు (Cells) జీవించుట కవసరమైన నీటిని బీల్చుట, ఆహారమును తయారుచేయుట, దానిని నిలువచేయుట, లింగ విలింగ విస్తరణలను సాగించుట మొదలైన కృత్యములన్నియు ప్రతి శాలవలన జరుగును. శాలలయందు ప్రత్యేకధర్మము లేర్పడియుండలేదు. అనగా కొన్ని శాల లొకపని (నీటిని బీల్చుట), మరికొన్ని యాహారమును తయారుచేయుట, యింకొకకొన్ని విస్తరణభారము వహించుట యను వివిధములైన కర్మలు విభజన పొందలేదు. శరీరములోనున్న యన్ని జీవశాలలు జీవించుట కవసరమైన యన్ని పనులు నిర్వర్తించుచున్నవి. అందుచేతి నిట్టి జీవులను ప్రాథమికజీవులుగా పరిగణించవలసియున్నది. దేహనిర్మాణములో విశేషత లేకపోవుటేగాక లింగవిస్తరణలోగూడ తగినంత రక్షణ యేర్పడలేదు. లింగ రోమవులు నిరాధారముగా నీటి లోనికి పంపబడుచున్నవి. శుక్ల రోమవులు కొన్ని నందలు నిర్మింపబడినను రక్షణకు విశేష యేర్పాటులు లేనికారణమున శోణిత రోమవులను జేరలేక ననేకములు నశించుటకు సావకాశమున్నది. వాటి సమాగమానంత రము కలుగు ద్విగుణిగూడ స్వల్పరక్షణ గలది. అట్టివి యనేకములుగా నశించుట కెక్కువ సావకాశమున్నది. ఇంతియగాక యన్న కార్ష్య మందున్న జీవశాలలయందెల్ల ఏకగుణ గుళికలే యుండును. ద్విగుణ గుళికలు (Diploid muclie) ద్విగుణియందుమాత్రమే యుండి కొలది కాలము విశ్రాంతి తీసికొనిన పిదప ప్రాస్థవిభజనకు లోనయి, ఏకగుణ గుళికలు (Haploid muclie) వచ్చుచున్నవి. వీటియం దెక్కువ

కాలము నివసించు దేహమంతయు ఏకగుణముగానే నిర్మింపబడుచున్నది. పై కారణములనుబట్టి యాత్మీరక్షణ పరికరములుగాని, ప్రబలవిస్తరణకు కావలసిన ఏర్పాట్లుగాని వీటియందు తక్కువగా నుండుటచేత వీటిని ప్రాథమికజీవులుగా నెన్ని తక్కిన క్లిష్టసంస్కారములు గల భూజములన్నియు వీటినుండి పరిణామరీత్యా వచ్చినవని యూహించుచున్నారు. ఈ రకపు భూజములు 85000 జాతులు 60 కోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వముత్పత్తియైన ట్లూహింపబడుచున్నది.

ఏమీబా : (28వ పటము చూడుడు) ఇది యొక చిన్న ఏకశాలా క్రిమి. జంతు సృష్టికి ప్రాథమికజీవి. దీని శరీరమునకు చుట్టును ఆనరణ గోడ లేదు. ఆ కారణమున నందున్న జీవపదార్థము నలువైపులకు ప్రాకును. దీనిమధ్య యొక గుణగుళిక మాత్ర ముండును. దీని శరీర మందు సంకోచ (Contractile), వ్యాకోచ (Expandable) సమర్థత గలిగిన ఖాళీప్రదేశము లుండును. అందొకటి ఆహారావకాశము, రెండవది బహిష్కరణావకాశము. ఇది చిన్నజీవియైనను ఆహార స్వీకరణ ఉచ్చాస్య నిశ్శ్వాసము లందును, బహిష్కరణ క్రియలందును పెద్ద జీవులవలె నెరవుచున్నది. పై క్రియలు పెద్ద జంతువులలో క్లిష్టాయవముల ద్వారా జరుగును. ఆ క్రియలే స్వల్పముగా సంకుచితమైన యంగములద్వారా నిధి జరుపుకొనుచున్నది. ఒక ఆహారకణము సన్నిహితమైనప్పుడీ జీవి దానిని చుట్టుముట్టును. ఆ పదార్థమును లోనికి లాగుకొనిన పిదప నాహారావకాశ మేర్పడును. జీవపదార్థము వలన లోనున్న యాహారము జీర్ణమగును. అప్పు డేర్పడు మలినపదార్థములు మెల్లగా బహిష్కరణావకాశమును జేరి క్రమముగా యావలకు గెంటివేయబడును. దీని సంతానోత్పత్తి ద్విభుండ విధానమున జరుగుచున్నది. గుణగుళిక (Nucleus) తో సహా ఈ శరీరము రెండు భాగములుగా విభజింపబడి రెండు స్వతంత్రజీవు లేర్పడు చున్నవి. ఇందు


లింగభేద మేర్పడలేదు. అందుచే సృష్టికి ప్రాతిపదికలో లింగభేదము లేనట్లు తెలియుచున్నది. ఈ జీవీయందు సహజముగా నశించు పదార్థము లేదు. క్వాడ్రులా, రొటల్లా, పోలియాకా, మైక్రాగ్రోవియా, స్ట్రెప్టోస్ట్రెఫా (87 న పటము చూడుడు) జీవులు వివిధ రకములైన కవచముల నేర్పరచుకొనియున్నవి. ఈ కవచములు కొన్ని ఎమీబాబాలు ఆత్మసంరక్షణకై యేర్పప్పుకొనగలిగి ప్రస్తుతము ఎమీబాజీవికి భిన్నముగా కన్పించుచున్నవి. ఈ పరిణామము కాలానుగుణ్యముగా జరిగియున్నది. నీటికంటె పరిణామోన్నతము కలిగినది “పెరమాసియమ్” (82న పటముచూడుడు.) ఇది స్లిప్పర్ ఆకారముగానుండును. దీని పరిమాణము $\frac{1}{2}$ మిల్లిమీటర్ ఉండును. నగ్నదృష్టికిగూడ తెల్లని చిన్న యణువుగా కన్పించును. ఎమీబా నలె గాక నిది నియమితాకారము గలది. దీని శరీరమం దంతటను నన్నని రోమము లుండును. ఇవి గమనమునం దుపయోగపడును. దీనికి రూఢియైన సోరు గలదు. విసర్జనకు బహిష్కరణకాశములు రెండు గలవు. దీని శరీరమధ్యమందున్న ఒక పెద్ద గుళిక శరీరకార్యములను, మరియొక చిన్న గుణగుళిక సంతానోత్పత్తిని జరిపించుచుండును. ముఖ్యముగా నీజీవి ద్విఖండవిధానము నేయన లందించుచుండును. ఒక్కొక్కప్పుడు రెండు పెరమీసియములు సన్నిహితములై వాటి గుణగుళికలను మాన్పుకొనును. ప్రతిదానియందును రెండు గుణగుళికలు లేయారగును. అందొకటి స్థిరమైనది. దానిని స్త్రీ గుణగుళికగా భావించవచ్చును. రెండవది చలనసామర్థ్యము గలది. దీనికి పురుషత్వ మూహించివచ్చును. గుణగుళికల మార్పునం దీచలన గుళికలు ఒకదానినుండి మరియొకదానిలోనికి ప్రవేశించి, యిందున్న స్థిరగుళికలతో మిశ్రమమగును. ఆ విధమున నేర్పడిన ద్విగుణగుళికలు ఒక హ్రాస్వవిభజన, తదుపరి రెండు సూక్ష్మవిభజనలను బొంది తత్పర్యవచనముగ 8 పెరమీసియము లేర్పడును. జీవితవ్రక్రియలు



క్వార్డ్యూలా QUADRULA




మైక్రోగ్రోమియా సోషియలిస్
MICROGROMIA SOCIALIS



రోటల్లా ROTALLA



పోలియోకా
POLYOECA



స్టికోట్రికా
STICHOTRICHKA



సామ్మోక్లెమా
PSAMMOCLEMA


37 చ పటము :
ఏకకోసక జంతువులనుండి
పరిణామ కాఖలు

38 చ పటము :
కాఖోపకాఖలుగా పెరుగు
నొక స్పాంజి

పరిశీలించినచో నియమితాకారము, సంరక్షణోపములు, నోరు మొదలైనవి కల్గియుండుటచేత ఎమీబాకంటే నీ జీవి పరిణామాన్నత మును బొందియున్నట్లు వ్యక్తమగుచున్నది.


బహుకోశికాజీవులు (Poriferai)

'పొరిఫెరే' అనువర్గమునకు చెందిన బహుశాలాజీవులు స్పాంజిలని పిలువబడుచున్నవి. ఇవన్నియు నొకచో స్థిరముగా నుండుకొని, శాబ్దోపశాఖలుగా పెరుగుటచేత వృక్షజాతులను బోలియుండును. ఉదాహరణకు, 1. సైకోకా, 2. సెమోక్లిమా (38 స పటము చూడుడు). ఒలింతస్సులను తీసుకొనవచ్చును. వీటిశరీరము కొన్నివేల ఎమీబాలనంటి జీవశాలలవలన గొట్టములు నిర్మింపబడి అవి శాబ్దోప శాఖలుగా బెరుగును. పరిధిలోనున్న జీనకణములు లోపలనున్న వాటి కంటే భిన్నముగానుండును. ఈ జంతువులు ఇసుకకణములకు సేకరించి తమ శరీరమం దిముచ్చుకొని పుట్టల మాదిరిగా బెరుగును. కొన్నిటి యందు స్పాంజిపీచునలన నసిపంజర మేర్పడును. వీటియందు సంతానోత్పత్తి విలింగరీతిగను, లింగసమాగమము వలనను గూడ జరుగును. విలింగవిధానమునందు బాగుగా బెరిగిన యొక స్పాంజిశాఖ నుండి యొక చిన్నబొడివ ప్రవృద్ధమగును. ఇది పెద్దదియైనపిదప, ఉత్పత్తిస్థానమునుండిరాలి నీటిలో తేలుచుండును. అలా తేలుటలో నొక బండకు తగిలినచో దానికి క్రమముగా యతుకకొనిపోయి స్పాంజిగా బెరుగుట కారంభించును. ఈలాంటి చిన్న బొడిపెలు ఒక్కొక్క స్పాంజినుండి కొన్నినందలు తయారయి కొంతకాలము నీటిపైన తేలుచుండి, యాపైన నతుకకొని, తిరిగి స్పాంజిలుగా నెదుగుట కారంభించును. ఈరకపు అభివృద్ధి వృక్షజాతులలో నెక్కువగానుండి యితరజంతువులలో చాల అరుదుగా కన్పించు



39 వ పటము :

మధ్యావకాశ జీవులు (Coelenterata)



40 వ పటము :

ఎనిలీడా (Annelida)

ఒబీలియా (39) న పటము చూడుడు) యనునది దీనికంటె పకా మోన్నతము గలది. ఇది నగ్నవృష్టికిగూడ గోచరించును. అనేక శాఖోపశాఖలుగల్గిన చెట్టువలె నిది యొకచో పాతుకొని పెరుగుచుండును. దీని శరీరమును పరిశీలించినచూడ నిది యనేక హైడ్రాజీవుల సముదాయమని తోచును. దీనియం బాహారస్వీకరణము, ఉత్పత్తి నిధానము హైడ్రాలోవలెనే యుండును. ఒబీలియానుండి విలింగ విధానమున మెరుస్సాలు తయారయి, నీటిలో విడువబడి కొంతకాలము జీవించిన పిదప, శుక్ల శోణిత లింగకణముల నుత్పత్తిజేసి నీటిలోనికి వదలును. ఈ కణములు నీటిలో కలసి ద్విగుణితయేర్పడి, దానినుండి ఒబీలియాకోలనీ వచ్చును. ఈజాతి జీవులు ఎనిమాబాలాంటి ఏకశాలా జీవులసముదాయమునలన పరిశామమునొందినవనుట సులభగ్రాహ్యము.


ఎనిలిడా (Annelida)

ముందు వినరింపబడిన ప్రోటోజోవా సిలింటరేటా తరగతుల జీవులలో చూచుటకు కష్టంగాని, వినుటకు చెవులుగాని, రుచి చూచుటకు నాలుకగాని ప్రత్యేకముగా నేర్పడి యుండలేదు. శరీరావయవ నిర్మాణములోగూడ హృదయముగాని, రక్తప్రవాహిగాని, నరముల సముదాయముగాని, ఉపిరితిత్తులుగాని యేర్పడి యుండని కారణమున నివి పరిశామమార్గమునందు ప్రాథమికదశలో నున్నవని చెప్పవలసి యున్నది.


జలగ, వాసపాము (Earth worm), సిర్ప్యులిడ్ (Serpulid) అను జీవులు 'ఎనిలిడా' వర్గమునకు జెందినవి. వీటి శరీరము పొడుగుగా నుంగరముల సముదాయమై యుండును. ఒక్కొక్క దానియందు 100 మొదలు 120 నరకు నుంగరము లుండును. ఈ తరగతి జీవులన్ని

టను పార్శ్వములందు అవయవవానురూపము (Bilaterally symmetrical condition) కల్గియున్నది. వీటియందు చర్మములో మూడు భాగములు గలవు. వీటిని ఉపరి, మధ్య, అంతరభాగములని వాడవచ్చును. శరీరమందంతటను చర్మముక్రింద నొక యవకాశముండును. దీనిని సిలోమ్ అందురు. వీటియందు గల యాహారనాళికముఖమువద్ద నుండి శరీరముచివరవరకు వ్యాపించియుండును. ఈ నాళికయందు ప్రథమమున నోరు, పిమ్మట గళము, దానితరువాత 'గిబార్డ్' అను భాగము కల్గియుండి, మిగిలినది పేగుగా వర్తించుచున్నది. పేగు కడపటిభాగము గుడముగా తెరువబడియుండును. ఈ జంతువులు ప్రత్యేకమైన చలనావయవములు (Lumbicus), బహిష్కరణావయవములు, రక్తము ప్రవహించు గొట్టములు, సూక్ష్మమైన మెదడు, దాని ననుసరించి నాడీతంతులు గల్గియుండుటచేత సిలింటు లేటా తరగతి జీవుల కంటె సత్యంత పరిణామోన్నతమును గల్గియున్నవి. ఇవి స్త్రీపురుషావయవములు రెండినీ కల్గియుండును. కాని యుత్పత్తిక్రియయందు, రెండు సమాగమించి, యొకదాని శుక్లకణములను మరొక దాని కందించును. తదుపరి ద్విగుణ లేర్పడి, అవి కైటెల్లమ్ అను నుంగరమునజేరి యీవలకు వచ్చును. తరువాత ఒక్కొక్క ద్విగుణి ఒక్కొక్క ఏలుగుపాముగా తయారగును.


(Arthropoda) ఆర్థ్రోపొడా గొలుసుకట్టుజీవులు. బొజ్జిక, రొయ్య, తేలు, జెరి, చీమ, దోమ, యీగ. పేను శీతాకోక చిలుకలు మున్నగు కీటకములన్నియు నీ తరగతిలోనివి. (41 వ పటము చూడుడు). మిగత యన్ని జీవులసంఖ్యకంటె నీ తరగతి జీవులసంఖ్య యనేకరెట్లున్నది. వీటియందుగూడ పార్శ్వ అవయవవానురూపత (Bilateral symmetry) కలదు. వీటియందు ఎనిలీడాజాతి జంతువులలోలేని కొన్ని జ్ఞానేంద్రియము లంకురించినవి. చూచుటకు కండ్లు, స్పర్శజ్ఞానమునకు యిరుకైన



బొబ్బిలిక COCKROACH



పేము ANT (FORMICA)




పెదనాక



పెదడు

నాడీముసము



పెల్లా నేక్విమా PERLAMAXIMA

అపొరనాకలోని భాగములు 1 నోరు 2 యాసాపేగు 2a క్రాప 3 గిత్తార్ 4 కార్టిజీరియర్ గ్లాండ్సు కమిటిగట్ 6 మార్ ఫిఫ్టియన్ టూట్లు 7 యింటస్టిన్ 8 రక్తమ్

41 వ పటము :

ఆర్థ్రోపాడా (Arthropoda)

కొరడాలసంటి మీసములు, నాలుక, పండ్లు మొదలైనవి కల్గియున్న నోరు, వేగముగా చలించుటకు కాళ్ళు, రెక్కలు మొదలైన యన యనము లభింపజేసెదనవి.

వీటి శరీరమును తల, మొండెము, ఉపమొండె మను మూడు భాగములుగా విభజింపవచ్చును. తలయందు నోరును, యితర జ్ఞానేంద్రియములును గలవు. మొండెముం దడుగుభాగమున మూడుతల సంపూర్ణముగా పెంపొందిన కాళ్ళున్నవి. ఈ కాళ్ళు గొలుసుకట్టుగా నుండును. ప్రతికాలును తొడతో ప్రారంభమై యారుభాగములుగల్గి సంయుక్తముగా నుండును. (41 వ పటము చూచుడు). కొన్నికీటకము లలో నీ మొండెము నాశ్రయించుకొని యిరువైపుల పైభాగమున రెక్కలుండును. ఉపమొండెమునందు పొట్ట, దానిచివర గుదము, మూత్రానయవము ఉండును.

వీటియందు పట్టకొనిన యాహారమును చక్కగా నమలి చిన్న చిన్న తునుకలుచేసి గొంతులోనికి పంపించుటకు నాలుకయును, మేండి బుల్స్ అను పండ్లను గలవు. అలా స్వీకరింపబడిన యాహారము గళము దాటి, క్రమముగా యీసాఫేగస్, క్రాప్, గిజర్డ్, దుశెంటిరాక్, యిలియమ్, కోలక్, రెక్టమ్ అను నాహార గొట్టముల వివిధ భాగముల ద్వారా నడిచి, గుదమునుండి యావలికి నెట్టివేయబడును. క్రింది భాగమున శ్వాసక్రియ కువయోగించు గొట్టములు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించియున్నవి.

ఈ తరగతి జీవులందు, ఎనిలిదా తరగతి జీవులవలె గాక స్త్రీపురుష వివక్షత గలదు. వీటియందు రక్తప్రసారము నాశములగుండా జరుగుట లేదు. పథుమూడు చిన్నచిన్న గదులనుండి రక్తప్రవాహి నడువ బడుచుండును. నాడీమండలము ఎనిలిదాలోవలె రెండునాడులు

సమానాంతర సరళ కేళులవలె నొక యుంగరము లాంటి మొదలునుండి సాగుచున్నది.

వీటియందు విలింగ్ ఉత్పత్తి విధానము కన్పట్టదు. దీనినిబట్టి పరిశీలించగా విలింగ్ ఉత్పత్తి విధానము వ్రాణమిక మని తెలియుచున్నది. పరిణామపూర్ణమున రాను రాను ఇది నిశువ బడినది. సరింగ విధానము నందు స్త్రీ, పురుష సమాగమము జరిగి తిత్పర్యవసానముగ నొక చిన్న సంచినంటి కక్టా ఉత్పత్తి యగుచున్నది. ఈ కక్టాను నందనేక స్వగుణ లుండును. ఒక్కొక్క ద్వీగుణి చివరి ఒక్కొక్క బొజ్జంకగా నభివృద్ధి జెందును. ఈ యభివృద్ధి కక్టా లోపలనే జరిగి పూర్తిగా వెలిసిన బొజ్జంకలు ఈవలకు బయల్పడును. ఇంతవరకును వర్ణింపబడిన జీవులన్నియు వెన్నెముక రహితములు (Invertebrata). వీటినుండి పరిణామరీత్యా వెన్నెముక సహితములైన జంతువు లంకురించినవి.

అర్తోపొడా తరగతికంటె పరిణామోన్నత మున్నను లేకపోయినను ఇతరమార్గములద్వారా పరిణామమునుబొందిన జీవులు గలవు. వీటిలో ముఖ్యమైనవి: (1) ఎకినోడెర్మేటా (2) మొలుస్కా (44 న పటము చూ.) ఇందు మొదటితరగతి జీవులను నక్షత్రమీనులు (Star fishes) అందురు. సామాన్యముగా సముద్రములో కన్పించునవి (1) నక్షత్రపు చేప, (2) సముద్రపు దోసకాయ, (3) సీ ఆర్పిన్, (4) ఫెదర్ ఫ్లార్స్ (పటము 42, 43 చూడుడు).

వీటియందు దన్నిటను వస్త్రలానయవానురూపత (Radial symmetry) యుండును. శరీరమందు పెద్ద యనకాశ మన్నిటికిని ఉండును. ఈ జాతి జంతువులన్నియు సముద్రమందే యుండును. క్వాలియమ్తో నిర్మింపబడిన యస్థివంజర మన్నిటికిని కలదు. నాడీమండలము, రక్తవ్రసరణ మండలము, చలనావయనములు వీటియందు పూర్తిగా పెంపొంది



ASTERIAS



SEA URCHIN




CUCUMARIA
(పముద్దప దోహాయి)



ANTEDON



నక్షగర్ల HELIX SP.



ఆహారనాళము
మొదలు

పొ. హృదయము
కా. కాలయము



తెర్రెబ్రియా
TERBERIA OCULATA




అన్నిప్ప
ఎనోడొంటా ANODONTA

42 వ పటము :

సక్షత్రపుచేపలు (Echinodermata)

44 వ పటము :

సత్తగర్ల తరగజీవులు (Mollusca)



43 వ పటము ।
విష్టాఫైటాన్ (Astrophyton) .

యున్నవి. ఉత్పత్తివిధానము పూర్తిగా కలిగివిధానమై యున్నది. విరిగిపోయిన తమ దే: యంగమునైనను తిరిగి యుచిరకాలములో పూర్తిచేసుకొను శక్తి ఈ తరగతి జంతువులకు మిక్కిలముగా కలదు. తమ శత్రువుల కండకుండ పారిపోవుటకు తగిన చలనాంగములను, అట్లు వీలుకానిచో ప్రతిఘటించి యెదుర్కొనుటకు తగిన యణుకల శక్తిని కలిగియున్నవి.

2. మొలస్కా (Mollusca) నత్తగుల్ల తరగతి. (44 వ పటము చూడుడు.) వీటి కుదాపాకణముగా నత్తగుల్లలను, ఆలిచిప్పపురుగులను, శంఖపు పురుగులను, గవ్వపురుగులను బేర్కొనవచ్చును.

ఈ తరగతిజీవు లన్నిటికిని కేల్లియమ్ కాళ్షర్యముతో తయారు కాబడిన గుల్ల యుండును. ఆలిచిప్పలందు రెండు సమానములైన చిప్పలమధ్య మెత్తిని శరీరముగల జంతువు జీవించుచుండును. ఇది మంచినీటిలో మాత్రమే పెరుగగలదు. సముద్రములో పెరుగువాటికి చిత్ర విచిత్రములైన గుల్ల లుండును. శంఖములు, గవ్వలు మొదలైనవి సముద్రములోనే ఉండును. వీటియం దమూల్యమైనది ముత్యపు చిప్ప జీవి. ఇది ఆలిచిప్పలజాతికి తెందినది. విధివశమున దీని శరీరము లోనికి నొక యిసుక రేణువుపడినప్పు డది ముత్యమును నిర్మించుట కారంభించును. ఒక ముత్యమును నిర్మించుటకు సుమారు 6 లగాయితే 8 సంవత్సరములవరకు పట్టును. వీటికి చిన్న రంధ్రమువలె నోరు మధ్యగా నుండును. నోరువెంబడి సన్నమైన గొంతుక యుండును. గొంతుక దాటినపిదప వంకరగానున్న పొట్టయు, దాని వెనుక సన్నని వంకరలు తిరిగిన పేగును ఉండును. పేగుచినరభాగము గుదముగా వర్తించును. శరీరములోపలిభాగమున రెండుజతల 'గిల్పు' (మొప్పలు) ఉండును. వీటి సహాయమున నీటిలో లీనమైయున్న ప్రాణవాయువును

గ్రహించి యుచ్చాస్పృశక్రియను జరుపుకొనుచుండును. వీటికి మాత్రమును తయారుచేయు కిష్టిలు కలవు. రక్తప్రహాతికి కావలసిన హృదయము, దాని ననుసరించి శాఖోపశాఖలుగా నాళములు నుండును. హృదయమునందు ఒక 'వెంట్రీకల్' (జఠరిక) అనునది, దానిపైన రెండు 'ఆరికిల్స్' (కర్లికలు) అను గదులు ఉండును. గిల్సులో పరిశుభ్రపడిన రక్తము హృదయములోనికి వచ్చి, అచ్చటనుండి యితర భాగములకు ప్రవహించుచుండును. కాని యపరిశుద్ధరక్తము గూడ హృదయమునకు ప్రవహించుటకు సావకాశమున్నది. అందుచేత మిశ్రమరక్తమే హృదయమునుండి తదితరభాగములకు పంపబడుచుండును. నాడీమండలము గొంతుకన్నదనుండి ప్రారంభమై శరీరమందంతటను వ్యాపించును. నాడీమండలము ముఖ్యముగా రెండు నర దారములు సమానాంతరములలో వ్యాపించుటవలన సంఘటింపబడుచున్నది. వీటిననుసరించి యందందు పెద్దపెద్ద ముద్దలుగా నరముల పదార్థముండును. ఆట్టి ప్రదేశములను గేంగ్లియా లందురు. ఇంద్రియములన్నియు మిక్కిలి అల్పశక్తియుతము లైనవి. చూచుటకు కండ్లుగాని, వినుటకు చెవులుగాని యేర్పడియుండలేదు. కొద్దిపాటి స్పర్శజ్ఞానము మాత్రము వీటికి కలదు. అంచుచేత నొక నత్తగుల్లలోని పురుగు వ్రాకుచున్నప్పుడు మన మేదైన పుల్లతో దానిని తాకినచో, నది వెంటనే ముడుచుకొని తనగుల్లలోనికి పోయి కవాటమును బంధించుకొనును. చుట్టను ఉండు గుల్లలోపలి జంతువును శీతోష్ణాదులనుండి కాపాడుటే గాక శత్రువులకుగూడ యభేద్యమైయుండును. దీనినిబట్టిచూడ ఈజాతి జంతువులకు ఆత్మరక్షణజ్ఞాన మెక్కువగా నభివృద్ధిచెంది యున్నదనుట యతిశయోక్తిగాదు.

వీటియందు స్త్రీ పురుష భేద మున్నది. స్త్రీగుల్లలోని జీవీయందు గల శోణితకణములు క్లోవకాలానికిచేరి యచ్చట శుక్లబీజములతో

కలసి ద్విగుణులైర్పడును. ఆ ద్విగుణులు గిల్లులోనికి మెల్లగా జరిగి యభివృద్ధిపొందును. శిశునిస్థాణము పూర్తియైన పిదప నీటిలో విడువబడును.

ఇంతవరకు నర్ణింపబడిన జంతుతరగతులలో వెన్నెముక యెంత మాత్రము లేదు. కనుక నాతరగతి జంతువులను వెన్నెముక రహితములు (Invertebrata) అని యందురు. ముందు విపులముగా నర్ణింపబడిన వృక్షజాతులు (Thallophyta) యీ వెన్నెముక రహితములైన జంతుతరగతులు, సుమారు నలభైకోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వమున్న జీవసృష్టిలోనివి. అప్పుడు వీటికంటె క్లిష్టమైన జీవులు లేనేలేవు. ఈజంతు వృక్షజాతుల పరిణామమువలన, వీటికంటె క్లిష్టమైనవి, ఆత్మరక్షణజ్ఞుల మధికముగా గలవి, జీవధర్మమును నిర్వర్తించుటలో యెక్కువ శాతము గలవియైన జీవులు దర్శించినవి.

సైలొరియన్, డెవోనియన్ మహాయుగములు

ఈ మహాయుగములు ఆర్కెయిక్ మహాయుగములోని యంతర్భాగములు. వీటివరిమితి సుమారు పదికోట్ల సంవత్సరములు. నవీన కాలమునకు నీ రెండు యుగములు ముప్పదికోట్ల సంవత్సరముల మెనుకటివి. నలభైకోట్లసంవత్సరములకు పూర్వము ప్రారంభమై, ముప్పదికోట్లసంవత్సరములకు పూర్వము ముగిసినవి. వీటికి పూర్వము అనగా ఆర్కెయిక్ మహాయుగ పూర్వభాగమున జీవసృష్టియందు నాచుజాతులు (Thallophyta) ను, జంతుసృష్టిలో వెన్నెముక రహితము (Invertebrata) లును మాత్రమే భూమండలముమీద నుండెడివి. సైలొరియన్, డెవోనియన్ మహాయుగములలో బెల్లులు, పీచులు లాంటి మొక్కజాతులును, జంతు సృష్టిలో వెన్నెముక గల్గిన చేపలు మొదలైన జంతువులును ఆవిర్భవించినవి.

బెల్లులు (Liver worts) పీచులు (Mosses):

పై రెండుజాతుల మొక్కలనుకలిపి బ్రైయోఫైటా (Bryophyta) అని వాడుదురు. సముద్రమట్టమునకు, రెండువేలయడుగుల యెత్తుగల కొండ లోయలలోను, అంతకుమించిన యెత్తుగల ప్రదేశములలోను, నీ జాతులు విచివిగా బెరుగుచుండును. ఎల్లప్పుడు నీరు, తేమ, నీడ గల్గిన ప్రదేశములలో నివి ప్రబలముగా బెరుగును.

ఇందు మాఝేన్నీయా (Liver worts) కాలేయ మూలికలలోనికి, ఫునేరియా యను పీచుజాతి (Mosses) మొక్కలలోనికి చెందును. వీటియందు స్వరూపభేదములు కొన్నియున్నను నివి బహుసన్నిహితము లైనవి. ఒక మొక్క స్వేచ్ఛగా జీవించవలెనన్న దానికి ముఖ్యముగా కావలసినవి మూడు జీవితక్రియలు: 1. నీరును పీల్చుట 2. ఆహారమును తయారుచేయుట 3. ఎక్కువగా నుత్పత్తి చేయబడిన యాహారమును దాచుకొనుట. ఇంతకుపూర్వము వర్ణింపబడిన నాచు జాతులలో (Thallophyta) నీ మూడు పనులు శరీరమందుగల ప్రతి శాలయు చేయును. ఇందొకపని కొన్ని భాగములు, మరొకపని యితర భాగములు నిర్వర్తించవలయునన్న నిషేధముగాని శరీరాంతర్భాగము లలో చేయవలసిన పనుల నిర్ణయము (Division of labour) గాని లేదు. సూర్యరశ్మివలన ఆహారము తయారుచేయు శాలలే యవసరమైనచో నీటిని బీల్చుట, ఆహారమును దాచుట మొదలైన క్రియలు జరిగించుచున్నవి. ఇట్టివి పరిణామమునుబొంది కాలేయమూలికలు గాను, పీచుజాతులుగాను మారినవి. క్రమముగ వివిధశరీర భాగము లలో ప్రత్యేకపుపనులు నిర్ణయింపబడినవి: 1. నీటినిబీల్చు భాగము వేరు. 2. ఆహారమును నిర్మించుభాగము ఆకు 3. ఆహారమునుదాచు భాగము కాండము. బ్రైయోఫైటునందీ మూడుభాగములు


సీర్పడుటచేత నివి క్లోమ్మేటా కంటే పరిణామోన్నతము గలవని చెప్పవలసియున్నది.

కాలేయ మూలికలలో మొక్క నవారుబద్ధి, డబ్బను మొదలైన వాటివలె సాగుచు, రెండు రెండు శాఖలుగా విడిపోవుచు జెరుగును. మొక్కకు పైభాగమునం దంతటను హరితస్ర ముండుటవలన ఆకు మాదిరిగా నాహారమును తయారుచేయును. దీని క్రింద పొలలోని శాలలయందు హరితస్రము క్రమముగా తగ్గి, యింకను దిగువను పూర్తిగా లేకుండును. అటువంటి శాలలలో నధికముగానున్న యాహారము దాచబడును. ఈ ప్రదేశమునుండి సన్నని చారములవంటి వేళ్ళు నేలమీదకు వాలును. ఒకశాల దళసరి మాత్రమే గలది గావున వీటిని 'రైజోయిడ్స్' అందును. వాస్తవమునకు ఈ వేళ్ళుచేయు 1. నీటినిపీల్చుట 2. భూమిలోవారు కొనుట అను రెండుపనులను చేయుచుండును. ప్రత్యేకించి దీనికి కొమ్మయనునది యేర్పడలేదు. మొదలు, లేక కొమ్మయొక్క పని ఆకులకు నాధారమై యుండుట, రెండు అధికాహారమును దాచుట. ఈవిధమైన విభాగమునందు పునేరియా దీనికంటే నొక మెట్టధికముగానున్నది. దానియందు భూమిలోపల వేళ్ళు (Rhizoids), పైన మొదలులాంటి సన్నని కాండము, యీ కాండము నాశ్రయించుకొని యన్నివైపులను చిన్న చిన్నయాకులు గలవు. మొక్కయొక్క శరీరము ఈ విధముగ ముఖ్యమైన విభాగములను బొందుట కిదియే ప్రాతిపదిక. దీనినే కార్మిక విభాగము (Division of labour) అని చెప్పదురు. (4వ పటము చూచుడు.)

సంతానోత్పత్తివిధాన మీరెంటియందు నించుమించుగా నొకే రీతి నున్నది. ఆకుపచ్చగానుండి, యాహారము నుత్పత్తికేయగల శరీరము రెంటియందును ఏకగుణగుణికలచేత (Haploid nuclei)

నిర్మింపబడినది. లింగకణముల నుత్పత్తిచేయును గనుక నీ శరీరమున్ను సలింగశరీర (Gameto Phyte) మందురు. ఒక్కొక్కొక్కొక్క యొక్క రకపు లింగ రేణువులను తయారుచేయును. శోణిత రేణువులు కూజాలాంటి (Archegoria) పెరుగుదలలయం నొక్కటిగా నుండును. ఈ కూజాలు మాత్రము గుత్తులు గుత్తులుగా నుండును. శోణిత రేణువు ఒక గుణగుళికను (Nuclues), దానిచుట్టును జీవపదార్థము మాత్రము కల్గియుండును. అట్టిది కూజాకు అట్టడుగు భాగమున నుండును. కూజాయడుగుభాగము దళసరిగానుండును. ఈ భాగమును 'కుబ్జము' (Venter) అనవచ్చును. దీనిపైన సన్నని గళము (Neck) ఉండును. ఒక్కొక్క కూజాకు కుబ్జభాగములో శోణిత రేణువు, దానిపైన కుబ్జగళ (Ventral canal cell) గుళిక, వాటిపైన గళ ప్రదేశములో 6 మొదలు 8 వరకు గుణగుళికల సహితమైన శాబలు ఉండును. (4వ పటము చూడుడు).

మరికొన్ని కొమ్మలమీద శుక్ల రేణువులను తయారుచేయు పీచాలలాంటి పెరుగుదల లుండును. ఈ పీచాలను (Antheridia) అందురు. ఒక్కొక్క ఏం తెరిదియమునం దనేకవందల శుక్ల రేణువులు తయారగును. శుక్ల రేణువున కొక గుణగుళిక సన్నవై వంకరగానున్న జీవపదార్థము, దాని కొనయందు రెండు మీసములు ఉండును. ఏం తెరిదియము పై భాగమున టోపీలాంటి కప్పు దాని వక్రదళలో మెత్తబడి నశించిపోవును. అంతట లోనున్న శుక్ల రేణువులు నీటిలో మీసముల సహాయమున నీడుకొనుచు బయటబడి కుజాలవైపు ప్రయాణము చేయును. అప్పటికి గళమునందున్న గుణగుళికలు నశించిపోయి, శుక్ల రేణువునకు నిరాటంకమైన మార్గ మేర్పడును. కూజాగళము ద్వారా శుక్ల రేణువు ఈడుకొనుచు వచ్చి శోణిత రేణువులో నైక్యమగును. శుక్లశోణిత గుణగుళికలు రెండు కలిసి యొక పెద్ద గుణగుళిక యగును.




45 వ పటము :

ఘృనేరియా జాతి జీవితచక్రము

దీనియందు గుణ రేఖలు (Chromosomes) కెట్టింపు ఉండుటచేత ద్విగుణి 'Zygote' యందును. అలా ఏర్పడిన ద్విగుణి కొద్దిపాటి విశ్రాంతి యనంతరము సూక్ష్మవిభజన ప్రారంభించును. అనేక చందలనాల్గు సూక్ష్మవిభజనక్రియ జరుగుసరికి నొక శరీర మేర్పడును. ఈ శరీర మంతయు ద్విగుణగుణికవలన నేర్పడినదిగావున దీనిని ద్విగుణశరీర (Diploid generation) మనవచ్చును. విలింగ రేణువు లీ శరీరమువలన నుత్పత్తియగును గావున దీనిని విలింగశరీర (Sporophyte) మని కూడ వాడుకచేయుదురు. పూర్తిగా బెరిగిన ఈ విలింగశరీరము అడుగున వాడ మును, దాని ననుసరించి పైవ 'సీటా' యను కాడయును, కొనయందు 'కేస్సుల్' అను కాయయు కలిగియుండును. ఈ కాయ కొక మూత యుండును. పక్కదశలో మూత గుండ్రముగా కాయనుండి విడువల పొంది గాలికి క్రింద పడిపోవును. కాయలోపలి భాగమున కొన్ని ప్రత్యేకశాలలయందు గల ద్విగుణగుణికలు ప్రాస్పవిభజనను బొందును. అట్టి ప్రత్యేకకోశికాపంక్తిని ఆర్కొస్పోరియమ్ అందురు. అందువలన పుట్టు గుణగుణికలలో గుణ రేఖలు (chromosomes) సంఖ్య సమ మగును. అట్టి గుణగుణికలు ఏకగుణగుణికలు. వీటివలన విలింగ రేణువులు తయారగును. చుట్టును గోడగలిగి లోపల 2క ఏకగుణగుణిక కొద్దిపాటి జీవవదార్థము గలవి ఈ విలింగ రేణువులు. ఈ రేణువులు చాల చిన్నవి. బహు తేలికయైనవి. మూతపీడిపోయిన కాస్సుల్ కాయ ముఖద్వారము పళ్ళవలన కప్పబడియుండును. కాలి వేడిగా నున్నపు డీ పళ్ళు నీటిని గోలుపోయి నిలువుగా నిలుచును. చల్లని కాలములలో నివి నీటిని గ్రహించి బరువెక్కి ముఖద్వారమును మూసివేయును. అందుచేత విలింగ రేణువులు (spores) బయట గాలిలోనికి పోవుటకు ఉష్ణవాతావరణ పరిస్థితులే యనుకూలములు.


యశ్చేచ్ఛగా నెగురుచున్న విలింగ రేణువులు కొంతకాలమునకు భూమినిచేరి, యందు తేమయున్నచోట నవి విభజనపూర్వకముగా నెదిగి మార్కేన్సియాలు, ఫ్యూనేరియాలు నుద్భవిల్లుచుండును. వీటియందుగల విశేషము : ఏకగుణ శరీరమునకు నాధారము ద్విగుణశరీరము, ద్విగుణ శరీరము కల్గుటకు కారణము ఏకగుణశరీరము. ఇవి రెండును జీవితచక్రము నందు నొకదానినొకటి యనుసరించి చక్రమును పూర్తి చేయును.

వ్రాతిపడికజేవులైన నాచులకంటె వీటియందుగల పరిణామవిశేషములు మూడు: (1) మొక్క శరీరములో కర్మవిభాగము లేర్పడి, ప్రేళ్లు, కాండము, ఆకులు యేర్పడుట. (2) నిస్పహాయులైన లింగ రేణువులకు కొంత రక్షణ, సంరక్షణ కలుగుట. (3) ద్విగుణ శరీరము విస్తరించుట. నాచుల (Thallophytes) లో నీ ద్విగుణశరీరము ద్విగుణి (Zygote) తోనే క్లుప్తమగుచున్నది. కాలేయమూలికలందును, వీచు మొక్కలందును, ఈద్విగుణి పెంటనే ప్రాస్వవిభజననుబొందక మున్నందుకొన్ని నూత్నవిభజనలు పొందుటచేత నీద్విగుణశరీర మేర్పడుచున్నది. ఈ ఘట్టమే పరిణామసోపానము. కాని బై'యోఫైటుస్సందు స్వతంత్రశరీరము ఏకగుణశరీరమే (Gametophyte) ద్విగుణశరీరము అస్వతంత్రము; అనగా తనకు కావలసిన యాహారపదార్థము తాను నిర్మించుకొనలేనిది. ఆ కారణమున ఏకగుణశరీరమునుండి దానికి కావలసిన యాహారమును బీల్చుకొనుచు జీవించును. స్వతంత్రజీవి గనుక ఏకగుణ శరీరము బహుకాలము, సర్వదా జీవించును. అస్వతంత్ర జీవిగావున ద్విగుణశరీరము తాత్కాలికముగా ద్విగుణి వలన నుత్పత్తియై కొలదికాలము జీవించి విలింగ రేణువుల నుత్పత్తి చేసి, వ్యాపింపజేసి నశించిపోవుచున్నది. ఇంతవరకు రెండు పెద్ద తరగతుల మొక్కలనుగూర్చి వివరించియున్నాను. ఇందు ముఖ్యముగా గమనింపవలసిన విషయము ఈద్విగుణశరీరమును గూర్చియే. మొదటి



ఎంతోసినాస్ ద్విగుణి

- 1 ఎంతోసినాస్ సహజపృథాకము
- 2 హెచ్చింపబడిన ద్విగుణి నిలువుబుద్ధ



ANTHOCEROS

46 వ పటము :


ఎంతోసినాస్ ద్విగుణి, ఏకగుణి

తరగతి మొక్కలలో జీవితమంతయు ఏకగుణ శక్తికముతోడనే గడవబడుచున్నది. ద్విగుణశరీరము ఏకశాలా సంకుచితము, స్వల్పకాలానుభవము. రెండవతరగతి మొక్కలలో ఏకగుణశరీరము చాలకాలము నివశించునట్టి, స్వతంత్ర జీవనము చేయుగల్గినది. ద్విగుణశరీరముగూడ కొంతవిస్తారతను బొంది, స్వతంత్రజీవనశక్తిలేనిదై యొకసారి విలింగ రేణువుల నుత్పత్తిజేయగానే నశించుచున్నది. వీటితర్వాత మొక్కజాతులను “ఆరిడోఫైటా” యందును. వాటియందన్నీటను ద్విగుణశరీరము వేళ్ళు, కాండము, ఆకులు కల్గిన స్వతంత్రబహుకాలజీవి. ఏకగుణ శరీరము సంకుచితము, అల్పము కాని అదిగూడ స్వతంత్రజీవయే. ద్విగుణశరీర మెల్లప్పుడు విలింగ రేణువుల నుత్పత్తిజేయుట, ఏకగుణ శరీరము లింగ రేణువుల నుత్పత్తిజేయుట యనునది యన్ని తరగతుల మొక్కలకును సమానము. అనగా కాలేయమూలికలు, నాచు మొక్కలు గల తరగతి మొక్కలలోని ద్విగుణశరీరము స్వతంత్ర జీవయగుటకు ప్రయత్నించి సాఫల్యమును బొందిన దనుట. ఈ ప్రయత్నము, దానిసాఫల్యము పరిణామముగా గ్రహంపవలసియున్నది. ఈపరిణామ మొక్కసారి హఠాత్తుగా జరిగినది గాదు. కాలేయమూలికలోని యస్వతంత్ర ద్విగుణశరీరమునకును, ఆరిడోఫైటా మొక్కలలోని స్వతంత్ర ద్విగుణశరీరమునకును మధ్య సోపానములు గలవు. ‘సంతో సిరాస్’ (Anthoceros) అను కాలేయమూలిక జీవచక్రమును పరిశీలించినచో కొన్ని యానవాళ్ళు దొరకుచున్నవి. (46 వ పటము చూడుడు). ఆ మూలికయందు గల ద్విగుణశరీరము మిగత వర్ణింపబడినవాటిలో వలెగాక, నిలువుగా గడ్డిపోచవలె పెరుగును. దీని యుపరిభాగమునందంతటను హరితస్రము గలదు. అందుచేత కొంతవరకు తనకు కావలసిన యాహారనిర్మాణమును చేసుకొనగలుగుచున్నది. అడుగుభాగమున వేళ్ళమాదిరిగా చీలికలుగలిగి యుండును. దీనియందు విలింగ రేణువులు

వ్యవసాయాలోచనల గాక, సరాసరి యేక పాడుగుగానున్న ద్విగుణశరీర మునం దంతటను పుట్టుచున్నవి. ఈ విషయము జ్ఞప్తియం దుంచుకొని, తరువాత తరగతియైన 'ఒరిజోఫైటా' తరగతిలోని యత్యంత ప్రాథమిక మొక్కలను పరిశీలించినచో వాటి రెండిని సవికరణ చేయు వచ్చును. ఒరిజోఫైటా తరగతిలో ప్రాథమికమూలికను "సైలోటమ్" (Silotum) అందును. ఈ మొక్క ద్విగుణశరీరమును పరిశీలించినచో నది ఏంథోసిరాస్ మూలిక ద్విగుణశరీరమునకు బహు సన్నిహితముగా నున్నట్లు విశదమగుచున్నది. ఏంథోసిరాస్ ద్విగుణశరీరమును బాగుగా పొడిగించి, శాఖోపశాఖలుగా చేసినచో సది సైలోటమ్ ద్విగుణశరీరముతో సమానమగుచున్నది. అందువలన కాలేయ మూలికల జాతులలో నుండి ఒరిజోఫైటా యను యున్నతరగతి మొక్కలు పరిణామము బొందినవి స్పష్టమగుచున్నది.

ప్రహతి నిర్భజులు (Vascular cryptogams ptuidophyta :

అఖి భాగమైన డెమోనియన్ మహాయుగ మందు కాలేయ మూలికలు తమ ద్విగుణ శరీరమును పెంపొందజేసి దాని స్వతంత్ర జీవితము కొరకే నరిణామము నొందినవి. తత్ఫలితముగా సైలోటమ్ రైనియా, మెక్సికన్ మొదలైన నూతన భూజము లావిర్భవించినవి. ఉదాహరణకు సైలోటమ్ను పరిశీలించుము. (47 వ పటముచూడుదు) దీని శరీరము శాఖోపశాఖలు పొందిన సన్నని కాడలుగా నుండును. మూడు నాలుగువేల యడుగుల యెత్తుగల కొండలోయలలో నెప్పుడు వెండ్రంగనిచోట్ల నిది పెరుగుచుండును. క్రింది భాగమున రైలోయిడ్లు (వేళ్ళనంటివి) ద్వారా స్థాపితమై కొమ్మలు బయటకు ప్రేలాడులాగున పెరుగుచుండును. కాడలయందు హరితస్రముండుటనుబట్టి కిరణజన్యసంయోగక్రియనలన తనకు కావలసిన యాహారమును



47 చ పటము :

సైలోటమ్ (Psilotum)



48 ప పటము :

ఫిల్లోగ్లోసమ్ (Phylloglossum)



49 వ పటము :

లైకోపోడియమ్ (Lycopodium)

నిర్మించుకోగలదు. దీనికి ప్రత్యేకముగా ఆకులనునవి లేవు. కాడలయందు ముఖ్యముగా వాటి కొసలందు చిన్నచిన్న బొడిపెలవలె ప్రవృద్ధమగును. బొడిపెలలోపల విలింగ రేణు తిత్తులుండును. పక్కమైన పిదప నీ తిత్తులు పగిలి విలింగ రేణువులు గాలిలోనికి విసదలయి యెగురుట కారంభించును. ఈ కాడలతోనున్న శరీరము ద్విగుణి. ఇది స్వతంత్రజీవి. ఏంతోసిరాన్ లో నున్న యస్వతంత్రద్విగుణి నుండి యిలాంటి నికాడంబరద్విగుణు లుద్భవించుట చాల సులభసాధ్యము. కొన్ని సందల సంవత్సరములలో క్రమముగా నిట్టివి పరిణామరీత్యా పుట్టించున్నవనుట నిస్సందేహముగా నంగీకరింపదగిన విషయము. దీని ఏకగుణశరీరములు (Gametophyte) ఇంతవరకు కనుగొనబడలేదు. దీని కంటే నొక చిన్న మెట్టు అధికముగానున్న మొక్కలు: 1. ఫిల్లోగ్లోసమ్ (Phylloglossum) 2. లైకోపోడియమ్ (Lycopodium).

ఫిల్లోగ్లోసమునందు గొట్టములలాంటి చిన్నచిన్న ఆకులుకాడ నున్నవి. వాటి మధ్యనుండి యొక చిన్నకాడ బయలుదేరి కొసయందు విలింగ రేణు తిత్తులను తయారుచేయును. ప్రతి విలింగ రేణుతిత్తి క్రిందను ఏకైకై యొక చిరియాకుండును. ఇది దీని ద్విగుణ శరీరము. సైలోటముకంటె దీనియందు గలిగిన మార్పు ఆకులను కలిగియుండుటయే. లైకోపోడియమ్ (49 వ పటము చూడుడు) నందు యింకా కొన్ని మార్పులు వచ్చినవి. అందు మొదటిది ద్విగుణ శరీరపు విస్తారత. ఇది సన్నని కాడతో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి వృద్ధిబొందుచున్నది. అడుగున సరియైన వేళ్ళుండును. కాడల యుపరిభాగమునసంతటను రోమములవంటి సన్నని యాకు లావరించి యుండును. విలింగ రేణుతిత్తులు కొమ్మల చినర భాగములందు మాత్రమే యుండును. విలింగ రేణువులవలన ఏక గుణ శరీరము పుట్టించున్నది. ఇది యొక చిన్న దుంపనలె భూమిలో జెరుగును.

దీనివూడ కూజాలు, ఏం తెరిడియములు వేరు వేరుగా వెరుగును. వెను కటిసలెనే కుజ్జభాగమందు శోణితకణ ముండును. ఏం తెరిడియమునుండి విడుదలైన శుక్లరేణువులు నీటిలో నీడుకొనుచువచ్చి కూజాలయందు ప్రవేశించి కుజ్జయందుగల శోణితరేణువుతో నైక్యమగును. అప్పుడు తిరిగి ద్విగుణి యేర్పడును. ఈ ద్విగుణి (Zygote) సూక్ష్మవిభజనలను బొందుటచేత పటములలోచూపిన ద్విగుణశరీరములు ప్రవృద్ధమగు చున్నవి. (49 వ పటము చూడుడు). విలింగ రేణుతిత్తులలో ప్రాస్పవిభజనవలన విలింగరేణువులు (Spores) ఏకగుణ గుళికల (Haploid nuclie) తో నుష్పవించుచున్నవి. ఈ రకపు మొక్కజాతులు డెవోనియల్ మహాయుగములో విరివిగా వృద్ధిబొందినవి. వీటిని ప్రహతి నిర్వీజులనుటకు కారణములు రెండు: 1. వీటియందు నీరు, ఆహారపదార్థములు కాండమునందు ప్రయాణముచేయుట కిరుసైన ప్రహతినాళిక లేర్పడినవి. వట్టినీరు ప్రవహించెడి నాళికలను 'జైలమ్' అనియును, ఆహారపదార్థములు ప్రవహించు నాళికలను 'ప్లోయిమ్' అనియు నందును. ప్యునేరియాయందుగల కాండములో ప్రహతి నాళికలు నామమాత్రముగానున్నవి. కాని యానాళికలయందు జైలమ్, ప్లోయిమ్ అను విభాగములు జరుగలేదు. అట్టి విభాగము చూపుట కివియే ప్రథమభూజములు. నిర్వీజు లని చెప్పటకు కారణము వీటియందు పువ్వులుగాని, కాయలుగాని, విత్తనములుగాని లేకుండుట. ఇంతవరకు నర్గించిన మొక్కలలో గింజలు తయారుచేయు విధాన మేర్పడి యుండలేదు. కనుక వీటినిన్నిటినిగలిపి "క్రిప్టోగేము" అని వాడుదురు.

సైలూరియల్, డెవోనియల్ మహాయుగములలో వెన్నుపూస కల్గిన జంతువు లుదయించినవి. ఈ వెన్నుపూస లేక వెన్నెముక యనునది యొక్కసారి మాతాత్తుగాగాక, ప్రాథమికదశలో నామమాత్రముగా

సంకుంచించి క్రమముగా బలవత్తురమైన పెన్నెముకగా పరిణామము బొందినది. పెన్నెముక పరిణామ చరిత్రయందు ప్రాథమికజీవి 'బెలెకో గ్లోసస్సు' అనునది (50 న పటము చూచుడు) తక్కువలోతుగల సముద్రప్రాంతమునం దిసుకలో కూరుకొనిపోయియుండి జీవించునది. స్థూలదృష్టి కిది యొక ఏలుగునామును బోలి యుండును. రెండున్నర సెంటీమీటర్ల పొడుగు లగాయతు రెండుగజముల పొడుగునరకు నున్న జీవులు యీకాంతియందు కన్పించుచుండును. ముందొకముట్టెయు, చాని నెనుక నొక యుంగరము నుండును.

పెలెకోగ్లోసస్సు, దీనికి సర్వదా తెరిచియుండు నోరు ఉంగర ప్రదేశ మందే యున్నది. ఇసుకలో కూరుకొనిపోవునప్పుడు చిన్నచిన్న రేగువులు నోటిలో ప్రవేశించి యాహారగొట్టములో నడిచి, చివరకు గుర్రము ద్వారా బయటకు విడువబడుచుండును. చూచుటకు కండ్లుగాని, వినుటకు చెవులుగాని దీనికి యేర్పడలేదు. ఆహారగొట్టము పొడుగున చానిపైన నొక సన్నని గొట్టములాంటి వెన్నుపూస యున్నది. చానిని నోటో కాళ్లు అందును. రక్తప్రవాహమండలము, అందు సన్నని నాళికలు ఉన్నవి. హృదయ మొక చిన్న సంచినలె నుండును. మెడకు బాగుగా సభివృద్ధి జెందియుండలేదు. ఒకటి రెండు నాడీతంతువులు శరీరము పొడుగున వ్యాపించి యుండును. ఈ తంతువులయం దక్కడక్కడ ముద్ద ముద్దలవలె మెడకువదార్థ ముండును. ఈ జీవులయందు స్త్రీ పురుష వివక్షత కలదు. వీటి సహాగమమున సంతానోత్పత్తి కలుగుచున్నది. వీటివైన పరిణామోన్నతమును జూపునవి చేపలు. ఉదాహరణకు శునకవీణానులోనుండు పరిస్థితులు గమనింతము. దీనియందు పెన్నెముక చిన్న చిన్న పూస లొకచాని నెనుక నొకటి సమకూర్చిన మాదిరిగా నుండును. ఈ పూసల మధ్య రంధ్రము తిన్నగా నొకకొననుండి మరి యొక కొనవరకు వ్యాపించియుండును. రుజువుగా గొట్టమువలెనున్న


ఈ రంధ్రమునందు కేల్లియమ్ పేరుకొని గట్టిపడి యుండును. బెలనో గ్లోసస్సునం దీవిధముగా గట్టిపడలేదు. దాని వెన్నెముక గట్టిగాలేక మెత్తని పదార్థముచేతనే నిర్మింపబడినది. ప్రకృతి తన యనుభవము వలన వెన్నుపూస మెత్తగా నుండుటకంటె గట్టిగా నుండుట మిక్కిలి యుపయోగమని గ్రహించి జంతువులలో గట్టి వెన్నెముక తయారగుటకు, పరిణామము పొందుకు నారంభించినది. అట్టి సంకల్పమున చేపల నిండుమించుగా ప్రాథమిక జీవులని వాకొనవచ్చును.

వీటియం దాహార గొట్ట మున్నతస్థితిని బొంది యున్నది. నోటితో ప్రారంభమై విశాలమైన గళమును ప్రవేశించును. దీని తరువాత పొట్టిగా లావుగానున్న ఈసాఫేగన్ అను గొట్టముండును. ఉదరభాగము ఇంగ్లీషు అక్షరమగు 'యు' (U) వలె నుండును. ఈసాఫేగన్ తరువాత నీ 'యు' ఆకారముగల ఉదరభాగ మున్నది. దీనిని పొట్టిదైన చిన్న ప్రేగును, బాగుగా పొడుకైనది, విశాలమైనదియైన పెద్దప్రేగును అనుసరించుచున్నవి. పెద్దప్రేగు చివరభాగమును రెక్టమ్ అందురు. దాని కడపటిభాగమును గుదము అందురు.


ఉచ్ఛ్వాసక్రియ సామాన్యముగా చేపలలో 'గిల్స్' ద్వారా జరుగును. చేపలు ఈదునపుడు నోటిద్వారా లోనికిపోయి గిల్సునుండి నీరు ప్రవహించుటకు వీలుగా నమర్పబడియుండును. బహుసన్నని, సున్నితమైన రక్తనాళములు గుంపులుగా వ్రేలాడుచుండు గిల్సునందు లోపలి రక్తము, బయటి నీరు స్వల్పమైన పొరచే వేరుచేయబడి ఉండును. నీటియందు కరగి విలీనమైయున్న ప్రాణవాయు వీ యల్పమైన పొర దాటి రక్తములో కలసి దానిని పరిశుద్ధము చేయుచుండును. కొన్ని చేప తరగతులలో కొద్దిగా నెగురుటకు రెక్కలుగూడ ఉన్నవి. తొరొకాప్టేరిస్, ఎక్సోకీటస్ (52, 53 వ పటముల చూడుడు.) రెక్కలతో నెగిరెడి చేపలు చేపలజాతిలో నున్నతస్థాయిలో నున్నవి.




50 వ పటము ,
బెలనోగ్లోసస్ (Balanoglossus)




51-A ప పటము :
శునక మీను (Dog Fish)




51-B ప పటము :
సైలియోరైసన్ హృదయము,
సిరలు, మొప్పలు



52 ప పటము :
తరకాప్టరిన్ చేప



53 వ పటము :
ఎకోస్కిటన్స్ చేప



54 వ పటము : యురేనిమస్ లాచేటస్



55 వ పటము : బెపికోసెరిస్




56 వ పటము : సిరటోదస్




57 వ పటము : ప్రొటోస్టైస్

'డిప్నోయి' చేపలలో పరిణామము



58 వ పటము :
చేప నాడిమండలము



59 వ పటము :
సీర టోడన్ రక్త నాడిమండలములు

'డిప్నోయి' అను చేపలు ఆస్ట్రేలియాలోను, అమెరికాలోను కానవచ్చుచున్నవి. వీటియందు చిన్నరకపు ఊపిరితిత్తులు గలవు. (54, 55, 56, 57 పటములను చూడుడు.) యురోనిమస్ (54 ప.), లెపిథోసైరిస్ (55 ప.), సిరటోరస్ (56 ప.), ప్రోటోర్లస్ (57 ప.) భూమిమీదగల జంతువులన్నియు నూపిరితిత్తుల వలన నుచ్చ్వాసక్రియను సాగించుకొనుచున్నవి. వీటియందు క్రమపరిణామమార్గము స్పష్టముగా కనిపించుచున్నది. దీనినిబట్టి యూహించినచో జలమందు గల జంతులు భూమిమీదకువచ్చి బ్రతుక ప్రయత్నించుచు ముందుగా కాపలసిన పరికరములకొరకు పరిణామమును బొందుచున్నవని తెలియుచున్నది. ఇంతియగాక, భూమిమీదజీవించు జంతువుల యంతరాంగములైన కాలేయము (Liver), గాల బ్లేడరు (Gall bladder), బైల్ డక్టు (Bile duct), పాన్క్రియాస్ (Pancreas) మొదలైనవి వాని నూత్నదశలలో చేపలయందు కానవచ్చుచున్నవి. వీటియందు రక్తమండలము ఇదివరకు జంతువు లన్నిటికంటె విశేషముగా నున్నది. (51 వ పటము చూడుడు.) దీనియం దొక సైనస్ వెనోసము, ఎట్రీయమ్, వెంట్రికల్ కోనన్, ఆర్టియోయోసస్ అను నాలుగు పెద్ద గదులు గలవు. పై క్రమమున వీటిలో రక్తము ప్రవహించుచుండును. సిరటోడస్ అను చేపయందు (59 వ పటము చూడుడు) రక్తనాడీమండలములు దీనికంటె పరిణామోన్నతమును పొందినవి.


చేపల నాడీమండలము (58 వ పటము చూడుడు) చాల ప్రాథమిక దశలోనిది. దీని మూలస్థానముగు మెదడు పటములో కనపరచిన మాదిరిగా వివిధభాగములు గల్గియుండును. వీటికి మెట్టజంతువులవలెనే కండ్లు, చెవులు ఏర్పడియున్నవి. కనురెప్పలు గట్టి పదార్థముతో నిర్మింపబడి యుండుటచేత నులభముగా కండ్లు మూయుటకు తెరుచుటకు సావకాశముండదు. మెట్టజంతువులలో చెవులు బయటకుకన్పించిన మాదిరిగా

వీటికి కన్పించదు. వీటికి లోపల శష్టగ్రహణశక్తిగల చెవులు మాత్రముండి పైన యవి పలుచటి చర్మమువలన నానరింపబడి యుండును. అతి సున్నితమైనదగుటచేత నీచర్మము ధ్వనికెంతములకు స్పందింపబడి దాని నంటి లోపల ఎంకరలు తిరిగియున్న నాడీకట్టడముల కందజేయును. అందువలన శబ్దము వినుశక్తి కేర్పడుచున్నది. మెట్టజంతువులలో వలెనే పూత్రశుక్లములు వేరువేరు గొట్టములద్వారా ప్రవహించినను బయటటపనికి రెండునుకలసిన యొకగొట్టముద్వారా బహిష్కృతమగును. మాత్రమును తయారుచేయు పొడుగుపాటి కిక్కిలుండును. పురుషుఁడై ఖేదము నీటియందుండి వాటి కలయికచేత ద్విగుణు లేర్పడి సంతో నోత్పత్తి జరుగుచున్నది.

కొన్ని చేపలయందు దెల్లక్కిసిటి తయారగు నవయవములు గలవు. ఎల్లక్కికోరే అను చేపలలో నీయంగములు బాగుగా నృప్తిజెంది పరి పూర్ణత్వమును పొందినవి. నీటిలో టార్పెడోయను చేపయందు విద్యుచ్ఛక్తి జనకమైన ప్రదేశ మనేక ప్రదేశమును కలిగియున్నది. ఈప్రదేశము చిక్కగా నల్లబడిన నరదారముల వలన నిలవదుపబడుచున్నవి. తయారుచేసి నిలవయుంచుకొనిన విద్యుచ్ఛక్తిని టార్పెడోయను చేప తన శత్రువులమీద నుపయోగించి తరిమివేయును. తనకు నాహారమైన చిన్నజంతువులను యీ శక్తి ప్రయోగమువలన చంపి తినును.


ఇలేస్కోగ్రాంక్సు జాతికి చెందిన కొన్ని చేపలయందు కాంతి గాత్రాల యందు కన్పించును. మిగుగురువురుగులలో గాత్రులందు కాంతి కన్పించునట్లు వీటియందుగూడ కాంతి బయల్పడుచుండును. ఇట్టిచేపలు సామాన్యముగా సముద్రమందు నీటిపైభాగముననే సంచరించు చుండును. (61 వ పటము చూడుడు). వీటిలో స్టోమియాస్ బోవా యనునది యన్నిటికంటె నెక్కువ కాంతినిచ్చును. (61 వ పటము చూడుడు). చేపలకు వాసనచూచు శక్తిగూడ కొద్దిగా వృద్ధిబొంది

విద్యుచ్ఛక్తి తయారగు
ప్రదేశము



60 వ పటము :

టార్పెడో చేప (Tarpedo) ఎలక్ట్రిక్ చేప



61 వ పటము :

స్టోమియాస్ బోవా (Stomias Boa) - వెలుతురునిచ్చు నముద్రపు చేప

యున్నది. ఎక్కువరకముల చేపలు సముద్రమందే కలవు. ఏటిలో 'షార్కు' జాతివి చాలపెద్దవి. బాగానయస్సువచ్చినచేప యొక్కొక్కటి ముప్పయ్యైదగుగుల పొడవువరకు నుండును. కొన్నిలక్షల సంవత్సరములకు బూర్వముండెడి, షార్కు, రే, మొల్లైన చేప లింకను బహు పెద్దవిగా నుండెడివి. ఒక్కొక్క షార్కు ఎనువది యడుగుల పొడవుండెడిది. ఈవిషయము భూమిలో చిరకాలము క్రందట కూరుకొని పోయి. కాకతాళీయముగ త్రస్విండుటచేత దొరికిన యస్థిపంజరముల వలన తెలియచున్నది.

పెర్షియన్, కార్పోనిఫరస్ మహాయుగములు

ఈ రెండుయుగముల పరిమితి పదికోట్ల సంవత్సరములు. ఇప్పటికి ముప్పయ్యేకోట్లసంవత్సరముల క్రిందట ప్రారంభమై, యిరువదికోట్ల సంవత్సరములకు పూర్వము ముగిసినవి. విస్తారమైన ఈ మహాకాలమందు, వృక్షజాతులు, జంతుజాతులు జలాశ్రయములయందు నినశించుట కలవాటుపడి, దౌర్బల్యమును క్రమముగా తగ్గించుకొనుచు, మెట్టమీద నివసించుటకు తగిన పరికరములు, ఆశ్రయములుచు సంపాదించుకొని భూమిమీదికి వచ్చుట కారంభించినవి. జలచరములు, సదీముఖద్వారముల వెంబడి భూగడ్డమీదికి వచ్చుకొనివచ్చి మేవులలో నడు లెండిపోయినపుడు క్రమముగా మెట్టజీవితమున కలవాటుపడినవి. ఈ యభిప్రాయమును బలపరుచుట కనేక తార్కాణములు కన్పించుచున్నవి. ఒకే తరగతికి, జాతికి జెంది బహుసన్నిహితముగా నున్న జంతువులు కొన్ని సర్వదా సముద్రమందుండుటయు, మరికొన్ని తియ్యని నీరుగల నదులలోను, వాటిప్రక్కనుండు చెర్వులలోను గన్పించుటనుబట్టి యూహింపగా ముందు తెల్పిన సిద్ధాంతము బలపడుచున్నది. ఇలేస్మోట్రాంట్లేయను తరగతికి జెందిన చేపలు చాలవరకు సముద్రము లోనివేయైనను,

కొన్ని నదీముఖములద్వారా పైకెగబాకి మంచినీటియందు నివసించుట కలవాటువడినవి. అటువలెనే నాచుజాతులలో యొర్రరంగుగల యొర్రనాచులు (Red algae) అన్నియు సముద్రములోనే యుండును. ఆ తరగతికి జెందిన బేట్రిఫోస్పెర్మస్ అను నాచు భూమిమీద నుండు కొండవాగులలో దొరకుచున్నది.

పెరన్ను, ప్రహతి నిర్పిణులు (Pteridophyta)

ఈ తరగతి మొక్కలయాగమనము పైలోటమ్, ఫిల్లోస్టోసమ్, లైకోపోడియమ్ మొదలైన ప్రాథమిక మూలికలనలన సూచింపబడినది. పెర్మియన్, కార్బోనిఫరస్ మహాయుగములలో నీ తరగతివి విరివిగ విస్తరించుటయేగాక వాటికంటె మరియొక మెట్టు ఆధిక్యముగల వృక్షము లుద్భవించుటకు దారకలిగినది. ఇందు పరిణామ మారోహణముగా జరిగినది. ఇదివరకున్న యల్పతరగతుల మొక్కలనుండి బాగుగా విస్తరింపగల్గిన మొక్కలు కీలోస్టాదులను ధిక్కరించి బ్రదుకగల్గిన వృక్షములు పుట్టి ప్రాబల్యమును బొందినవి. ఉదా: ఐసోయిడేస్ (62వ పటము చూడును). కెలాజినెల్లా (63 వ పటము చూడును). గాజహంస (64 వ పటముచూడును).

వీటన్నిటియందును మొక్క శరీరమునందు వేళ్ళు, కాండము, ఆకులు నను భేదము స్ఫుటముగా కన్పడుచుండును. కాండము లందును, వేళ్ళయందును ప్రహతిశాలలైన జైలెమ్, ఫోయిమ్ అను ప్రత్యేకశాల లేర్పడినవి. అధికాభారమును శలవుచేయుటకు 'పేరెక్ కైమా' అను శాలలు నిలువుగా నుండు గట్టి కొమ్మలు నిలచి పెరుగుటకు తగిన బలమిచ్చెడు "స్క్లెరోకైమా" అను కోశికలు పెంపొందినవి. వీటన్నిటియందును చిరకాలము స్వతంత్రముగా జీవించు శరీరము ద్విగుణశరీరమే. ఏకగుణశరీరము జీవించుకాలము సంకుచితమగుటయే




62 వ పటము :

ఐసోయెటెస్ (Isoetes),
ద్విగుణము




64 వ పటము :

రాజహంస (Adiantum) ద్విగుణము




63 వ పటము : సెలాజినెల్లా (Selaginella) ద్విగుణము



వేరు అచ్చకోశ

కాండము అచ్చకోశ

65 వ పటము : ఆడియాంటమ్ వేరు, కాండములు



66 వ పటము :

ఆదియాంటమ్ జీవిత చక్రము (Life Cycle)


గాక నది యల్పము, స్వల్పముగా గూడ కుదించబడినది. పై యుభా హరణాలలో 'ఎడియాంటము' మిన్నగావున దాని జీవితచక్రమును పరీక్షించినచో నామాన్యముగా నాచాతి మొక్కల జీవితచక్రమంతయు బోధపడును. ఎడియాంటమునకు ప్ల్యనేటియాలోనలె గాక నిజమైన వేళ్ళున్నవి. వేళ్ళను, కాండములను పదునైన కత్తితో నక్లముగా కోసి, బహు పలచనైన కుసుక తీసి, మైక్రాస్కోపు సహాయముతో పరీక్షించిన పటములలో చూచిన చూడదగిన నుండును. (65 వ పటము చూడుడు)

ఆటలు ముదిరినతర్వాత అందు కెనుకభాగమున విలింగ రోగు తిత్తులు కలుగుచును. చిరియాకుల యందు కెనుకనుంబి. యాసందు లలో తిత్తులు పుట్టును. (66 వ పటము చూడుడు.)


ఉంగరపు పటకా నీరును గోలుపోయి కెనుకకు నంకుటచేత తిత్తి నోరునంద బ్రస్థలయి నిలింగ రోగువులు బయటబడెను. ఇది తడినేలలో పడినప్పుడు శాలావిభజనలు ప్రారంభమై ప్రోతేలస్ అను ఒక చిన్న ఏకగుళిక శరీరము ప్రసృష్టమగును. (66 వ పటము చూడుడు.)

ప్రోతేలస్ ఒక కెంటిమీటరు ఎత్తై, అర కెంటిమీటరు వెడల్పుగల చిన్న మొక్క. హరితస్ర ముండుటచేత స్వతంత్రజీవి. దీనియందు పైన కూబాలు, క్రిందిభాగమున ఏం తేరిడియములు పుట్టును. కూబాయం దొక శోణిత రోగువు, కుబ్జ శోణిత రోగువు, రెండుగల రోగువులు గలవు. గుండ్రముగా నుండెడు ఏం తేరిడియములలో నూటికి మించకుండ శుక్ల రోగువులు తయారగును. ఒక్కొక్క శుక్ల రోగువు వంకరలు తిరిగి అనేక మీసములు గలదై యుండును. వర్ష కాలమున ఏం తేరిడియములనుండి వెలువడిన శుక్ల రోగువులు నీటిలో నీడుకొనుచు పైకి యెక్రబాకి కూబాలలో గళముద్వారా ప్రవేశించి శోణిత రోగువులలో కలియును.

ఈ సంఘటన వర్ణనసానముగ ద్విగుణి యేర్పడి యది శాలా విభజన కువక్రమించును. ముంజొక యాకు, ఒక వేరు పాదము గలిగిన ఎడియాంటము మొలక తయారయి క్రమముగా నది పెద్ద మొక్కగా వృద్ధిజెందును. ఈ తరగతి మొక్కలన్నిటను జీవితచక్ర మిటువలెనే ఉండును. వీటియందు గమనించనలసిన ముఖ్యవిషయము జీవితచక్రములో ఏకగుణశరీరమునుండి ద్విగుణశరీరము ద్విగుణ శరీరమునుండి విలింగ రేణువుల ద్వారా ఏకగుణ శరీరమైన ప్రోతేలస్ చర్చితచర్మణముగా నుద్భవించుచుండుట. కాలేయ మూలికలు, పీచుమొక్కల (Mosses) లో గూడ నటువంటి జీవితచక్రము స్ఫుటముగా కన్పించినను, అందేక గుణ శరీరము ప్రాముఖ్యత నహించి, ద్విగుణ శరీరము సంకుచితము, అల్పజీవి, యస్వతంత్రయునై యున్నది. పరిణామయాలోహణ మార్గమున ప్రహతినిర్భీజులలో (Pteridophyta) ద్విగుణ శరీరము చిరకాల స్వతంత్ర జీవిగా చేయబడుట, ఏకగుణ శరీరము తాత్కాలికము, అల్పము అగుట సంభవించినది. అంతియగాక ద్విగుణ శరీరమందు వేళ్ళు, కాండము, ఆకులు ప్రత్యేకత్వమును వహించి విస్తారతను బొందినవి. వీటియందు నీరు పైకి లాగుకొనుటకును, ఆకులలో తయారగు నాహారపదార్థములు మొక్క శరీరమందంతట కావలసిన చోట్లకు ప్రవహించుటకు నిరుక్తైన నాళికలు జైలమ్పోయిమ్ అను నవి యుదయించి ప్రత్యేకతను వహించుట పరిణామాధిక్యమును తెలియ జేయుచున్నది. కార్బోనిఫరస్ యుగమందు 'లైకోపోడియోలుస్' తరగతి వృక్షములు బహు విస్తారతను ప్రాముఖ్యతను వహించి యుండెడివి. (మొదటి బొమ్మను చూచుడు.) అడియాంటమునం దొకే రకపు విలింగ రేణువులు పుట్టి యవి ప్రోతేలస్ గా పెరుగుచున్నవి. అట్టి ప్రోతేలస్ సందు, శుక్లశోణిత రేణువులు పుట్టుచున్నవి. 66 వ పటము, 67 వ



67 వ పటము .
సెలాసిన్ల జీవిత చక్రము



68 వ పటము .
మెయిడెస్మియా గింజ

పటములలో వేరొక ఉదాహరణగా నిచ్చిన, “నెలాజినెల్లా” యందు అట్లుగాక రెండు రకముల రేణువు లుద్భవించుచున్నవి. అందు కొన్ని టిలో పెద్ద రేణువులు, మరికొన్ని టిలో చిన్నవి కలుగుచున్నవి. కొన్ని తిత్తులలో పెద్ద రేణువులు నాలుగు మాత్రమే ఉండును. మరికొన్ని తిత్తులలో చిన్న చిన్న రేణువు లనేక నంద లుండును. పెద్ద రేణువులనలన ఆడు ప్రోతేలస్ యను, చిన్న రేణువుల వలన మొగ ప్రోతేలస్ యను పుట్టుచున్నవి. (67 వ పటము చూడఁడు.)

ఆడు ప్రోతేలస్ నందు రెండు మొదలు నాల్గునరకు కూడా లుత్పత్తి యగును. మొగ ప్రోతేలస్ నం దొక్క శాలమాత్రమే యుండి నిగత రేణువంతయు ఎంతరిడియముగా నయి, యనేక శుక్ల రేణువులను తయారుచేయును. పెద్ద విలింగ రేణువులు, వాటియం దభివృద్ధిపొందిన ఆడు ప్రోతేలస్ మొదలైనవాటితో పుట్టినచోటనే నెలాజినెల్లా కొమ్మ కొనలయం దుండును. శుక్ల రేణువులు నీటిలో నీడుకొనిపోయి శోణిత రేణువులతో కలిసి ద్విగుణే యేర్పడును. దానినుండి నెలాజినెల్లా మొక్క యంకురించుచున్నది. కూజాలు పుట్టినచోటనే ఆడు ప్రోతేలస్ నందుండి శుక్ల రేణువులొక ర్షింపబడుట పరిణామాలో హణమునందు ముఖ్యమైన సోచానము. ఈ అలవాటు మొక్కలలో స్థిరమైనచో గింజల నుత్పత్తిచేయు చెట్లదయించుటకు కారణమగుచున్నది. పెర్సీయన్ యుగమందు గింజల నుత్పత్తిచేయు ఫెరన్ను అనేకము లుండెడివి. కార్టోనిఫరస్ యుగమం దుండెడి ఫెరన్నులో గింజల నుత్పత్తిచేడి ఫెరన్ను మియాడెస్మియా, సెంట్రెనేషియా యనునవి. వాటియందు గింజలు పటములో చూపినమాదిరిగా నుండెడివి. (68వ పటము చూడుగు)

ఈ ప్రక్రియ నెలాజినెల్లాలోని పరిస్థితులనుండి చాల సులభముగా పరిణామముబొంద వీలున్నది. విలింగ క్షణతి త్తిలోని నాల్గు పెద్ద రేణువు

లకు ఒదులు ఒకటే ఉనచో నీ పరిస్థితి కలుగుచున్నది. ఆదు ప్రోథా
 లన్ను అందులోనే పుట్టి బయటకు పోకుండనుండి కూజాల నుత్పత్తి
 చేయును. వాటియందుగల శోణితరేణువు లీదులాడుకొనుచు నచ్చిన
 శుక్లరేణువుతో కలసి ద్వీగుణపిండ ముప్పుడును. నూతన ద్వీగుణశరీర
 మిందేర్పడిన పిమ్మట నీగింజ ఠాలిసోయి వానలు కురిసిన పిదప క్రొత్త
 మొక్క బయటకు నెడుగును. ప్రాతిపదికతో గింజల స్వరూప మిదియే.
 ఫెరన్ను గింజలను మున్ముందు తయారుచేసినవి. కార్బోనిఫరన్ యుగమం
 దిటునంటి గింజల నుత్పత్తిచేయు ఫెరన్ను అనేకములుగా నుండె
 డివి. అందు బహువిస్తారతను ప్రాబల్యమును గాంచిన ఫెరన్నుజాతి
 “పైకడోఫిలికేల్సు”. ఈ తరగతి ఫెరన్ను యిప్పుడు ప్రపంచమువీడ
 నెచ్చటను లేవు. పెర్మియన్ యుగములోపుట్టి, కార్బోనిఫరన్ యుగ
 మందు బాగుగా నభివృద్ధిజేంది విస్తరించి, యటు తరువాత మహా
 యుగమైన మెసోజోయిక్ యుగమం దంతరించి పోయినవి. ఇవి
 యూకాలమున యుండెడివనుటకు సాక్ష్యము కొన్ని రాళ్ళవీడ గల
 వాటి ముద్రలు. వాటిని “ఫోసిల్సు” అందురు. ఏ వృక్షమైనను
 ఇప్పుడు భూమిలో కూరుకొని పోయినచో, కొన్ని లక్షల సంవత్సరముల
 కది రాయిగా మారిపోయి దాని స్వరూపగుణములు మారక నట్లే
 యుండును. ఇట్టి రాతి ముద్రలు గనులు త్రవ్వనపుడు విరివిగా
 దొరకుచుండును. ఈ ఫోసిల్సును పరిశోధించి చూడగా నివ్వడు
 భూమివీడ జీవించుచు నుండని యనేక తరగతుల వృక్షములు పెద్ద
 కాలముక్రిందట భూమివీడ విస్తరించి కొంతకాలమునకు పూర్తిగా
 నంతరించిపోయినట్లు తెలియుచున్నది.

కార్బోనిఫరన్ మహాయుగమునందు గోండ్వానాలెండ్ అను బహు
 పెద్ద భూఖండ ముండెడిది. ఈ గడ్డయందు ఇప్పటి ఆస్ట్రేలియా,
 ఇండియా, ఆఫ్రికా, దక్షిణఅమెరికా, అంటారీషియా యను దేశము

లన్నియు గలసి యొకే యొక పెద్దభూభండముగా నుండెడివి. అప్పుడు యూరప్ ను, నషియా భండములో చాలభాగమును గలసి యొక భూభాగముగానుండి, ఈ రెండు పెద్దభండములు “టిరీసు” సముద్రము వలన వేరుచేయబడుచుండెడివి. ఈ ‘సిండ్వానా’ భూకల్పమున మంచి కరుడు వేలకొద్దై చతురపుమైశ్య ప్రదేశములలో నావించి చాలకాల ముండెడిది. అట్టి సంస్కర్మములలో “స్ట్రోరాఫ్టెరిస్” అను తరగతి మొక్కలు విస్తారముగా నుండెడివి. ఇన్నియు కరన్ను తరగతికి జెంది యుండియు పరిణామము చెందినవి.

జంతువుల పరిణామము :

పెర్సియన్, కార్నోనిఫరస్ యుగములలో చేపవారూ లనేకములుగా నుండి వివిధరకములుగా పరిణామమును బొందినవి. కొన్నిరకము లవి ఎగురుటకు పరిణామము బొంది యుక్త్యర్థణ నహించినవి. ‘టిలియోప్సు’ తరగతికి జెందిన ‘తొరకోఫ్టెరిస్, ఎకోస్కోటస్ (53 వ పటము చూచును.) అను చేపలు గాలిలో వెరుగుటకు నాచుర్భము గలవి.

చేపలు అత్యంత ఉన్నతస్థితికి వచ్చి మెట్టమీద జీవించుట కుపకరణములైన కాళ్ళు, ఊపరితిత్తులు మొదలైనవాటిని నిర్మించు కొని యున్నవి. నీటికి మెట్టమీద, నీటియందుగూడ జీవించుటకు తగిన యంగములు గలవు. నిత్యజీవితములో మనకు గోచరించు జీవి కప్ప. ఇది నీటిలోను, మెట్టమీదకూడ జీవించగలదు. అందువలన మున్ముందు కప్పవంటి యుభయజీవులు పుట్టి నాటినుండి క్రమమున పూర్తిగా మెట్టజీవుల పరిణామమును బొందినవి. డిప్నోయి తరగతి చేపలు (54, 55, 56, 57 పటములను చూచుడు.) ఉభయజీవుల (Amphibians) రాకను సూచించుచున్నవి. ఈ ఉభయజీవులనుండి బల్లెలు,

పాములు, మొసళ్ళు మొదలైన 'రెప్టైల్స్' తరగతి జనించెను. పటముల లోని డిప్నోయి జీవులను, కప్పలను జూచిన వాటియందలి పరిణామము స్థూలదృష్టి పరిశీలనవలననే పూర్తిగా నర్థమగును.

డిప్నోయి తరగతికి జెందిన చేపలు ఊపిరితిత్తులు కలుగుటయందే గాక రక్తమండలమందును, నరమండలమందును గూడ ముందంజ వేసి యుభయజీవులైన కప్ప మొదలైనవాటి ననుకరించుచున్నవి. క్రింది పటములలోని రక్త, నరమండలములను పరిశీలించినచో మామూలు చేపలనుండి యెంతవరకు పరిణామమార్గము నివి యాలోచించినవియో సులువుగా విశదమగును.

'డిప్నోయి' తరగతి చేపల యంతిర్భాగములు పరిశీలించి చూచినచో నవి మామూలు చేపలకును, కప్పజాతికిని మధ్యస్థముగా నున్నట్లు తెలియుచున్నది. (59 వ పటము చూడుడు). ఈ చేపల శైశవమునందు (Larval stage) గిల్సుద్వారా గాలి బీల్చుకొనును. ఎదిగినకొలది శరీరమందు పెక్కు మాంపులు నచ్చి పెద్దదైన పిమ్మట రెండు ఊపిరి తిత్తులు కలుగుచున్నవి.

ఉభయజీవులు (Amphibians):

కప్ప, లోడ్, న్యూట్, సలమాండర్ మొదలైన వీ తరగతికి జెందిన జీవులు. వీనిలో స్ఫుటముగా కనబడు ముఖ్యమైన మార్పు చేపలకుండు తెల్లినంటి యంగములు లేకపోవుట, వానిస్థానే అయిదు వ్రేళ్ళు కలిగిన చేతులు, కాళ్ళు ఉండుట. ఈ జాతులన్నియుగూడ చిరుతపయస్సులో 'గిల్సు' ద్వారా ఉచ్ఛ్వాసక్రియ జరుపుకొని, పెద్ద తనములో నూపిరితిత్తులమూలమున గాలి బీల్చుకొనుచుండును. నవీన మైన కొన్ని జాతులలో నీ క్రియ చర్మముద్వారాను, గళమువలనను



69 వ పటము :
కప్ప (Rana Temporaria)




అవ్ ఫేజ్జీరోడ్

గెసిట్టా
హెమిస్ఫియర్

అస్టిక్ లోడ్

మెడుల్లా ఆల్ లాంగేటా

71 వ పటము :
కప్ప నాడిమండలము - మెరుడు



70 వ పటము :

కప్ప హృదయము - రక్తమండలము

జరుగుచుండును. ఇటువంటి కదలుటకు నీలుగా తల, పెన్నెముక కఠుక బడి యుండును. బాగుగా వృద్ధిబొంది పనిచేయగల్గిన కన్నులు, చెవులు, వీనియందు గలవు. అస్థిపంజరము మెట్టమీద నిసించుటకు, గంతులు వేయుచు నడచుటకు తగియున్నది. (69 వ పటము చూచుడు).

వీనియందు నోరు, నాలుక, ఆహారబొట్టయందు మెట్టజంతువులందు వలె వివిధములగు బొట్టము లేర్పడియున్నవి. బాగుగా పనిచేయగల్గిన కాలేయము (Liver), పేంక్రియాస్, గాల బ్లెడరు మొదలైనవన్నియు నున్నతస్థితికి వచ్చినవి. చేపలలో పొడుగుగానుండు కిష్మీన్ (సూత్ర కృచ్ఛములు) కుదించబడి లావుగా పొట్టిగా నుండును. ఉచ్చాస్వక్రియకు ఊపిరితిత్తులు రెండుండును. (70 వ పటము చూచుడు).

కప్పలోని రక్తమండలము :- వీనియందు దొక పై నెన్ వెన్ వెన్సు, కుడి యెడమ ఆరికిల్సు (కర్ణికలు), ఒక వెంట్రికల్ (జతరిక), ఒకకోనన్, ఆర్టీ రియోసస్సు కలవు. కుడికర్ణికలోనికి పై నెన్ వెన్ వెన్సును, ఊపిరితిత్తుల నుండి వచ్చు రక్తనాళికలు ఎడమ కర్ణికలోనికి తెలువబడియుండును. డిఫ్నీయి చేపలకంటె కప్పయందుగల్గిన సూక్ష్మకృతలు రెండు (69, 70 వ పటములు చూచుడు). అందు 1. యెడమకర్ణిక పెద్దదిగా నుండుట, 2. కుడియెడమ కర్ణికలు పూర్తిగా నొకపారచేతి రెండు భాగములుగా విభజింపబడియుండుట. కర్ణికలు రెండును ఒకే ద్వారమున జతరిక (వెంట్రికల్) లోనికి తెరువబడినవి. ఈ ద్వారమునకు రెండు వంకర తలుపులు (Spiral valves) గలవు. కుడి కర్ణికలోపడు రక్త మపరిశుద్ధమైనది. ఎడమకర్ణికలోనికి యూపిరితిత్తుల నుండి వచ్చు రక్తముగనుక పరిశుద్ధమైనది. ఈ కర్ణికలు మునుచు కొనగానే వాటిరెంటియందుగల రక్తము ఉమ్మడిద్వారము జతరికలో బడును. అట్లు పడిన తక్షణమే జతరిక ముడుచుకొనును. హఠాత్తుగా ముడుచుకొనుటవలన జతరికలో శుద్ధ, అపరిశుద్ధ రక్త

ములు రెండుండినను, అవి మిశ్రమమగుటకు న్యవధియుండక, జరికకకు ఋజైవునుండి బయలుదేరు కోనస్సు, ఆర్బియోససులలోనికి మున్ముందవరిశుద్ధరక్తమే ప్రవహించును. అప్పుడు కోనస్సు, ఆర్బియోసస్సు కూడా మునుమునుటచేత నా రక్తము రెండు మాస్లముల ననుసరింప వలసియున్నది. అందు 1. ఎల్బస్ అయోర్టా, 2. ఊపిరి తిత్తుల లోనికిపోవు నాళికలు (Pulmocutaneous trunks) కాని కెరోటిక్, స్పిన్మిక్ (ట్రంక్సు), బహుచిన్న నాళికలు గలనగుటచేత వాటిలో నొత్తిడి యెక్కువగా నుండి రక్తము సులువుగా ప్రవహింపనేరక నూపిరి తిత్తులకు పోవునాళికలద్వారా వేగముగా పోవును. అంతట ఊపిరితిత్తి నొత్తిములలో నొత్తిడి యెక్కువగుటయు, తల మొండెమువైపు చను నాళికలలో నొత్తిడి తగ్గుటయు కల్గును. అప్పుడు ఎల్బస్ అయోర్టా లోనికి రక్తము ప్రవహించును. ఇది రెండనసారి పంపబడు రక్తము గావున మిశ్రమరక్తమైయుండును. ఇది ఎల్బస్ అయోర్టానుండి మొండెమునకు ప్రవహించును. అప్పుడు ధమములయందు బిత్తిడి యెక్కువై మూడనసారి యుబుకు రక్తము చాలవరిశుద్ధమగుచు కెరోటిడ్ గ్లేండ్సు దాటి అయోర్టాలోనికి పోయి నేరుగా తలకు ప్రవహించును. విభాగము గాని జరక యుండుటవలన చానియందు అపరిశుద్ధ, శుద్ధరక్తములు మిశ్రమమగుట కల్గుచున్నను, కెరోటిడ్ గ్లేండు సహాయమున అపరిశుద్ధ రక్త మూపిరితిత్తులలోనికి, మిశ్రమరక్తము మిగత శరీరమంతటికి, పరిశుద్ధరక్తము తలకు పంపబడుచున్నది.


నాడీమండలము : (71 న పటము చూడును.) దీనియందొక చిన్న సెరిబెల్లము, పెద్ద ఆస్టిల్ లోబ్బు, పూర్తిగా నిర్మితమైన వైయోసి ఫల్, పెద్ద సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్సు ఉండును. ఇంద్రియనాడులు బాగుగా పెంపొందుటవలన కప్పలు వాసనచూచుట, రుచులు తెలిసి

కొనుట, వినుట, చూచుట మొదలైన శక్తులు చేపలకంటె ఎక్కువగా కల్గి యున్నవి.

సంతానోత్పత్తి విధానము : ఏటియం దొక విశేషము కలదు. వానలు కురిసిన వెంటనే కప్పల గొంతుకలలో ధ్వనివచ్చు తిత్తులు తయారగును. అప్పు డవి మిక్కుటముగా నరచుట కారంభించును. ఈ శక్తములవలన ఆడు మొగ కప్ప లొకచో జేరుకొనును. మొగకప్ప ఆడుకప్పవీరక కూర్చుని ఒత్తిడిచేయును. ఆ యొత్తిడి కది యుద్రేకింపబడి దాని గర్భాశయమందుగల గుడ్లను క్రిందకు విడుచును. మొగకప్ప క్రిందపడి యున్న స్రుణ్ణిపోగుమీద శుక్ల రేణువును విడుచును. వాటి మిశ్రమమున ద్విగుణులేర్పడును. చాల జంతువులలో స్త్రీ గర్భమందు జరుగు నీ క్రమ కప్ప జాతిలో బయటనే జరుగుచున్నది. ప్విగుణులనుండి కప్ప పిల్లలు పెరుగును. ఇవి మున్నుండు చిన్నచిన్న చేపలవలె కాన్పించును. వీనిని శేడ్ పోల్చుండును. దీనికి నొకతల, దాని ననుసరించి క్రమముగా నన్న గిలు లోక యుండుటచేత నిది చేపయాకారముగా నుండును. ఈ స్థితిలో దీని హృదయము చేపలకున్నట్లుగానే యుండును. ఉచ్చాచ్ఛక్రియగూడ గిల్చు (మొప్పలు) వలన జరుగును. క్రమముగా దానియందు స్వరూపమున మార్పులు వచ్చి, లోక కుసువైపోయి కప్ప యాకారము వచ్చును. ఊపిరితిత్తులు, కప్ప హృదయము, కాళ్ళు, చేతులు మొదలైనవి ఏర్పడును. ఈ ఉభయజీవుల పరిణామ పర్యవసానముగ బల్లి, మొసలి, పాము మొదలైన జంతువు లుదయించినవి. ఇంతటి నుండి మొట్ట జీవులలో పరిణామము కలుగుట కారంభించెను.

మెసోజోయిక్ మహాయుగము

ఈ మహాయుగ మిరువది కోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వము ప్రారంభమై వదికోట్ల సంవత్సరముల క్రిందట ముగిసినది. ఇందు, రెట్టెలు



72 వ పటము :
సైకాస్ (Cycas)



మొగకోస





మొగకోస
నిలువుకోతదృశ్యము



మైక్రోస్పోరోఫిట్

సైక్లోస్పా
రంజయము



73 వ పటము :

సైకాన్ జీవిత చక్రము

వెర్నీషర్” అందును. ఫెరన్సుజాతియంతటియందును నీ రకపు వెర్నీషర్ ఉన్నది. పైకన్ గాక యేయితర నగ్నబీజి (Gymnosperm) లోను యీ వెర్నీషర్ కనిపించుటలేదు. సిద్ధివీటు వెర్నీషర్ కలిగిన పైకగోఫిలికేట్లునంటి ఫెరన్సు, పైకస్సుమొక్క తరగతిదైన పైక డేట్లు జాతిలోనికి పరిణామముపొందినను, వేనుకటి గుణ మింకను వంశ పరంపరగా వచ్చుచున్నది. ఈ యంశము పరిణామసిద్ధాంతమును బల పరుచుచున్నది. ఇటువంటి యంశములు దీని సంతానోత్పత్తి విధానమున మరొకొన్ని గలవు. మొదలు, ప్రధానమైనవేరు పువ్వులు పూయు చెట్ల ఋతువట్టున్నది. వీటియందు తాడిచెట్టులోవలె మొగ ఆకు భేదము గలదు. వేసవివరకు ఆకులు మాత్రమే క్రొత్తివి వేయుచు నుండి యెండలు ముదురుచున్నపుడు కొనయం దొక ‘కోను’ను వేయును. పరిమాణములోను, స్వరూపములోను దూరముననుండి చూచినచో నిది యొక చిన్న వనసకాయవలె నుండును. (73 న పటము చూడుడు.) దీని మధ్య నొక లాపైన కాడయుండి దాని చుట్టును (కోను నిలువుబడ్డ చూడుడు) మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అనునవి యావరించి యుండును. ఒక్కొక్క మైక్రోస్పోరోఫిల్ దొడ ననేక వందలు చిన్న చిన్న తెల్లని గుడ్లవంటివి ఉండును. వీటిని మైక్రోస్పో రేంజియా అందును, ఒక్కొక్క స్పోరేంజియమునందు సుమారు నూరు వరకు సలింగరేణువు లుండును. ఈ సలింగరేణువులు గాలిలోనికి విడుదలై యెగురుచు గింజలమీద వాలును. ఇవి రిలాజినెల్లాలో చూచిన చిన్న లింగరేణువులకు సమానములు. పువ్వులలోనుండు పరాగముతో వీటిని సరిపోల్చనగును. ఈ పువ్పాడి, తేక సలింగరేణు వులు వానుప్రవాహముచేత ఆడుచెట్లవైపు ప్రవహించి గింజలపై నుండు పరాగకోశములలో పడును. (73 ప. విత్తుబొమ్మ చూడుడు.)

అడుచెట్లమీద అకుల మొదళ్ళలోనుండి పటమునందు చూపిన మెగాస్పోరో ఫిల్లు బయలుదేరును. ఒక్కొక్కదానికి 6 మొదలు 8 వరకు లేగింజ లుండును. శాస్త్రరీత్యా నీ లేగింజలను మెగాస్పోరేజియా అందురు. లేగింజచుట్టును మూడంతర్భాగములు గల కవచ (Integument) ముండును. గింజకు వైభాగమున నొక సూక్ష్మమైన రంధ్ర ముండును. దీనిని మైక్రోఫైల్ అందురు. దీనిద్వారా దూరి పరాగ రేణువులు పరాగకోశములో పడును.

కవచములలోపల న్యూస్టెల్లస్ ఉండును. దీనినుండి మామూలుగా నొక శాల వ్రత్యేకింపబడి యది బాగుగా నెదుగును. అది సలింగ రేణువులకు మాతృశాలగా వర్తించును. మొదట ప్రాస్పెరిఫజన, తదుపరి సూక్ష్మవిభజన పొంది ఇవి నాలుగు సలింగ రేణువుల నుత్పత్తి జేయును. అందు మూడు కృశించిపోయి, నాల్గవదిమాత్ర మభివృద్ధిజెంది ఆడుప్రోతేలస్ను తయారుచేయును. సాధారణముగ నొకటిగాని రెండుగానికూజాలు (Archegonia) ఆడుప్రోతేలస్ నందు వృద్ధిజెందును, ఫెరన్సునందుండెడి కూజాలకంటె నీ కూజాలు పరిణామోన్నతముగలవి. ఇందు రెండు గళశాలలు, అల్పాయుర్జాయముగల కుబ్జగళశాల, శోణిత రేణువుమాత్ర ముండును. కాలేయమూలికలలో కనిపించిన పాడుగు పాటి గళము క్రమముగా పొట్టిదగుచునచ్చి, ఫెరన్సునందు రెండు గళ రంధ్రశాలలను మాత్రమే కల్గియున్నది. పరిణామము పైకన్ మొక్కవరకు వచ్చువరకి యీ గళరంధ్రము పూర్తిగా తగ్గిపోయి రెండు గళ శాలలవలన మాత్రము గుర్తింపదగినదిగా నున్నది. కుబ్జగళశాల పుట్టిన వెంటనే నశించుచువున్నదిగా నున్నది. అందుచేత పరిణామమును కొలుచుటకు నీకూజా యొక కొలతబద్ధగా వర్తించుచున్నది.

పరాగకోశములో నుంచబడిన పరాగ రేణువులు (Microspoxes) అభివృద్ధిబొంది, ఒకటి రెండు శాలలుగల మొగప్రోతేలస్ను నిర్మించి

తదుపరి రెండు శుక్లరేణువులను సృజించును. బొంగరమునంటి ఈ శుక్ల రేణువులు, చుట్టను అనేక రోమములు కల్గియుండును. పరాగ పొట్టము (Pollen tube) ద్వారా కూజాలో ప్రవేశించిన యీ శుక్ల రేణువు ఒకటి రెండు సార్లు గ్రహున తిరుగుచు నీది తదుపరి శోణిత రేణువుతో కలిసిపోయి ద్విగుణి (Zygote) యేర్పడును.

ద్విగుణినుండి సూక్ష్మవిభజన పరంపరలమూలముగ రెండు బీజ వళములు, ప్రాథమికమూలము, కాండము గల ప్రాఅక్షము ప్రవృద్ధ మగుచున్నది. ప్రాఅక్షము యెదుగుచుండగ, గింబకూడ యెదుగును. ఎదుగునప్పుడు దానియం దాహారము శలవుచేయుచుండును. ఈ గింబలు వ్యాప్తికొంది, వానలు కురిసినమీదట సూక్ష్మరంధ్రముల ద్వారా నీటిని లాగుకొని వాటియందుగల ప్రాఅక్షము పెరుగుట కారంభించును. అది పెరుగునప్పుడు గింబలో నిల్గయుండిన యాహార పదార్థమునంతటిని స్వేచ్ఛగా వాడుకొని మొక్కగా పెరుగును.

సైకాస్ జీవితచక్రములోని వివరములు పరిణామ సిద్ధాంతమును బలపరుచుచున్నవి. ఇందు బొంగరములనంటి శుక్లరేణువులనేక రోమములను గల్గియుండి శోణితరేణువుతో కలియుటకు నీడుచు వెళ్ళుచున్నవి. శుక్లరేణువుల చరిత్ర మనము బాగుగా పరిశీలించినచో పరిణామ సిద్ధాంతము సులువుగా బోధపడును. ఎక్కువరకపునాచులలో (Thallophyte) రెండు రోమములు మాత్రమే గలవు. వాటికంటె నున్నతస్థితిగోనున్న కాలేయమూలికలు, పీచుమొక్కల (Mosses) యందునుగూడ నీ శుక్లరేణువులకు రెండు రోమములు మాత్రమే యున్నవి. నీటినుండి పరిణామముబొందిన లైకోపొడియమ్, కెలాజి నెల్లాయందుగూడ రెండు మీసములు కాన్పించుచున్నవి. కాని, యీ ప్రాథమిక ఫెరన్నునుండి యనేక తీరులుగా వృద్ధిజెంది, ద్విగుణ

శరీరమును (Diploid plant or Sporophyte) బాగుగా నభివృద్ధి చెందించుకొనియున్న యితర ఫెరన్సుజాతియంతటిలోను శుక్లరేణువుల కనేక రోమములున్నవి. అంతియగాక వంకరలు తిరిగి యుండు గుణము గూడ కలదు. వాటిపై తరగతిలోనివైన నగ్నబీజాల (Gymnosperms) లో పైకస్ లోతప్ప మరి యెందును శుక్లరేణువులలో రోమములులేవు. దీనినిబట్టి యూహింపగా ఫెరన్సునుగడి పైకస్ నంటి వ్రాధమిక నగ్న బీజాంకురము లుదయించినట్లు ప్రత్యక్షముగా తెలియుచున్నది.

ఈ తరగతి మొక్కలనేకపూర్ణములలో పరిణామము జెందినవి. 1. పైకస్ ఛిలికేల్సు 2. సైకడేల్సు 3. బెనడైటేల్సు 4. కోస్టేటేల్సు 5. కోనిఫరేల్సు 6. గింగ్కోయేల్సు 7. నిటేల్సు అను నడుశాఖలుగా పరిణామము బొందినవి. నీటిలో, 1, 3, 4, శాఖలకు జెందిన చెట్లు డెవోసియోక్ యుగమందు వుట్టి ప్రియోక్, కార్బోనిఫరస్ యుగములలో చాలనరకు విస్తరించి మెహోజోయిక్ యుగము నచ్చుసరికి క్రమముగా నంతరించిపోయినవి. మొక్కలు సులభముగా వ్యాప్తిజెందుటకు గింజలు ముఖ్యమైన ఉపకరణములు. ఈ గింజలలో భావ్యంకురములు నిస్సందేహముగా పెరుగుటకు, కానలసినంత యూహారము నిల్వచేయుటకు సావకాశమున్నది. వ్యాప్తిజెందుటకు గూడ ఫెరన్సులో నుండు విలింగ రేణువులకంటె ననేక వందలరెట్లు ప్రబలమైనవి. అధిక శీతోష్ణాదులు, నీరు విలింగ రేణువులను నశింపచేసినంత త్వరగా గింజలను చేయజాలవు. అందుచేత భవిష్యత్తేవి విలింగ రేణువులో నుండుటకంటె, గింజలో సురక్షితముగా నున్నచో బహు విస్తరణకు సావకాశమున్నది. ప్రకృతిలోనున్న సర్వజీవులందును బహు స్ఫుటముగా గోచరించు గుణములు అత్యోహణ, సంరక్షణ, వ్యాప్తి. ఈ మూడు


ఆశ్శములను నెరవేర్చుకొనుటకు జీవులు వేగజెంది, యెట్టి మార్పులను తాము పొందిన నీ మూడుకోరికలు నెరవేరునో యట్టి మార్పులను క్రమముగా పరిణామపూర్ణమున బొందినవి. వృక్షజాతిలో నట్టి ప్రధానమైన మార్పు గింజలను నిర్మించుకొనుట. ఈ మార్పునందు పై చూడు ఆశ్శములు నిస్సందేహముగా నెరవేరుచున్నవి. ప్లానేట్స్ యములు జీవితో బాగుగా నభివృద్ధిజెందినను, లేకపోయినను పై చూడు కోరికలయందు గాఢపాన యున్నట్లు మనము పరిశీలించినచో వృక్షజీవించుచును కాన్పించుచున్నది. ప్లానెట్, జంతు సృష్టి యభివృద్ధికి పరిణామమునకు నీ మూడుకోరికలు ముఖ్యహేతువు లగుచున్నవి.

7. లాజి నెల్లాలో కనపరచిన మెగాస్పా రేజియమునకును, గింజలకును నస్తుతత్వమున నెట్టి తేడాయును లేదు. అందుచేత గింజల నుత్పత్తి చేయు మొక్కలు పెద్ద, చిన్న తరగతుల విలింగ రేణువులు తయారు చేయు ఫెరన్సు పరిణామఫలితముగ నుదయించినట్లుగా నొక ముఖ్యమైన సిద్ధాంత మున్నది. డెవోనియన్ మహాయుగము ప్రారంభించునరే వృక్షజాతులలో గింజల నుత్పత్తిచేయవలయునను పివాస యెక్కువగా కలిగినది. కాని చెట్ల శరీరము మాత్రము ఫెరన్సు మొక్కల స్థాయికి మించి యభివృద్ధి జెందలేదు. అందుచేత ఫెరన్సునంటి మొక్కలు గింజలను కలిగియుండుట తటస్థించినది. ఈ తరగతి మొక్కలు క్రెటాజీవితీ కేల్సు, 'లైజినోపైటిస్, ట్లెహోమియా' అను మొక్క (74 వ పటము చూడుడు) డెవోనియన్ లో వుట్టి కార్బోనిఫరన్ మహాయుగమంతయు విస్తరించి అటుపైన యంతరించి పోయినది. దీనిగింజను, గింజయొక్క నిలువుబద్ద ఆకారమును 74 వ పటమున చూడుడు.

కార్బోనిఫరన్ మహాయుగమందు బాగుగా విస్తరించిన కోక్సైటేల్సు తరగతి మొక్కలు పెర్మియన్ యుగాంతమునకే యంతర్ధామై

పోయినవి. ఫోసిల్సునుబట్టి అప్పటి నాటి యునికేని తెలియగలుగుచున్నాము. సుహూరు ఆ కాలమునాడే బహుళవ్యాప్తి జెందిన బెనటై శేల్సు తరగతి మొక్కలుగూడ కాలప్రవాహములో కొట్టుకొని పోయినవి. గింక్గోయేల్సు తరగతివానిలో నొక్క మొక్కమాత్రము (75 వ పటము చూడుడు.) ప్రస్తుత మున్నది. దీనిని 'గింక్గోబైలోబా' అందురు.

గింక్గోబైలోబాయందు చాలవరకు ఆకు, కొమ్మ మేరులందు పరిణామోన్నతము గల్గియున్నను, రోమములుగల్గిన శుక్లరేఖవులు పరాగగొట్టములలో నీడుచున్నవి. ఈ యంశము పురాతనమై నాచుజాతుల నుండి అనుశ్రుతముగా వచ్చుచున్నది. వీటికంటె నింకొక మెట్టుపైకధిసోహించిన 'కోనిఫరేల్సు' శాఖవృక్షములం దీ పాత యలవాటు పోయి శుక్లరేఖవులు గుణగుణికమాత్రములుగా నున్నవి. గుణగుణికమాత్రములై పరాగగొట్టమున పర్యటించు శుక్లరేఖవులికవీస నర్ణింపబోవు మొక్కలన్నిటియందును గలవు. అందువలన నవి పరిణామోన్నతములని పరిగణింపబడు చున్నవి. నగ్నబీజ (Gymnosperm) తరగతిలోనివై యుండియు, ఆవృత్తిబీజలకు (Angiosperms) కు బహు సన్నిహితములైనవి ఈ శేల్సుశాఖకు జెందిన చెట్లు. సర్వవిధముల నవి యిప్పుడు పూలుపూచి కాయలు కాచుచెట్లవలె నుండును. గీటమ్ మొక్క (76 వ పటము చూడుడు) లోని జైలము పూలచెట్లలోని జైలమును పోలియున్నది. గింజకు పై కనచము (Outer integument), లోకనచము (Inner Integument) గాక దానిచుట్టును రక్షణకై పరివేష మొకటి యున్నది. అట్టి పరివేషము (Perianth) వెనుకటి నగ్నబీజశాఖలలో నెందును గానరాదు. ఇంతకంటె విపులముగాను, విశేషముగాను పూలమొక్కలలో నది కన్పించుచున్నది. అందుచేత పూలమొక్కలలో గనపడు పరివేష మిచ్చటనే



76 వ పటము :

నీటమ్ జీవిత చక్రము



త్రెజనా ప్లెరిస్ లో గింజలుగల కొమ్మ



త్రెజనా ప్లెరిస్ లో గింజ



గింజకవచము

నూనెపెట్టె
ప్రోతెలెన్

74 వ పటము :

త్రెజనా ప్లెరిస్ లో గింజలుగల కొమ్మ



గింజ

75 వ పటము :

గింకో బైలో బా

ప్రారంభమైనదని చెప్పవలసియున్నది. గింజలు కాయలలో నావృతమై యుండక నగ్నముగా నుండుటచేత నిది నగ్నబీజులలోనికే వచ్చుచున్నది. మామూలుగా లేగింజ మెగాస్పారెంజియముగా నర్తించి యం దొక్కటియే విలింగరేణువు గల్గి, దానినుండి ప్రోతేలస్ నిర్మింపబడుచున్నది. ప్రోతేలస్ నందు కూడా యొకటిమాత్రమే ఉండును. ఇది వెనుక సైకాస్ లో చూచిన కూజానలెగాక కోలగా నొక సంచివలె నుండును. చుట్టును దండవలె కొన్ని గుణగుళికలుండి మధ్య నొక పెద్ద గుణగుళిక యుండి శోణితరేణువుగా వర్తించును. (76, 78 పటములు చూడుడు). శుక్లరేణువులుగూడ గుణగుళికమాత్రములుగా నుండి పరాగగోట్టములద్వారా ప్రవేశించి శోణితరేణువులతో మిశ్రమించును. తత్ఫలితముగా ద్విగుణి (Zygote) దానినుండి మొక్కశిశువు ప్రవృద్ధమై కొంతకాలము పరకు గింజ మధ్యప్రదేశమున విశ్రాంతి తీసికొనుచుండును. గింజలు మేవీలో యిటునటు వ్యాప్తిజెంది, వానలు కురిసినపిమ్మట కొంత మొక్కలు మొలకలెత్తును. వీటియందు గింజలకు పరివేషము, పూర్వపు కూజాస్వరూపము మారిపోవుట పరిణామవిశేషములు. ఈ రెండు విశేషములవలనను నిది పూలచెట్లకు బహు సన్నిహితముగా నున్నది. ఆ కారణమున నీటమునంటి నగ్నబీజతరగతి మొక్కలలోనుండి పరిణామరీత్యా ఆవృతబీజులు (Angio sperms), అనగా కాయలలో గింజలుగల చెట్లు ఉద్భవించియున్నవని సిద్ధాంతము చేయబడినది.


జంతుసృష్టి :

మెసోజోయిల్ యుగమందు రెట్టెల్గు తరగతి జంతువులు బహుళముగా విస్తరించి, అనేక శాఖోపశాఖలుగా వృద్ధిజెంది ప్రాబల్యమును వహించినవి. ఇప్పటి జంతువులకంటె ననేక వంతులెట్లు పెద్దజంతువు

లుండెడివి. బల్లి, మొసలి, వాము, తాబేలు మొదలైన వీ తరగతివి. కొన్ని యంశముల సమానత్వ ముండుటచే రెప్టైల్సును, పక్షులను, పాలిచ్చు జంతువులను 'అమ్నియోటా' అను పెద్ద విభాగములో జేర్చి వ్యవహరించుచున్నారు. వెన్నుపూస కల్గిన బెలనోగ్లోసస్సు, చేపలు, కప్పలు మొదలైనవి రెండవభాగమైన అనామ్నియోటాకు జెందినవి. రెప్టైల్సు ప్రాతిపదికలోనే మూడుశాఖలుగా పరిణామ మొందినటుల తెలియుచున్నది. అదొకశాఖ రెప్టైల్సుకు పాలిచ్చు జంతువులకు మధ్యరకముగా నుండు జంతువులను సృష్టించి, వాటినుండి పాలిచ్చు జంతువుల నుద్భవింప జేసినది. రెండవశాఖ పక్షుల యుత్పత్తికి కారణ మైనది. మూడవశాఖ రెప్టైల్సులోనే ఉన్నతమైన జంతువు లుదయించు టకు మూలమైనది. ఈ విషయమును 77 వ పటమును పరిశీలించిన సులువుగా తెలియును.


వీటియందు పూర్తిగా వృద్ధిజెందిన తల, మెడ, పొడుగాటి శరీరము, క్రమముగ సన్నగిలిపొవు పొడుగుపాటి తోక విశేష గుణములు. కప్పలకు, వీటికి ముఖ్యమైన తేడా, పై చర్మముమీద యెముక పదార్థముతో నిర్మింపబడిన పెచ్చులు. తాబేలునం దీ పెచ్చులన్నియు నేకమై యొక బలవత్తరమైన పెంకుగా మారినవి. తలలోను, మిగిలిన యంగములలోను ఉన్నత జంతువులలో నుండు నటువంటి బలమైన యెముక లేర్పడియున్నవి. అయిదువ్రేళ్ళు, వాటికి గోళ్ళు యేర్పడుట మరియొక విశేషము (78 వ పటము చూడుడు.)

రక్తమండలము :- హృదయమునందు సైనస్ వెనోసస్సు, కుడి, యెడమ కర్ణికలు (auricles) అనుపూర్తిగా నొకపొరచే విభాగింపబడిన జతరిక (Ventricle) ఉన్నవి. ఉభయజీవులలో నీ జతరిక




77 వ పటము :

రెస్ట్రోసూ (బల్లిజాత జంతువులు)




78 వ పటము :

లెసిర్లా విరిడిస్ (Lacerta Viridis)




81 వ పటము :


డైమెట్రోడన్ (Dimetrodon)



79 ప పటము :
బల్లి హృదయము



80 ప పటము :
బల్లి మెదడు



82 ప పటము :
డ్రేకోవులాన్స్ (Draco Volans)

విభాగము లేకుండుటచేత శుద్ధ, అపరిశుద్ధరక్తములు రెండును కలియుటకు నానకాశము కల్గుచున్నది. అట్టిలోపము రెండైయున్నచో కీరిహాయి నది. వీటికి పై జంతువులన్నిటిలోను జరిగియుండు రెండు సంపూర్ణములైన విభాగము లుండును. అట్లుండుటవలన చేగురక్తమును దేహమందు వివిధ ప్రదేశములకు పంపుటకు వీలగును. ఉచ్చాచ్ఛ్వాసక్రియ బాగుగా ప్రవృద్ధమైన యాపిరిటియైట్లవ్యాధి జరుగుచున్నది. తిమ్మలలోపల తేనెపట్టులోని గదులమాదిరి గదు లుండును.

నాడీమండలమున (80 వ పటము చూడుడు) కొన్నిచూర్పులు కలిగినవి. కప్పమొదడుతో పోల్చినచో వీటియందు ఆల్ ఫేక్టరీజోబులు పెరిగియున్నవి. కెరిట్రల్ హేమిన్ ఫియస్సు పెరుగుటయేకాక కోలగానున్నవి. ఆప్టికోలోబ్సు మామూలుగానే యున్నవి. డైన్ సిఫెలాన్ యందు పీనియల్ బాడి స్ఫుటముగా కనపడుచున్నది, (80 వ పటము చూడుడు). మూత్రకృచ్ఛమునందు రెండుకిడ్నీలు, మూత్రపుసంచి, అది బయటకు విడుచుటకు క్లోనకామొదలైననన్నియు సమానములు. సంతానోత్పత్తి మండలముగూడ నించుమించుగా కప్పకున్న మండలముతో సరిపోల్పబడి యుండును. రెండైయున్నందు డై మెట్రోడకోవంటివి పురాతనములు (81 వ పటము చూడుడు). వీటియునికి 'ఫాజిల్స్' వలన తెలియుచున్నది. ఈ జాతిలో నిది బ్రాంట్ సారస్ (83 వ పటము తూడుడు) ఇట్టి పెద్ద పెద్ద జంతువు లొకప్పుడు విరివిగా భూమిమీద తిరుగాడుచుండెడివి. కొన్ని బల్లిశాఖలు ఎగురుటకు రెక్కలు కల్గియుండెడివి. ఇందు డ్రెకోవోలేన్సు (ఎగిరేబల్లి) (82 వ పటము చూడుడు) ప్రధానమైనది. ఈ తరగతి పరిణామశాఖలు ఉచావారణ బొమ్మల వలన సులువుగా తెలియనగును. ఇందు కొన్ని శాఖలు సాములుగా మారుటకు బరిణామము నొందినవి. ఈవిషయము

వైగోపన్ లెవిడోపన్ (84 వ పటము చూచుడు) వలన విశదమగు చున్నది. దీనియందు నెనుక కాళ్ళు పూర్తిగా శరీరములో గలసిపోయి, ముందు చేతులు నామమాత్రముగానుండి, శరీరము, తోక పాములకు వలె సన్నముగాను పొడవుగాను తయారైనవి. ఇట్టి జంతువులు క్రమముగా పాముజాతిలోనికి మారుట బహుసులభము. ఇది పాముకు మిక్కిలి సన్నిహితముగానున్నది.


కొన్ని శాఖల రెప్టైలునుండి పక్షు లుదయించినవని యూహించుచున్నారు. పక్షి జాతి యంతయు గాలిలో నెగురుటకు అలవాటు పడినవి. వాటి అంతరాంగము లన్నియు నల్లెగురుటకు సహకారులుగా నున్నవి. పక్షులందు శీతోష్ణాదులను ధిక్కరించు యీకల కవచము, ముంజీతులు రెక్కలుగా మారుట, ఉచ్చ్వాస మండలము సంపూర్ణ త్వమును బొంది రక్తము నెప్పుడు సధికమైన వేడిగా నిలబెట్టుట మొదలైన యంశము లవి బాగుగా చాలసేపు ఎగురుటకు పరికరములుగా నున్నవి. పళ్ళు లేకపోవుట (86 పటము చూచుడు.), నూతనమైన మెడకు పొందిక, ఆఘ్రాణేంద్రియము సన్నగిలిపోవుట, నేత్రము లత్యున్నత పరిణామము బొందుట వీటియందుగల విశేషములు. పక్షి జాతి నంతను పరిశీలించినను వాటి యంతశ్శరీర చట్రమునందుగాని, యంతరాంగములందుగాని యధిక భేదములు కన్పింపవు. అందువలన జాతి యంతయు నొకే నమూనాలో నున్నదని చెప్పవచ్చును. పెంగ్విను పక్షులకు ఈకలు, రెక్కలు లేవు. (86 వ పటము చూచుడు.) అది యొకటితప్ప మిగత పక్షి జాతి కంతటికి యీకలు గలవు. వీటి అస్థి పంజరమందు రెప్టైలులో వలె బలమైన ఎముకలతో శీరస్సు, చేతులు, మొండెము, కాళ్ళు, తోక నిర్మింపబడియున్నవి. ప్రాథమిక పక్షులకు పళ్ళుండెడివి. ఈ పక్షులు క్రిటేషన్ యుగమందు జీవించుచుండి క్రమ



83 వ పటము .
 (బ్రాంటోసారస్ (Brontosaurus))



84 వ పటము .
 పైగోపస్ (Pygopus)



85 వ పటము .
 కొలంబియా లివియా (Columbia Livia)



86 ప పటము :
పెంగ్విన్ (Penguin).

ము? నశించినోయినవి. ఇప్పుడు జీవించుచున్న పక్షి, శాశు లన్నిటి యందును పళ్ళు లేవు.

జీర్ణమండలము (Digestive system) . బహు: కాలిన్యమై రెండు భాగములుగానున్న ముక్కు వీటికి గలదు. ఈ భాగములు రెండును పెదవులస్థానములలో నున్నవి. అవి తెరచుటవలన లోనికిపోవు ద్వారము, నోరు, నాలుక పెద్దదిగానుండి క్రమేణ సన్నమును. (80 వ పటము చూచుడు.) గొంతుక సన్నని గొట్టమువలె సాగి యొక విశాలమైన సంచితలోనికి పోవును. దీనికి క్రాచ్ అని పేరు. (80 వ పటము చూచుడు.) పక్షుల కీది మొదటిపొట్ట. గింటలను తినునప్పుడు త్వరత్వరగా అందినన్ని గింజలను నీ క్రాచ్ లోనికి నింపును. గింజలను తినిన తర్వాత గింజలంత పరిమాణము గల రాళ్ళనుగూడ పక్షులు మింగుట కలవాటు పడినవి. ఈ పొట్టలో కొంతవరకు గింజలు తిర్జన భర్జన కాబడినవి. క్రాచ్ తరువాత నాహార గొట్టము తిరిగి సన్నగిలి ముందుకు సాగి ప్రోవెంట్రీక్యులర్ అను చిన్నపొట్టలో ప్రవేశించును. ఈ పొట్టయందు జీర్ణద్రవములను స్రవించు క్లెంట్సు ఉండును. దీనివెంబడి గిజార్లు అను పొట్ట ఉన్నది. దానిలో నవకాశము తక్కువకలిగి బహు కాలిన్యమైన రెండు బూరెలమూకుడువంటి డిప్ప లొకదాని కొకటి యంటించి నట్లుగా గిజార్లు కనిపించును. మ్రింగినరాళ్ళు గిజార్లులో చేరి యుండి, తినిన గింజలను బాగుగా మర్దించి నలుపుటకు పనికివచ్చును. మిల్లులో గింజలు నలిగి పొడుమైన మాదిరిగా గిజార్లు పొట్టలో గూడ మర్దింపబడి పొడుమై పోవును. గిజార్లు తరువాత డ్యుయోడినము, దాని తరువాత 'యిలియము' అను పేగు. ఈ రెండును సన్నని గొట్టములే. డ్యుయోడినము వంకరగా తిరిగి పేక్రియాస్ ను చుట్టివచ్చును. పేగు కొన యందు రెక్టము, దాని చివర గుదము ఉండును. (80 వ పటము). వీటి యందు కాలేయము (Liver) రెండు పెద్ద తునుకలవలె నుండును.


స్పైను యెరువురంగు గలిగి కోలగా నుండును. పతల యందు సంపూర్ణత గాంచిన రెండు మూత్రకృచ్ఛము (Kidneys) లుండును.

రక్తమండలము : (87 వ పటము) హృదయ కుహారము మొసలికి నున్న మాదిరిగా నుండును. కుడియెడమ కర్ణికలు, జఠరికలు కలిగి సై నస్సు వెనోసస్సు లేకుండగ నుండును. కుడికర్ణికలో నిది కలిసి పోయినది. ఇందుగల విశేషము రెపైల్సులో నసంపూర్తిగా విభజింపబడిన జఠరిక పూర్తిగా విభజింపబడుట వలన పరిశుద్ధ రక్తము శరీరమున కంతకును పంపబడుచున్నది.


నాడిమండలము (Nervous system) : (88 వ పటము) ఇందు సెరిబెల్లము చాల పెద్దదిగా నున్నది. సెరిబ్రల్ మోమిస్ఫియర్సు సెరిబెల్లము దాక వ్యాపించినవి. ఆ కారణమున ఆప్టిక్ లోబ్సు ప్రక్కలకు త్రోసివేయబడినవి.

ఆల్ ఫేక్టరీ బల్బులు చాల చిన్నవిగా నుండును. అందుచేత వాసనను గ్రహించు శక్తి వీటికి తక్కువగా నుండును. కళ్ళు, వాటికి సంబంధించిన నాడిమండలము, అనగా ఆప్టిక్ లోబ్సు బాగుగా నభివృద్ధిబొంది యున్నది. అందుచే వీటికి దూరపువస్తువులను చూచు శక్తి యధికముగా నున్నది. ఈ శక్తి గాబోందుజాతి పక్షులలో మిక్కిలి యధికము.


శ్రవణేంద్రియము (90 వ పటము) రెపైల్సు (89 వ పటము) కంటె విశేషమును గాంచినది. 'కోక్లియా' యనునది యధికముగా వృద్ధిబొంది యున్నది. లేబరిండ్ చుట్టను. ఎముకయుండుట రెపైల్సు లేవికంటె విశేషము. టింపెనిక్ కేవిటీయును, కోలుమెల్లాయును, బల్బులలో నున్న హూదిరిగానే యున్నవి. యుసన్నని యుస్పేనియన్ గొట్టము గొంతుక




87 వ పటము :
పక్షుల హృదయము



88 వ పటము :
పక్షి మొదడు



89 వ పటము :
బల్లి చెవిలోని భాగములు



90 వ పటము :
పావురము చెవిలోని భాగములు

గొంతుక పై భాగమున బయటకు తెరుచుబిందున్నది. ఈ రెండుతర గతుల చెవి యంతర్భాగములు 89, 90 పటములలో చూచినచో పరిశామవిశేషములు బోధపడను.

కిక్కిలు మూడుశాఖలు గల్గియుండును. మూత్రివునంచి (Urinary bladder) పిటికుండదు. పక్షులన్నిటియందు కత్తము 38°C వేడిగలిగి యుండును. రెట్టెల్లునరకుగల జంతువులన్నియు వాటి వరిగరముల వేడినే కల్గియుండును. అంతకుముంచి వేడిని నిల్చుకొనుటకు వాటికి గామర్థ్యము లేదు. అందుచే వాటిని శీతలరక్తపు జంతువులుగా నిర్దేశించియున్నారు. పక్షులు, పాలిచ్చు జంతువులు సర్వదా వేడిరక్తమును కల్గియుండును పరిసరముల యుష్ణపరిస్థితు లెట్లున్నను లక్ష్యముచేయక నీ రెండు తర గతుల జీవులు తమరక్తమును ఒకే సరాసరి యుష్ణమున నిల్పగల్గుచున్నవి. ఆ కారణమున నీ రెంటిని యుష్ణరక్తపు జంతువులుగా వ్యవహరింతురు. పాలిచ్చుజంతువుల కంటెను పక్షుల రక్తము ఉష్ణాధిక్యము గల్గియుండును. అందుచేత జంతువులకంటె పక్షులు నిత్యము చురుకుగా నుండును. వీటికి సోమరి తనమనేది యుండదు.

సంతానోత్పత్తి విధానమునందు శుక్ల, శోణితరేణువుల కలయిక చేత ఆడు పక్షిగ్రుడ్లను నిర్మించి పెట్టెను. బయటకు వచ్చిన పిడవ కొంత కాలము వెచ్చని ప్రదేశములో నుండిన యవి పిల్లలగును. వాటికి పెచ్చదనము కల్గించుటకు పక్షులు గ్రుడ్లువెట్టి వాటిమీద చాలసేపు కూర్చుండును. ఈ క్రియను పొదుగుట యందురు. పక్షులు గాలిలో యెగురుట కలవాటుపడియుండుటచేత వాటి శరీరములు బహుశముగా నెదుగుటకు సావకాశములేక పోయినది. సాధారణముగా పావురము గంటకు నలుబది మైళ్ళ వంతున యెగురగలదు. గ్రద్ద యంతకంటె వేగముగా ప్రయాణము చేయగలదు. కొన్నిరకముల రాబొందులు గంటకు నూరు లగాయతు

నూట యిరువది మైళ్ళ వరకు వేగమున పోగలవు. వాటిపొట్టలలో గాలిని బంధించుటకు కొన్ని సంచులుండును. ఆ సంచులను గాలితో నింపగా నవి తేలికమై గాలిలో ప్రయాణముచేయుట సులభమగుచున్నది. ఎగురుటకు రెక్కలుగాని, రక్షణకు ఈకలుగాని లేని పక్షులు గూడ నున్నవి. వాటిని పరిణామమునం దధమముగా నెంచవలసియున్నది. యుడైప్స్ ఎంబోపోడము అను పక్షి ఎగురుటకు రెక్కలుగాని, ఈకలు గాని లేనిది. దీనిని పెంగ్విన్ అని వాడుదురు. (86 వ పటముచూడుడు)

కొన్ని పక్షులలో స్వరపేటిక బాగుగా పెంపొందినది. చిలుక, కోయిల, నైటింగేలు మొదలైన పక్షులకు స్వచ్ఛమైన స్వరములును. గ్రుడ్లుపెట్టిన తరువాత వాటిని పొదుగుట, చిన్నపిల్లలకు ఆహారము తెచ్చియిచ్చుట పక్షులయం దనుశ్రుతస్వభావమై యున్నది. గ్రుడ్లుపెట్టుటమాత్రమేగాని, వాటి సంరక్షణ, యవి పిల్లలైన పిమ్మట పోషణ మొదలైన యాచారము రెట్టెలునందుగాని, వాటి కింది జంతువులలోగాని కానరాదు. ఈ యంశమును జన్మోత్తర సంరక్షణ (Post natal care) అందును. జన్మోత్తరసంరక్షణ జ్ఞానము పక్షుల లోను, పాలిచ్చు జంతువులలోను మాత్రమే ఉన్నది. ఆడుపక్షులకంటె మొగపక్షులు మంచి రంగుగల రెక్కలను, తోకలను కలిగియుండును. ఇట్టి కలిగియుండుటలోని యాశయము ఆడుపక్షులకు నాకర్షణీయముగా నుండుట.

పినోజోయిక్ మహాయుగము

దీని పరిమాణము సుమారు పదికోట్ల సంవత్సరములు. కొందరు నవీనకాలమునుండి యూరుకోట్ల సంవత్సరముల వరకే యీ యుగమును గుర్తించుచున్నారు. ఈ కాలపరిమితియందు గింజలకు రక్షణహేతు

వైచిత్ర్యమును కలుగజేయుచు వున్నది. తేనె పువ్వులు, నీలకంఠపువ్వులు మొదలైన గాఢ రుచున్నవి. అవ్వలపువ్వులు (Petalia) పువ్వులను అభివృద్ధిచేయుచుండి గండ్లపువ్వులు కడువలపువ్వులు అనునవి మొదలైనవి సాధారణ ముంబులు కల్గినవి. ఇందుకు సావన తొలినాగు క్రింది తొలినాగు లోని నీలము (Gnetum) వంతు కల పరికేతుము (Periamth) నలనచే యుగాహించి చూడవచ్చును. నీలము సావనయందు ఇవిచ్చుస్త్రులను దండాశయ (Ovary) మున్నగుటకు సూచనలు లేవు. అందుచేతని పుష్పములలో ప్రాథమిక మొక్కలలోని దరిస్థితులను, నీలము లోనుండు దరిస్థితులకు వ్యత్యాసము చాలవరకు కన్పించుచున్నది. ఈ రెంటికిని మధ్యముగానున్న చెల్లు యివ్వకుం జేవించుచున్న వాటిలో లేవు. గనులు త్రవ్వనపుడు మొక్కల ముద్రలగుల గాఢి వ్రతి మలు గొరుకుచుండును. వాటియే భూసిల్లు అను విషయమును వెనుక ప్రకరణములలో చదివియున్నాము. అట్టి భూసిల్లును పరిశోధించి వాటి యాధారమున తెలుసుకొనబడు శాస్త్రమును పేలియంటాలజీ (Paleontology) అందును. ఇటీవల నీ శాస్త్రము వాగుగా సభివృద్ధి నొందినది. అనేకవందలు, వేలు గాఢియుద్రలను (ఫోసిల్లు) పరిశీలించి చాల నూతనవస్తున యంశములను వెల్లడించుచున్నారు. ఈ యంశములనలన నివ్వకు భూమండలమునికాద జేవించుచు నుండని మొక్కలు, జంతువులు పెద్దకాలముక్రిందట జేవించి, యంతరించి రోయి నటుల తెలియుచున్నవి: ఛామస్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు 1925 న సంవత్సరములో కొన్ని మెగాస్పోరోఫిల్లు (Megasporephylls) ను, మైక్రోస్పోరోఫిల్లు (Microsporephylls) ను జూచి మొదట వాటికి కెటోనియాథామసి (Caytonia thomasi) అనియు, రెండవవాటికి కెటో నేథసు ఆన్ కోడెస్ (Caytonauthus oncodes) అనియును


పేర్లు పెట్టి యీ మొక్కలు, సిస్టోకోయిక్ మహాయుగమం దొక యంత
 స్థానమై క్రిటేషన్ యుగమందుండి తద్వారా యంతరించినట్లు
 తెలియపరచెను. వాటిపరిస్థితులను పరిశీలించినచో నవి ప్రస్తుతమున్న
 నీటము చెట్లకు, పూలచెట్లకు మధ్యతరగతితో నివై యుండి వెనుకటి
 సందేహముద్రమును దాటుటకు వారధిగా వర్తించుచున్నవి. (91 న
 పటము చూడుడు).

కేటోనియాలోని గింజలు ప్రాథమికకాయలు (Cayonia):

కేటోనియాచెట్లయందలి కాయలందు రక్షణకై అండాశయము
 మాత్రము ప్రాథమికదశలో నున్నదిగాని, నవీనమగు పూలచెట్లకుండు
 కీలము (Style) కీలాగ్రము (Stigma) ముదలైనవి యేర్పడి యుండలేదు,
 నలుపుగింజలకు నీమాత్రముగూడ యేర్పడి యుండని కారణమున
 దానికంటె కేటోనేంతను పరిణామోన్నతములోనుండి: పూలచెట్లలోని
 భాగముల యాగమనమును సూచించుచున్నది. కేటోనియానంటి
 చెట్లు పరిణామముబొంది యిప్పటి పూలచెట్లు ముఖ్యముగా చంపకము
 (Michal lia champaca) వంటి చెట్లవలె మాపు జెందినవి. కాని
 వెనుకటి నమూనా కాల ప్రవాహములో నిలబడలేక నశించిపోయినది.

ఆవృతబీజులు (Angio sperms)




జీవితచక్రము సులువుగా ముగించుటకును, తామున్న ప్రదేశము
 నందుగల వాతావరణ పరిస్థితుల కలవాటుపడి తదనుకూలముగా తమ
 డేహములను నిర్మించుకొనగల్గు శక్తియు, శీఘ్రముగా తమజాతిని విస్త
 రించుకొనగల్గు నామర్థ్యమును వీటికి కలదు. ఫెరస్సునందు ప్రాముఖ్యత
 వహించి దీర్ఘకాలము స్వతంత్రముగా జీవించుట కలవాటుపడిన
 ద్విగుణశరీరము, నగ్న బీజులలోను, ఆవృతబీజులలోను రాను రాను
 మరింత పరిణామోన్నతమును గాంచినది. ఏకగుణశరీరము సంకుచితమై,
 యల్పమై, స్వల్పకాలములో యంతరించినపునదియై యున్నది. వృక్ష



91 వ పటము :

కెటానాంథస్ ఆర్బెరి (Caytonanthus Arberi)

Note : Caytonanthus Arberi. Figures are drawn with the help of the diagrams published by T. M. Harris (Reading University) in the August 1951 issue of Phytomorphology.




92 వ పటము :

పువ్వులలోని పరాగ సంపర్కము, శుక్లశోణితరేణుమిశ్రమము

పరిణామములోని ప్రధానాంశము: ఇదియై యున్నది. నాచుల (Thallophytas) లోను, కాలేయ మూలికలలోను (Bryophytes) వ్రాముభ్యత సహించి చిరకాల జీవితమున ఏకగూణ శరీరము క్రమముగా ఫెరన్ను, నగ్న బీజలు, ఆపృతబీజల లోను సంకుచితము, యల్పము, సూక్ష్మమైపోయి, అచిరకాలములో యంతర్ధానమగుచున్నది. ద్విగూణ శరీరము నాచులలో నామమాత్రముగా నుండి కాలేయ మూలికలలో కొంతవరకు తలయెత్తి, ఫెరన్ను లగాయతు స్వక్షములలో స్వతంత్ర జీవనమున కలవాటుపడి రానురాను ఉత్కృష్టమైన వ్రాముమును వహించినది.

పూలమొక్కలలోని వేళ్ళు, మొదలు, కొమ్మలు, ఆకులు, పూల గుత్తులు అన్నియు ద్విగూణశరీరము (Diploid plant) నకు జెందినవియే. రక్షకపత్రములు (Sepals), అక్షరణపత్రములు (Petals) కింజల్కములు (Stamens), కేసరములు (anthers) మొదలైన వన్నియు ద్విగూణములుగాని కేసరములయం దొక వరుసకాలలు వ్రాస్వ విభజన (Reduction division), తదుపరి సూక్ష్మవిభజన (Mitotic division) ను బొంది యొక్కొక్కటి నాల్గునంటున పరాగ రేణువులను నిర్మించును. ఇవి ఫెరన్ను జీవితచక్రమునందు చూచిన విలింగ రేణువులకు సమానములు. అందుచేత ఏకగూణశరీరము పరాగ రేణుమాత్రముగా నున్నది. (92 వ పటము చూడుడు.) పరాగ రేణువులు ఎగిరెడి కీటకములవలన కేసరములనుండి కీలాగ్రములకు గొంపోబడును. పరాగము, ఫెరన్నులోని చిన్న సలింగ రేణువులకు సమానము. కేసరము లట్టి రేణు తిత్తులకు సమానము. సైకస్ లో యీ తిత్తులే గుండ్రముగా మైక్రోస్పోరోఫిల్ మీద గలవు. పూలమొక్కలయందు కేసరపు తిత్తులలో నుత్పత్తి యగుచున్నది. వాటి జీవిత చక్రములో సరిపోల్చినచో నివి మొగ ప్రోతేలస్ ను నిర్మించి దానియందు

ఏకాక్షేపియన్సును స్పృశించుకొని, యందు శుక్ల రేణువులు నుట్టెట్టి కేయ
 వలసి యున్నది. ఈ క్రియ లన్నియు ఫెరన్సులోనే గాక సూక్ష్మ దశ
 లలో త్వరత్వరగా జరిగిపోవుచున్నవి. పరాగ ప్రస్ఫుటము పటములలో
 1 లగాయకు 4 వరకు క్రమమున చూపబడినది. మొదటి పటమందు
 గల పరాగ రేణువునకు నొక్క గుణగుళిక యున్నది. ఇది సూక్ష్మ
 విభజన వలన రెండగును. అంతోకనూనిని గొట్టపు న్యష్టి (Tube
 nucleus) రెండవది జనక న్యష్టి (Generative nucleus) యని
 అందును. మొదటిది విభాగమును బొందక యుట్లే యుండును.
 దీనిని ఫెరన్సులో నుండు మొగ ప్రోతేలస్ కు నానవాలుగా గుర్తించు
 చున్నారు. రెండవ న్యష్టి విభాగమై రెండు చిన్న గుళికలు స్పృశంప
 బడును. వీటిని మొగ గుళిక అందును. కాలేయ మూలికలలోను,
 ఫెరన్సులోను, మొగ రేణువులకు రోమము లుండు దుఃఖారమున్నది.
 ఈ ఆచారము సైకస్ లోను, గింక్గోలోను గూడ సకృష్టంగా కనపడినది.
 అటుపైన ఉన్నతమైన పైనప్పు నందుగాని, నీటమునగుగాని యీ
 శుక్ల రేణువులకు రోమములు లేవు. పూలమొక్కలలో నవి
 యన్నియు సంకుచితమైపోయి శుక్ల రేణువుల గ్ఘాసము నందు యీ
 రెండు మొగ గుళికలు (Male nuclie) నిలచినవి. ఇది చాల మను
 యుగములలో జరిగిన పరిణామమునకు ఫలితము. పరాగ రేణువు
 కేలాగ్రమందుంచబడిన తర్వాత పైన వివరించిన పూర్వులు జరుగును.
 అటుపైన పరాగ రేణువున కున్న రెండు కనచముల సందులలో నుండి
 జీవదార్ధము బయటకు నొక సన్నని గొట్టముగా వచ్చును. దీనిని
 పరాగ గొట్ట మందును (Pollen tube). ఈ గొట్టము ద్వారా మొగ
 గుళికలు ప్రయాణము చేయును (92 వ పటము చూడుడు). కేవలము
 మధ్యభాగము నందు చొచ్చుకొనుచు పోయి, యీ పరాగ గొట్టము



93 ప పటము :

అండాశయములలో శుక్ల శ్శేపిత రేణువుల మిశ్రమము

లేగింజ (Ovule) మాత్రమే ద్వ్యాము ద్వ్యానా లోనికి ప్రవేశించి యుండి కోశమును (Embryo sac) ను కేరను.

లేగింజ లేక జీర్ణాబు అనగా మోగాన్పొయెజయము. ఇంకోక్కటియే తల్లిశాల Mother cell ద్వారా కెల్లి ప్రాప్త్యు క్రాత్త్య విభజనలను బొంది తిస్మాతకముగా నాలుగు మోగాన్పొయెజు నిర్మించును. వస్తు వివర్ణనలో కెల్లాకెల్లాలో చూచిన మోగాన్పొయెజును ఏటికిని కేరములేదు. కాని గ్యూనాములో చాల కేరము కలిగినది. జీర్ణాబు మోగాన్పొయెజు గుణగుళికవూని గ్యూనాచములు. మోగాన్పొయెజునందున్న యీగ్నాబు గుణగుళికలోను, మూడు కృశించి నశించిపోయి నాల్గవదిమాత్రము పెరుగును. ఇది పెరుగుట వలన అండాశయము నిర్మింపబడుచున్నది. ఏటిపెరుగుట క్రమము తిరచ పటములలో చూపబడినది. నిలువుగానున్న నాల్గువిలింగ లేణువులందును పైమాడు కృశించిపోయి, ఆభరిది పెరుగును. (3 వ బొమ్మ).

అండాకోశ మభివృద్ధిమైన సిస్ట్రుట నాల్గవ లేణువు గుళిక విభజన వలన కెండ్డె అవి చేరి యొకమూలకు జగుగును. (4 వ బొమ్మ). ఈ గుళికలు మరల రెండువిభజనలను బొందుటచేత ఒక్కొక్క వైపున నాల్గు గుళిక లేర్పగును. (5, 6 బొమ్మలు). అంతట కెండు కొనలయందుగల యీ గుంపులలోనుండి యొక్కొక్క గుళిక మచ్ఛకు జుగును. (7 వ బొమ్మ మచ్ఛకు వచ్చిన రెండు గుళికలు కలసిపోయి యొక బోనగుళిక (Endosperm) యుగును. ఇప్పు డండ కోశమునకు సూక్ష్మరంధ్రపుకొనయందు మూడుగుళికలు, దాని పెరుగు మూలయందు మూడుగుళికలు, వాటి మచ్ఛ ప్రదేశముందు బోనగుళిక యుయగును. (8 వ బొమ్మ చూడుడు). అండకోశమునకు సూక్ష్మ రంధ్రమున్నవైపు, సూక్ష్మరంధ్రపుకొన, (Micropylar end) దాని పె.మటి

కొన పలాజల్ కొన (Chalazal end) యందును. ఈ పలాజల్ కొనయందుగల మూడుగుళికలు కృశించి, నశించిపోవును. సూక్ష్మ రంధ్రపు వైపుననున్న చూడు గుళికలు శోణితపరివారముగా (Egg apparatus) నగును. చూడింటిలోను మధ్యగుళిక శోణితగుళిక గాను, దానికిరున్నైపులనున్నవి. సహకారులు (Synergids) గాను వర్తించును. ఇట్టి పరిస్థితులలో పరాగ రేణువునుండి బయలుదేరిన పరాగ గొట్టము మెల్ల మెల్లగా కీలము మధ్య ప్రయాణముచేసి సూక్ష్మ రంధ్రముద్వారా అండాశయములోనికి పోవును. గొట్టపు చివరనున్న గోడ కఠివిషయి శుక్లగుళికలు రెండును బయటబడును. అంతట నొక శుక్లగుళికశోణిత గుళికతోను, రెండవది బోనగుళిక (Endosperm) తోను మిశ్రమించును. బోనగుళిక త్రిగుణి. పిండగుళిక ద్విగుణి, యగుచున్నవి. బోనగుళిక వెంటనే విభజన ప్రారంభించి చురుకుగా గుళికలను నిర్మించు చుండును. ఈ గుళికలమధ్య గోడలు యేర్పడుట చాల ఆలస్యమగును. అట్లు ఏర్పడిన పిడప దానిని బోనము (Endosperm) అందురు. అంతలో ద్విగుణగుళికగూడ విభజనకారంభించి మొదట నిలువుగా యొకనరుస శాలలను నిర్మించును. దీనిని 'ప్రో ఎంబ్రియో' అందురు. దీనియందుగల చివరశాల నిలువు విభజననుబొంది, తరువాత ననేక దిక్కులుగా విభజననొందును. వాటి ఫలితముగా నొక మొక్క శిశువు యేర్పడును. ఇది యెదుగుచున్నంత కాలము బోనము (Endosperm) నుండి యాహారమును తీసుకొనుచుండును. పూర్తిగా నెదిగిన మొక్కశిశువునందు (10, 11, 12 బొప్పలు చూడుడు) వేరుకొన, కొమ్మకొన, రెండు బీజదళములు ఏర్పడును. ఈ స్థితిలో మొక్క శిశువు గింజయందు విశ్రాంతి తీసుకొనుచు నుండును. మొక్కశిశువు ఏర్పడుటకు కొన్ని గింజలలో బోనమంతయు ఖర్చుపడిపోవును. అట్టి వాటిని బోనరహిత బీజము లందురు. (Nonendospermic seeds)

మరికొన్నిటిలో కొంతవరకు ఖర్చువడి మరికొంతభాగము మోలి
 చుండును. ఈ మోలియన్న సూక్ష్మము గొడవనుండి అంకుర వృద్ధి
 వృద్ధిమై వైకనచ్చునప్పు దువయోగవహము. అట్లనాటిని బాహ్యహీత
 బీజము (Endospermic seeds) అనెచును. ఈ విధమున పూల
 మొక్కలలో జీవితచక్రము పూర్తి యగుచున్నది. తాడీచెట్లు, తొప్పరి
 చెట్లు, వరి, బొన్న, కెదురు, చెఱుప, అరటి మొదలైన మొక్కల
 యందు శిశుమొక్కకు రెండు బీజదళములుండక నొక్కటియే
 యుండును. ఈ యంశము కారణముగా పెట్టుకొనిన-వో పూలమొక్కలు
 రెండుభాగములుగా నగుచున్నవి.

భూమండలమువూర ద్వీదళబీజపు మొక్క బాతులు సుమా తొక
 లక్ష యున్నవి. ఏకదళబీజపు బాతులు పాతికవేలు గలవు. ఈ రెండు
 పెద్దతరగతుల మొక్కలకు బీజదళములలోని తేడాయే గాక ననేక
 మైన యితర తేడాలుగూడ కలవు. ద్వీదళపుమొక్క లన్నిటియందును
 ప్రధానమైన వేరు బలన త్తరమైనది, మొదలునుండి సహజంగా
 భూమిలోనికి దిగిపోవును. దీనినుండి యనేక శాఖోపశాఖలు వుట్టి
 పరిసరముల నున్న నేల నాక్రమించును. వేళ్ళసంపత్తి (Root
 system) కంతయు జననహేతువు శిశుమొక్కలోనున్న వేరుకొన. ఇది
 యంకురచ్ఛదము (Germination) లగాయలు మొక్క పెద్ద వృక్ష
 మగునంతవరకు నెప్పుడు నాగిపోక, చావక, యెదుగుచునేయుండి చివ
 రకు పెద్ద ప్రధానవేరుగా తయారగుచున్నది. ఏకదళబీజపుమొక్కలలో
 నట్లుగాక, విత్తనములనుండి మొలకలు వచ్చునప్పుడు వేరు కొన
 (Radicle) కొంతవరకు నెదిగి తరువాత ఆగిపోవును. వెంటనే మొదలు
 నుండి యనేక వీచువేళ్ళు ఉత్పత్తియై సమానముగా నెదుగును.
 సమానముగా దారములవలె నొకచో వుట్టి పెరుగుటచేత నివి వీచు
 వలె కన్పించును. అందుచేత వీటిని వీచువేళ్ళు (Fibrous roots)

అందును. మొక్కశిశువు వేరుకొన నూగిపోయినతరువాత ఆ గంతుక ముగా నీ వేళ్ళు ఉదయించుచున్నవి. కావున, నీటిని నాగంతుకపు వేళ్ళు (Adventitious roots, అనికూడ వాడుకచేయుదురు. నీకడభీజపు మొక్కలన్నిటను నీ యాగంతుకపు వేళ్ళు సంపత్తియే యుండును. ఒక ప్రధానమైన నేరుండదు. అంతియగాక మొదటితరగతి మొక్కలు నయస్సు ననుసరించి పొడవుగాను, లావుగానుకూడ నెదుపరుండును. రెండవతరగతివి పొడుగు మెదుగుటేగాని కాండమును లావుగా పెంచుకొనుటకు వానకాశములేనిదై యుండును.

అనుదినానుభవములో చూచుచునే యుండును. కొబ్బరి, తాడి, తొన్నచెట్లు నారంభములో నెంతలావుగలనో అంత్యమునకు సంతే లావుగలవై యుండును. గడ్డిచాతులు, చెరకు మొదలైనవిన్నియు నింతే. ద్విదళభీజల కుదాహరణములైన రావి, మట్టి, మామిడి, వేస, చింత మొదలైన మొక్కలు పొడవుతో రాటు లావుకూడ నెదుగు చుండును. ఈ రెండు తరగతులకు ప్రధానమైన దింకొక తేడాగలదు. అది ఆకులలోని నరముల పొందిక. ద్విదళభీజపు మొక్కలన్నిటి యందును, నరములు నల మాదిరిగా నల్లబడియుండును. ఏకపథుల యందు నరము లన్నియు సమానాంతర సరళరేఖలుగా నుండును. అందుచే నీ రెండు తరగతులను గింజలనుబట్టియేగాక, స్థూలదృష్టిచేత కూడ విడివిడిగా గుర్తింపవచ్చును. నీకడభీజపు మొక్కలే పరిణా మాధిక్యము గలనని కొంతరు శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయమై యున్నది. ఈ విషయమును సూక్ష్మ యనేక వాదోపవాదము లున్నవి. ఆకర్షణ పత్రముల పొందికనుబట్టి యీ తరగతులను రెండేసి యంతిర్భాగములుగా జేసిరి. కీతాఫలము, మందార, చిక్కడు, వామింట మొదలైనవాటిపువ్వులలో నాకర్షణ పత్రములు విడివిడిగా నుండును. ఉమ్మెత్త, పున్నాగ, చిలగడదుంప, కాశీరత్నము మొదలైన పువ్వులలోని యాకర్షణ

పత్రములన్నియు నేకమై యొకగొట్టముగా నుండును. అందుచేత మొదటి తరగతి, ప్రత్యేకరక్షక పత్రములు (Polypetalae), రెండవ సంయుక్తరక్షణ పత్రములు, (Gamopetale) నను రెండు తరగతులుగా శ్రేణి. వీటిలో మొదటితరగతి మొక్కలు ప్రాచీనములు, (Primitive plants), రెండవతరగతివి నవీనములు (Advanced) అని భావించుచున్నారు. మొదటితరగతి మొక్కలు పరిణామము నొందుట వలన రెండవతరగతివి యుదయించినట్లు తెలియుచున్నది. ఈ మొక్కలను సరియైన వర్గీకరణము చేయుటకు పరిణామ సిద్ధాంతమే యాధారము. కొన్ని గుణములు ప్రాచీనములనియును, మరికొన్ని గుణములు నవీనములనియును ముందుగా స్థిరపఱచుకొని, అన్ని గుణములు ప్రాచీనములుగా నున్న మొక్కలను క్రింది సరిహద్దుగా నుంచుకొని, నవీనగుణముల కలిపినిబట్టి పరిణామాధిక్యత నిచ్చుచు, సర్వగుణములు నవీనములుగా నున్న మొక్కల నాఖరియంతస్థునం దుంచుచున్నారు. ప్రాచీన, నవీన గుణముల పట్టికలో మొక్కలను పరిశీలించిన యీ విషయము సులువుగా బోధపడును. ప్రాచీనగుణములు: 1. పెద్దచెట్టుగా నుండుట 2. పువ్వులలోని భాగములు రక్షక, ఆకర్షణపత్రములు కేసరములు, అండాశయభాగములు, వాటియందు గింజలు, ఇవన్ని ఒక్కొక్కతరగతి ఎక్కువసంఖ్యగల్గియుండుట, 3. రక్షకపత్రములు ప్రత్యేకముగా, విడివిడిగా నుండుట 4. కేసరము లసంఖ్యాకములుగా నుండుట 5. అండాశయము నందు భాగము లెక్కుడుండుట 6. అవి కలసియుండక విడివిడిగా నుండుట, 7. అండాశయము అప్రధానాంగము (Non-essential organs) లైన, రక్షక, ఆకర్షణ పత్రములకు పై నుండుట 8. అండాశయము (carpel) నందనేకలేగింజ (ovules) లుండుట 9. పరాగ సంపర్కసంఘటనకు యేర్పాట్లేమియు లేకుండుట 10. బోసనహితములైన బీజముల నుత్పత్తిచేయుట పై గుణములు పదింటికిని వ్యతిరేక

గుణములు నవీనములుగా నెంచుచున్నారు. ఉదాహరణకు సరి హద్దులోని చంపకవృక్షమును తీసుకొందము. ఇది యొక పెద్దనృక్షము. పువ్వులయం దసంఖ్యాకములైన రక్షక, ఆకర్షణ పత్రములు గలవు. అవన్నియు విడివిడిగా నుండును. కేసరము లసంఖ్యాకములుగా నున్నవి. అండమునం (ovary) దనేక అండాశయములు (carpels) గలవు. ఇవన్నియు కూడి యొకటిగాలేక విడివిడిగానున్నవి. పరాగసంపర్కమును కలుగజేయుట కే యేర్పాట్లను పువ్వునందులేవు. గింజలయందు బోసమున్నది. అందుచేత దీనిని ప్రాచీనపు మొక్కగా భావించుచున్నారు. నవీనమున కుదాహరణగా గడ్డిచేమంతి మొక్కను (*Tridaxprocumbens*) తీసుకొందము. ఇది నేలమీద ప్రాకెడి బహుచిన్న మొక్క. వానలు ప్రారంభించగానే విత్తనములనుండి యంకురించి వర్షకాలములోను, శీతకాలములోను బాగుగా బెరిగి వేసవినచ్చు సరికి పూలుపూచి, కాయలను తయారుచేసి యెండలు ముదిచేసరికి చనిపోవుచున్నది. ఎండకాలమంతయు దీనికాయలు గాలిలోనెరిగి బాగుగా వ్యాప్తిజెందును. ఇది యొక సంవత్సరములో తన జీవితచక్రమును ముగించుకొనుటయేగాక, నీరుగలకాలములో కాయమును పెంచి, నీరు లేనికాలమున కాయమును తగ్గించుకొని (అనగా నశించిపోయి) విత్తన రూపములో నివసించుచున్నది. అందువలన దీర్ఘకాలము జీవించు చెట్లకుగల నీరులేమి, ఎండ వేడిమిబాధలు 'దీనికిలేవు. వ్యాప్తిజెందుటలో నన్నిటికంటె నిది ముందంజ వేయుచున్నది. ఎక్కడ చూచిన నీమొక్కయే కన్పించుచుండును. ఈ యంశమునుబట్టి యిది పరిణామోన్నతమైనదిగాను, నవీనమైనదిగాను భావించుచున్నారు. పువ్వుల విషయ మాలోచించినచో చిన్నచిన్న పువ్వులనేకములు కలసి యొక గుచ్చము (Inflorescence)గా నేర్పడుచున్నవి. ఒక్కొక్క చిన్న పువ్వునందు రక్షకపత్రములస్థానే నన్నని రోమములగుది యున్నది. ఆకర్షణ

పత్రములు అయిదు. అవన్నియు కలసి యొకగొట్టముగా నేర్పడి యున్నవి. కేసరములు అయిదు మాత్రమే. అవిగూడ యొకదాని కొకటి యతుకుకొని గొట్టముగా నేర్పడియున్నవి. అండమునందు భాగములు రేవు. అం దొక్కటియే లేగింబ. ఈ అండము రక్షక, ఆకర్షకపత్రములకు క్రింద నున్నది. పరాగసంపర్కమునకు యేర్పాట్లు గలవు. విత్తనములయందు బోనములేదు. సర్వగుణములు నవీనములుగా నుండుటచేత నది పరిణామ కొలబద్ధకు నన్నిటికంటె పై మెట్టున నున్నది. ఈ రెండుహద్దులకు మధ్యకముగా నున్నవి మందార, చిక్కుడు, ఉమ్మెత్త మొదలైనవి. మొక్కలయందలి గుణములు పరిశీలించి వాటిని స్పెషీస్ (Species) గాను, జెనెరా (Genera) గాను, ఫేమిలీసు (Families) గాను, ఆర్డర్సుగాను, కోహార్డుగాను, తరగతులుగాను వర్గీకరణము (Systematise) చేసియున్నారు. వీటి క్రమణిక యుదాహరణమూలమున విశదము కాగలదు. మందార మొక్కకు హైబిస్కస్, రోజాసై నెన్సిసిస్ అని నామకరణము చేసిరి. మొదటిపేరు హైబిస్కస్ జీనస్సును తెలుపును. రోజాసై నెన్సిస్ స్పెషీసును తెలుపును. ఈ స్పెషీసునందు ఎఱ్ఱమందార, వచ్చ మందార, తెల్లమందార, మరి ఇతరరంగుల మందారలన్నియు నున్నవి. వాటికన్నిటికిని నీ పేరు నర్తించుచున్నది. ఎందుచేతననగా, ఈ మొక్కలన్నియు తమలోతాము పరాగసంపర్కమును పొంది విత్తనములు తయారుచేయగలవు. బెండమొక్కను హైబిస్కస్, ఎస్కులెంటిస్ అంటారు. మందారకు, బెండకు ఇంటిపేరు ఒక్కటియే. పేర్లు నూత్రము తేడాగా నున్నవి. దానికి కారణము బెండపువ్వుల కేసర గులలోని పరాగము మందారపువ్వుల కీలాగ్రములమీద పేట్టిన నది సంపర్కము నొందజాలదు. అందువలన విత్తనములు తయారుకావు, ఆ కారణమున స్పెషీసును నిర్ణయించుటకు పరస్పర పరాగసంపర్క-

సావకాశము (Inter crossability) ను కొలబద్ధగా తీసికొనియున్నారు. ప్రధానగుణములు రెంటికి సన్నిహితముగా నుండుటచేత నీ రెండు మొక్కలను ఒకే జీనస్సునం దుంచినారు. ప్రధానగుణముల తేడాలను బట్టి జీనసు పేరు మారుచుండును. కొన్ని సమానగుణములు గల జెనిరాను కలిపి యొక కుటుంబమని చెప్పియున్నారు. మందార (Hibiscus), ప్రత్తి (Cossy pium), గంగరావి (Thesbasia), తుత్తురుజెండ (Abutilon) మొదలైన మొక్కలు అనేక తేడాలు కలిగినవైనను, వాటన్నిటియందు కొన్ని సమానగుణము లుండుటచేత నవి యొక కుటుంబము (Malvauae family కు జెందియున్నవి. ఇటువంటి కుటుంబములు ద్విదళబీజులలో 240 ని ఏకదళబీజులలో 40 ని గుర్తించియున్నారు. వీటినిన్నిటిని వైన వివరించిన పరిణామ మనే కొలబద్ధ సహాయముతో నొకటితరువాత మరొకటి యమర్చి యున్నారు.

సాధారణముగా పూలమొక్కలు హరితస్రమును కలిగియుండుటచే గాలిలోగల బొగ్గుపులుసువాయువును లాగుకొని సూర్యరశ్మి సహాయమున కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిగించుకొని, చక్కెర, పండిపదార్థములను తయారుచేసుకొనుచుండును. గూకోజు అను చక్కెరఅణువునందు ఆరు బొగ్గు పరమాణువులు, పండ్రెండు హైడ్రోజను పరమాణువులు, ఆరు ప్రాణవాయువు పరమాణువులు ఉన్నవి. ఆకులు సులభముగా తయారుచేయగల్గిన చక్కెర ఇదియే. ఆరు నీటియణువులు, ఆరు బొగ్గుపులుసువాయువు అణువులు పరస్పరమిశ్రమమును జెంది, ఒక గ్లూకోజు అణువును, ఆరు ప్రాణవాయువు అణువులు తయారగుచున్నవి. ఈ విధమైన సంఘటన కృత్రిమముగా మన మెవ్విధమున కలుగజేయలేము. ఆకులలో హరితస్ర సహాయమున నిది సులువుగా జరుగుచున్నది. ఈ విధమున తమకు కావలసిన యాహారమును స్వంత

ముగా తయారుచేసుకొన గల్గినవి స్వతంత్రజీవులు. ఆహార నిర్మాణ మివిధముగ జేసుకొనలేక అస్వతంత్రముగా జీవించు మొక్కలుకూడ గలవు. అందొక తరగతి పరాధీనులు (Parasites) 2. కీటకాశనులు (Insectivorous), లేక మాంసాహారులు (carnivorous plants) 3. శిథిల పదార్థాశనులు (Saprophytes).

1. పరాధీనులు (Parasites) : బదనికలు (Loranthus and Viscum), పొగాకుమల్లె, (orbanche), జొన్నమల్లె (Striga), మంచి గంధపుచెట్టు మొదలైనవి పరాధీనులు - ఇవన్నియు సహజమున పెరుగుచున్న యితర చెట్ల కొమ్మలయందుగాని వేళ్ళయందుగాని, తమవేళ్ళను జొనిపి వాటి యాహారమును బీల్చుకొని జీవించుచుండును.

2. కీటకాశనులు (Insectivorous plants) యుట్రిక్యులేరియా (Utricularia) (94 ప.), డ్రోసిరా (Drosera) (95 ప.), నిపెంతెస్ (Nepenthes) (96 ప.), డయోనియా (Dioniae) (97 ప.) మొదలైన మొక్కలు చిన్నచిన్న కీటకములను పట్టుకొని సంహరించి వాటిని అరిగించుకొని జీవించుచున్నవి. యుట్రిక్యులేరియా యను మొక్క చెరువులలో నుండును. ఇది యాకువచ్చని దారములవలె వ్రేలాడు ఆకులు, సన్నని తాండము గల మొక్కనాచు లున్నట్లుగా కన్పించును. దీని యాకుతునుకలు కొన్ని సంచులవలె మారును. ప్రతి సంచికిని యొకద్వారము, దానిని బంధించుట కొక కవాటము ఉండును (94 వ పటము). కవాటము నంటి బయటకు వ్రేలాడుచు, స్పర్శజ్ఞానము గల రోమము లుండును. నీటిలో నీలాడు చిన్న చిన్న కీటకములు రోమములకు తగిలినప్పుడు సంచి హఠాత్తుగా పెద్దదిగా వ్యాకోచించును (Expands) . అందువలన లోపల ఖాళీ యేర్పడి బయటనున్న నీరు ఒత్తిడికి కవాటములోనికి గెంటబడి సంచిలోనికి జొచ్చును. నీటి ప్రవాహముతోచాటు చిన్న కీటకములు గూడ

అందు ప్రవేశించి వెంటనే కవాటము బంధింపబడుటచేత బయటకు పోలేక సంచి అందు చిక్కుకొనును. అంతట సంచిలో జీర్ణరసములు స్రవించి, యీ కీటకముల శరీరమందు గల మాంసమును జీర్ణించు కొనును.

డ్రోసెరా (Drosera) : (95 వ పటము) ఇది బురదనేలలో పెరుగు చిన్న మొక్క. డ్రోసెరా కొంపిఫోలియా యనునది చంచాలవంటి యాకులు గల యొర్రని మొక్క. ఇది సుమారు రెండంగుళముల వరకు బెరుగును. ఆకులమీద కొనలయందు విషబిందువులు గలిగిన రోమము లుండును. చిన్న చిన్న కీటకములు యెగురుచు నీ యాకులమీద వ్రాలినప్పుడు రోమము లన్నియు వానిమీదకు వంచి, విషము పెదజల్లి చంపి జీర్ణ రసముల ద్వారా వాని నరిగించు కొనును.

నిపెంతస్ (Nepenthes) : (96 వ పటము) ఇది రెండుమాడు గజముల యెత్తు వరకు పెరుగు పెద్ద మొక్క. జావా, బోర్నియో దీవులందు గల యడవులలోను, అస్సాము దేశపు అరణ్యములలోను ఇది పెరుగును.

ఈ మొక్కయందు ప్రతియాకు యొక పొడవైన పెద్ద సంచినలే తయారగును. తరువాత కాడ సాగి యాకుపచ్చని యాకువంటి యవ యవమును ప్రవృద్ధము చేయును. దాని మూలమున మామూలు స్వతంత్ర జీవనము సాగించుకొనుచుండును. సంచులనలన యీగ, దోమ, అంతకంటె కొంచెము పెద్దకీటకములనుగూడ నట్టి యరిగించుకొన గలదు. సంచులు 6 అంగుళముల పొడవు, అంగుళము పెడల్పు గల్గి యుండును. సంచిలోపల జీర్ణద్రవములూరి క్రింది భాగమున నిల్చు యుండును. మూతయాకునందుగల రంగుమచ్చలచేత చిన్నకీటకము



కిటకములను పట్టు సంచులు



పట్టుబడిన సూక్ష్మకణి కిటకములను బట్టు గొర్రె

94 ప పటము :

యుట్రిక్యులేరియా (Utricularia)



వట్టుబడిన కిటకము

95 ప పటము :

డ్రోసెరా (Drosera)



96 వ పటము :
నిపెంతస్ (Nepenthes)



97 వ పటము :
డయోనియా (Dioneae)

లాకర్నింపబడి తేనె దొరకగలదను యాశతో సంచితో ప్రవేశించును, లోపల తేనెలేక పోవుటను తెలుసుకొని వెనకకుమళ్ళిన కీటకములు బలవత్తురములై క్రింది వైపుకువంగిన రోమసంతతి కలుగజేయు నాటంకము వలన తిరిగి బయటబడలేక, యచ్చటనే కొంతసేపు వెనుగులాడి చివరకు క్రిందనున్న జీర్ణరసపు నూతిలోఁబడి మరణించును. మొక్కవాటి యందుగల మాంసమును జీర్ణముచేసుకొనును.

3. డయోనియా (Dioneae) : ఇది పెద్దపెద్ద మాకులుగల్గి హిమ వత్పర్వతముల మీద నుండు మొక్క.

వీటియాకులమీద యిరువైపులను మూడేసి బలమైన రోమములుండును. స్పర్శజ్ఞాన మధికముగా గలదు. చిన్న కీటకము లీయాకుల మీద వ్రాలినప్పు డవి యీ రోమములకు తగిలినచో నెంటనే మాకు మధ్యకు నిలువుగా ముడుచుకొనును. కీటకము లామధ్య యిరుకుకొని చనిపోవును. మొక్కనాటి శరీరములను జీర్ణించుకొనును. ఈ విధముగా యనేకములగు మొక్కలు మాంసాహారమునకుగూడ నలవాటు పడినవి.

4. శిథిలపదార్థాశనులు (Saprophyts) : పెంటలమీద బయలుదేరు కుక్కగొడుగు లీ ప్రకారముగా జీవించును. కుళ్ళి శిథిలమై పోవుచున్న జీవపదార్థము నిది గ్రహించి దానివలన బ్రదుకును. నిరంతరము చీకటిగ నుండు యరణ్యములలో బెరుగు మోనోట్రోపా (Monotropia) అను పూలమొక్కగూడ నీ విధముననే జీవించును.

పూలమొక్కలు ఆవగింజలంత వుల్ఫియా అను మొక్కలగాయతు పెద్దప్రామానులవరకు నున్నవి. శరీర విస్తారత వీటియందెక్కువగా కన్పించుచున్నది. అష్టేలియాలోనుండు యూకలిప్టస్ ఏమిగ్గలైనా యను చెట్టు 850 మీటర్ల యెత్తువరకు నెడుగును. ఇది అన్నిటికంటెను యెత్తుగా పేరిగెడిమొక్క. పరిమాణములో వుల్ఫియామొక్కకంటె

చిన్నదిలేదు. వీటిజీవితకాలము చిన్నచిన్న మూలికలలో మూడు మాసములు లగాయతు ఉండును. కొన్ని పెద్దచెట్లు నూరు సంవత్సరములు లగాయతు 4, 5 వందల సంవత్సరములవరకు జీవించును.

వీటియం దింద్రియములన్నియు హీనబలముగల్గి యున్నవి. కొమ్మలన్నియు నూర్ధ్వముగాను, వేళ్ళన్నియు సభోముఖముగా నెదుగుచుండును. చీకటిలో కొన్ని మొక్కలను పెంచుచు నేదోయొక మూల వెలుతురు వచ్చుటకు కంతనుంచినయెడల మొక్కలన్నియు నాకంతవైపు ఎదుగును. అందుచేత జ్ఞానేంద్రియము కొలదిగా నున్నదని చెప్పకతప్పదు. ఒకమొక్కను చెరువువొడ్డున పాతినచో, దానివేళ్ళన్నియు జలాశయము వైపుకే ప్రాకును. కొన్ని మొక్కలయందు స్పర్శేంద్రియ మద్భుతముగా వృద్ధిబొందియున్నది. జీలుగ బెండు, మొక్క, నిద్రభంగి మొదలైనవి మనము ముట్టుకొనుట తడవుగా తమయాకులను ముడుచుకొనును. మరల మామూలుపరిస్థితి వచ్చుటకు 10 నిమిషములు పట్టును. శ్రవణేంద్రియము, జీవేంద్రియము వీటియం దున్నట్లు గోచరించుటలేదు. తగుమాత్రముగా నాత్మరక్షణచేసుకొనగల్గి యుండుట తనకు కావలసిన వాటికొరక స్వేషించుట మొక్కలయందు కలదుగావున ఆత్మరక్షణ జ్ఞానమునకు మూలాధారమైన మనోయింద్రియ ముండియుండవచ్చునని తోచుచున్నది. కాని యదియున్నట్లు బాహ్యనిదర్శనము లేవియు కనవడని కారణమున సంశయాస్పదముగా నున్నది.

పాలిచ్చు జంతువులు :—

ఇవి సీనోజోయిక్ మహాయుగమునందావిర్భవించి వేగముగా పరిణామోన్నతము పొందినవని చెప్పవలసియున్నది. రెప్పెల్లునం దొక

శాఖనుండి యివి బయల్పడిననని చాలమంది శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయమై యున్నది. చాలిచ్చు జంతువులయందు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణము లేర్పడియున్నవి. ఈ లక్షణములసలన వీటిని యితర జంతువుల నుండి యేగాక ప్రస్తుతము నివసించుచున్న రైప్టైలునుండి గూడ గుర్తింపవచ్చును. రైప్టైలులో సరిపోల్చినచో వీటియం దీ క్రింది ప్రత్యేక లక్షణములు కన్పించుచున్నవి.

1. వీటి పై చర్మమున రోమము లుండటం. రైప్టైలులో రోమముల స్థానే పెచ్చులుండటం. పరిణామ ప్రవాహములో నివి యన్నిటి యందును అదృశ్యమై పోయినను, ఎలుకకు తోకచినర నికను కొన్ని కన్పించుచుండుట.

2. గుండెకాయను, ఊపిరితిత్తులను వేరుచేయు డయాఫ్రమ్ అను పొరయుండుట చాలిచ్చు జంతువులయందెల్ల ప్రత్యేక లక్షణము.

3. మిగత జంతువులలో నున్న 8 ఎముకలు వీటి చెవులలో, వెలుపలి, మధ్య, లోపలి చెవులుగా వృద్ధిబొందుట.

4. క్రిందిపెదవి దగ్గర నుండి యెముక దంతచట్రముగా మారుట.

5. హృదయకుహరము పూర్తిగా నాల్గుగదులుగా విభజింపబడుట. (కుడి, యెడమ కర్ణికలు, కుడి, యెడమ జతరికలు)

6. శిశువులు జన్మించిన తరువాత తల్లి వాటిని చనుబాలతో కొంత కాలము పోషించుట. ఈ లక్షణ మిక నేతరగతి జంతువులలోను లేదు. రైప్టైలుకు, ప్రథమమున నుండు చాలిచ్చు జంతువులకు మధ్యరకపు జంతువులన్నియు నిప్పు డేవియు నివసించియుండుట లేదు. ఫోసిల్సును పరిశీలించిన చాల నిదర్శనములు కన్పించుచున్నవి. కొన్నికొట్ల సంవ

త్వరముల క్రిందట నివి నివసించి యంతరించి పోయినవి. ఇప్పుడు నిన
 సించియున్న వాటిలో మధ్యరకముగా కన్పించుచున్నవి 'ప్రోటో
 తిరియా' (Prototheria) తరగతికి జెందినవి. వీటియందు పాలిచ్చు
 జంతువులకునలె వోమములు, హృదయమునద్ద డయాఫ్రమ్ మొన
 లైనవి కల్గియున్నను, ఇవి యింకను గ్రుడ్లు పెట్టు నలవాటుపోకయున్నవి.
 స్తవ్యమందు వాలుతయారగుచుండునుగాని కడుపుటకు స్తనముల బొడి
 పెలులేవు. వీర్యకోశము, సిండకోశము, మూత్రపుత్తి మొదలైనవన్నియు
 రెట్టెలుకన్నట్లు లున్నవిగాని పాలిచ్చు జంతువుల కుండవలసినట్లు
 లేవు. ఇందు కుదాహరణముగా 98 వ పటములో కనపరిచిన
 డక్ బిల్ (Duck-Bill) అను జంతువును తీసుకొనవచ్చును. ఇది
 ఆస్ట్రేలియాచుండుండు చెరువుగట్ల మీద బోరియలు చేసుకొని
 వాటిలో నినసించును. ఈ తరగతికి జెందిన స్పెయిన్ వీల్ ఈటర్
 (Spainy Antieater) మరొకటి. వీటికంటె కొంచెము పరి
 గామాధిక్యము గలవి, మిగత పాలిచ్చు జంతువులకు బహు సన్ని
 హితముగానున్నవి 'కీటకాశనులు' (Insectivora). ఉదాహరణగా
 టిలోసర్కసు ప 99 లోనివి తీసుకొనవచ్చును. ఇది ఉడుత వంటి
 జంతువు. ఇది చెట్టు కొమ్మలమీద నెగురుచు కాలము గడుపును.
 కీటకములను మ్రింగి పొట్ట పోషించుకొనుచుండును. డక్ బిల్లునలె గాక
 నిది పిల్లనే ప్రసవించును. ఈ తరగతి జంతువులనుండి పరిణామ
 మనేక శాఖోపశాఖలుగా నారోహణము పొందెను. శరీరవిస్తారత,
 శత్రువులను ప్రతిఘటించు శక్తి, మెదడుయొక్క యభివృద్ధి, ఆత్మరక్షణ,
 మెనుకకాళ్ళమీద నిలువుగా నిలబడగలశక్తి మొదలైనయంశములు
 తమ ఆశయములుగా నుంచుకొని జంతువులు పరిణామ మార్గము నారో
 హించినవి. ఒక్కొక్క మార్గము ననుసరించిన జంతువు లొక్కొక్క



98 వ పటము :

డక్ బిల్ (Duck-Bill)




99 వ పటము :

టిలోసర్కస్ (Ptilocercus)




100 వ పటము :

విడున్నరకొట్ల సంపత్సరముల క్రితం జంతువు (Barylambda)




101 వ పటము :

ఆరుకొట్ల సంపత్సరముల క్రితం జంతువు (Uintatherium)




102 వ పటము :

నాలుకొట్ల సంపత్సరముల క్రితం జంతువు (Syndyoceras)




103 ప పటము :

మూడుకొట్ట సంవత్సరముల క్రితం జంతువు (Brentops)



104 ప పటము :

కోటి సంవత్సరముల క్రితం ఏనుగు (Amebelodon)



105 వ పటము :

పదిలక్షల సంవత్సరములక్రితం ఏనుగు 'మెమిథ్' (Wolly Mammoth)

మాదిరిగా నున్నత ఘోషిని బొందినవి. ఒక శాఖ యేనుగులుగా చూరినది. మరొక శాఖ నేనుగు ఒంటెల నుండియైన జేసినది.


ఏనుగుల పరిణామ శాఖలోని జంతువులన్నియు పటములందు గనుపచువబడినవి. వీటి క్రమమును జూచినచో పరిణామ సిద్ధాంతము సులువుగా బోధపడును. ఇందు మొదటిది గార్డెల్మ్బా (190 వ పటము చూడుడు.) ఈ జంతు మేనున్నక కోట్ల సంవత్సరములకు బూర్వముండెడిది. ఇది క్రమముగా యుయింటేటియము (101 వ పటము)గా పరిణామ మొందిన ట్లూపీంచుచున్నాడు. దీనినిగూడ 'సిండ్యో సిరాస్' (102 వ పటము చూడుడు) ఉదయించినది. దీనికి ముట్టె విూద కొద్దిపాటి భిన్నము సూచనగా గలదు. ఒక కోటి సంవత్సరములు గడచుసరికి 'బ్రాంటాపు' వంటి జంతువు (103 వ పటము చూడుడు) లుదయించినవి. వీటినుండి యనేక శాఖలు జన్మించినవి. అందు ముఖ్యమైనది యేనుగులశాఖ. మరి రెండు కోట్ల సంవత్సరములు గడచుసరికి ఏంచిలోడె (104 వ పటము) వంటి జంతువు లావిర్భవించినవి. ఇది యించుమించుగా నేనుగు మాదిరిగా నుండెను. క్రింది పెదవి చేటవలె విస్తరించి ఉన్నది. దంతములు సాగుటలేదు. ఇట్టి యేనుగులు పూర్వ రూపము సుమారొక కోటి సంవత్సరములకు బూర్వముండెడివి. అవి క్రమముగా పరిణామము నొంది 'మేమల్' లుదయించినవి. (105 వ పటము చూడుడు) 'మేమల్' లు యిప్పటి యేనుగులకు రెండు లగాయితు నాలుగు రెట్లనరకు పరిమాణములో పెద్దవి. శరీరమృతయు నొత్తుగా బొచ్చుగలిగి యుండెడివి. వీటి దంతము లిప్పటి యేనుగుల దంతములకు మూడు, నాలుగు రెట్ల పరిమాణములో నుండెడివి. పది లక్షల సంవత్సరములకు బూర్వము విరివిగా భూమిమీద నివి నివసించి క్రమముగా వీటి పరిమాణము తగ్గుచు వచ్చి ప్రస్తుతపు యేనుగు లుద్భవించినవి. ఇప్పటికిని వీటి దంతములు గనులయందు, కొన్నిచోట్ల

భూమ్యుపరిభాగమందు దొరకుచున్నవి. ప్రస్తుత మీజాతి భూమండలమున నివసించుటలేదు.

బ్రాజూపు (108 వ పటము చూడుడు) ల నుండి ఖడ్గమృగములు (106 వ పటము చూ.) గూడ జనించి యుండవచ్చునని యూహించుచున్నారు. అనవరతము పరిణామారోహణమేగాక, యనరోహణము (Regress) కూడ కలుగవచ్చును. అట్టి యనరోహణ మార్గమున టపీర్ (Tapir) (107 వ పటము చూడుడు) నంటి జంతువు లుచ్చ వించుటకు సావకాశ మున్నదని యూహించుచున్నారు.


ఒంటెల పరిణామశాఖగూడ నిల్లే క్రమమార్గమున నున్నది. అందు మొదటిది ట్రాక్టోనోడన్ (108 వ పటము) రెండవది ప్రొటెలోపస్ (109 వ పటము) మూడవది పోయెబ్రోక్సిరియమ్ (110 వ పటము) నాలుగవది ప్రోకేమిలస్ (111 వ పటము) అయిదవది మెగాకేమిలస్ (112 వ పటము) ఆరవది జైగాంటోకేమిలస్ (118 వ పటము). వది లక్షల సంవత్సరములకు పూర్వము జీవించుచుండెడి నీ జైగాంటోకేమిలస్ జంతువులనుండి పరిణామరీత్యా ప్రస్తుతము మనము చూచుచున్న ఒంటె లావిర్భవించినవి.

మెసోజోయిక్ యుగములోని యంతర్భాగమైన క్రిటేషన్ యుగమందు కీటకాశనుల (Insectivora) తరగతినుండి 'ప్రైమేట్లు' (Primates) తరగతి జంతువు లుదయించినట్లు తెలియుచున్నది. ప్రైమేట్లు మూడు శాఖలుగా నున్నవి: (1) లెమురోయిడియే (Lemuroidea) (2) టార్పియోయిడియే Tarsioida) (3) ఏంథ్రోపోయిడియే (Anthropoidea). వీటిలో లెమురోయిడియే జెందిన జంతువులు మిక్కిలి ప్రాచీనలక్షణములు కలిగియున్నవి. ఏంథ్రోపోయిడియే తరగతిలో నవీనలక్షణములు హెచ్చు. ఈ రెంటికి మధ్య స్థముగా నున్నది టార్పియోయిడియే.



106 వ పటము :

రైనోసెరాస్ జిప్షిన్యగము (Rhinoceros)




107 వ పటము :

టాపిర్ (Tapir)




111 వ పటము :

3 కోట్ల సంవత్సరముల క్రితం జంతువు (Procamelus)



113 వ పటము :

10 లక్షల సంవత్సరముల క్రితం జంతువు (Gigantocamelus)



115 ప పటము : Mandrillus

టార్సియస్ (Tarsius) అను జంతువు (114 వ పటము చూడండి) 1, 3 తరగతుల జంతువులను సమీకరణముచేయుటకు పుష్కరకముగా నున్నది. టార్సియస్ జంతువునుండి క్రమముగా మనుష్యరూపము వచ్చినదని కొందరి యభిప్రాయమై యున్నది. వీటి చేతుల వేళ్ళలో 2, 3 వేళ్ళు చివర రెండుగా భాగింపబడినవి. టిబెటా, టబూ యను నవి కలసిపోయినవి. రాత్రి సంచారమునకు వీలుగా నుండుటకు కళ్ళు పెద్దవిగా పెరిగినవి. వై కారణములనుబట్టి నేరుగా ఈ తరగతి జంతువులనుండి మనుష్యులు వచ్చుటకు సావకాశములు తక్కువగా కన్పించుచున్నవి.

ప్రైమేట్సు తరగతిలో ఎంతోపోయిడియే శాఖ యున్నతగాన మలకరించుచున్నది. వీటిలో మెద డ్డున్నతస్థితికి వచ్చియున్నది. కళ్ళు రెండును దగ్గరకు జరుపడినవి. ఈ శాఖయందు ముక్కురంధ్రములు గుండ్రముగా నంచుకట్టుతో నిర్మింపబడినవి. క్రొత్త ప్రపంచము కోతు లలో రెండు కుటుంబములు గుర్తింపబడినవి. మొదటిది హేపాలిడియే (Hapalidae); రెండవది సిబిడియే. మొదటితరగతి కోతులందు ప్రవేశించిన గ్రద్దగోరులవంటి గోళ్ళుండును. ఆ కారణమున వీటిని ప్రాచీనములుగా భావించుచున్నారు. ఇవి యుడతలంత చిన్న పరిమాణముగల కోతులు. రెండవ కుటుంబములో ఉడతకోతులు (Pithecia), సాలీడుకోతులు (Aletes spider Monkeys), మైసిటెస్ (Mycetes) మొదలైనవి యున్నవి. లంగూరు (Langurs) లు, ఏవుల (Apes) యందు తప్ప మిగత కోతులన్నిటిలోను దవడలకు సంచు లుండును.


పడమటి ఆఫ్రికాలో కుక్కముఖము గల కోతు లున్నవి. వీటిని మెండ్రిల్లస్ (115 వ పటము చూడుడు) అందురు.

సాత్రప్రపంచపు కోతులలో మూడు కుటుంబము లున్నవి. ఇందు మూడవకుటుంబము హోమిడియే (Homidae). దీనియందు

పూర్వయుగములో నివసించి యంతరించిపోయిన జెనెరా (Genera) మూడును, ప్రస్తుత మిప్పుడు నివసించియున్న జీనస్సు ఒకటియును గలవు. పిథెకేంథ్రోపస్ (Pithecanthropus), సైనేంథ్రోపస్ (Sinanthropus), యియేంథ్రోపస్ (Eoanthropus) అనునవి యంతరించి పోయినవి. హోమో (Homo) యను జీనస్సు ప్రస్తుతము నివసించుచున్నది. మనుష్యు డీ హోమో జీనస్సుకు చెంది యున్నాడు. గొరిల్లా (118, 119 వ పటములు చూడుడు) మనుష్యుడు, ఛింపంజీ (117వ పటము చూడుడు), జీరెంగు (116వ పటము చూడుడు). యీ జీనస్సులోని వివిధస్థిమీను. వీటియందుకొన్ని సమత్వాంశములు కన్పించుచున్నవి. మొండెమునందుగల వెన్నుపూసలు పందొమ్మిది. మనుష్యుడు, గొరిల్లా, ఛింపంజీలలో పదిహేడుమాత్రమే యున్నవి. జీరెంగులో పదునారు గలవు. వెన్నెముకచివర నిర్భకముకా మిగిలిన వెన్నుపూసలు నాలుగు. మిగత జంతువులయం దన్నిటికంటెను, మానవునివలె చాల విశిష్టతను బొందియున్నది. అన్ని జంతువులతో కంటె నిది పెద్దదిగానుండుట ముఖ్య విషయము. దీనిలోపలి ఘనపరిమాణము 1500 ఘనసెంటిమీటర్లు. గొరిల్లాకు 410 సెంటీ మీటర్లుమాత్రమే. సెరిబ్రల్ హిమఫియర్ను ఉన్నచోట యెక్కువగా నభివృద్ధి పొందినది. ప్రైమేట్సు తరగతిలోని ఇతర జంతువుల కింతగా పెరిగి యుండలేదు. ఎముకలు వాటి యక్షముమీద మెలితిరుగుట ఈ జాతికోతులలోను, మనుష్యులలోను వేరొక విశిష్ట లక్షణము. మిగత జంతువులలో నీ సన్నివేశములేదు. వీటియందు జరిగిన పరిణామము 120వ. బొమ్మలలోని పురైలయాకారములను బట్టి నులు పుగాగ్రహింపనగును. నాలుగుకాళ్ళమీద నిలచి యడ్డముగానడచుట కలవాటుపడిన జంతుజాలము క్రమముగా వెనుకటి రెండుకాళ్ళమీద నిలచి నడచుటకు ప్రయత్నించినవి. స్పింటర్ మజిల్ ప్రవృద్ధమైనచో



116 వ జంతు :
Orang - Utan



117 వ జంతు :
చింపాంజీ (Chimpanzee)

నట్లు నిలువన నీలచుటకు గానకాశము కల్గుచున్నది. అట్టి స్థితిలో కండరము మనుష్యునిలో మునుపటిచేత, పక్షిపాసి కర్ణికలో నీలచి నడచుటకు పునఃకర్ణికకు గానకాశము కల్గుచున్నది. మనుష్యుని కండరములలో విశిష్టతగలవి పిరలు. ఇవి షరీర దేవే యితర జంతువుల లోను నింతగా పభివృద్ధి జేడలేదు. మనుష్యుని వరకు రక్తనాసీ మండలములే సోవానములద్వారా పరిణామము బొందినదియు, రక్త మండల పరిణామమును 121వ పటము చూచి గ్రహింపవచ్చును.

చేపలకు వైవస్కెలోస్సు, జరణిక (ventricle, కర్ణిక auricle) ఒకదానిపై న యొకటి నడుచు నున్నవి. ఈ విధమైన రక్తమండలము గిల్లు నలన రక్తపారిశుధ్యమును పొందే చేపలకు తగియున్నది. గిల్లు నీటిజంతువుల యందే యుపయోగించును గాని మొట్టజంతువులలో పనిచేయవు. జంతువులు నీట జీవించు నలవాటు తప్పించుకొననలెనన్న నీ గిల్లును ముందుగా నూపిరితిత్తులుగా మాఱు చేసుకొనవలసి యున్నది. ఊపిరితిత్తులు నిర్మాణము కాగానే కప్పలో హృదయకుహరముండు గూడ మాఱులు కావలసి వచ్చినది. అందు చేత నొక జరణిక, రెండు కర్ణికలు పుట్టినవి. ఈ రెండు కర్ణికలలోని రక్తము ఒకే జరణికలో పడుటచేత శుద్ధ, అపరిశుద్ధ రక్తములు కలియుటకు సావకాశము కలుగుచున్నది. మిశ్రమరక్తము శరీర ములో ప్రవహించుటచేత కప్పలు పరిసరముల ఉష్ణమును కలిగి యుండుటేగాక చురుకుతనము తక్కువగల జంతువులు గూడనై యున్నవి. పరిణామమార్గము రెవైట్సు వరకు నారోపించునరికి, జరణికగూడ రెండు భాగములుగా నొక పోరచేత విభజింపబడినది. ఈ రెండును రెండు ప్రత్యేకగొట్టములద్వారా బహిర్గత మగుటచేత నపరిశుద్ధ రక్తము కుడిజరణికలో పడి యుచటనుండి యూపిరితిత్తులలోనికి పంపబడు

చున్నది. ఊపిరితిల్లులలో పరిశుష్ణమైన గ్రామము ఎవ్వరి జనరికలో పడి యచటనుండి మిగతశరీరాలయనములకు సంబంధించుచున్నది. ఇట్టి పరిశుష్ణి యేర్పడినప్పుడు చెప్ప, మంచి గ్రామములు కలయుటకు నావ కాళము లేదు. శరీరాంగము లెల్లప్పుడును మంచి గ్రామము చేతనే గుంతుప్తి చేయబడుచున్నవి. పుష్కల్యులోనే కలిగిన యీ మంచి మార్పు వాటికంటె నున్నతజీవులైన పక్షులు నాటిప్పుడంబువులకు చేకొనబడినది.

నాడీమండల పరిశాప మిగతకంటె క్రమంగా హిమము కలిగియున్నది కప్ప మెదడులోని భాగములైన 1. ఆల్ ఫెక్ట్యుగోస్సు, 2. సెరి బ్రల్ హెమిస్ఫియస్సు, 3. ఆప్టికోలోస్సు, 4. సెరిబెల్లము, 5. మెడల్లా యనునవి యేమియు పూర్ణుచెందక వృద్ధిబొందినవి. (పటము 122 చూడుడు). మెదడుకు సూలస్థివస్థిన సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్సు క్రమముగా పెరుగుచు నచ్చినవి. పక్కలోని మెదడు బరువు 185 గ్రాములు. గొరిల్లా మెదడు బరువు 430 గ్రాములు. మిగత జంతువు లన్నిటికంటెను బరువైన మెదడు గొరిల్లాలలోనే కలదు. మానవులయందుగల మెదడు బరువు 1350 గ్రాములు. మెదడు పదార్థము హెచ్చుటయేగాక దానిపై శాల్యము మిట్టపల్లముల వలన హెచ్చినది. మానవునియం దీ మెట్టపల్లములు అమితముగా నుండుటచేత నాలోచనాశక్తి, జ్ఞాపకశక్తి యాధిక్యముగానున్నవి. సెరి బ్రమ్ యొక్క యాధిక్యతవలన ఎరుకజ్ఞానము, జ్ఞాపకశక్తి, తర్కనితర్క ప్రజ్ఞ, ప్రబల మేధాశక్తి కలుగుచున్నవి.

మిగతజంతువులకంటె గొరిల్లాయందు నిలబడుశక్తి మేధాశక్తియధి కముగా నున్నవి. నీటికంటె నొకమెట్టధికముగా నున్నవి. పితకొం త్రోవన యరక్కను (Pethecam thropus erectus) సుమాచ్యు

6 లక్షల సంవత్సరములకు పూర్వ మిట్టికోత: లుండెడివి. హోమో నియాండెర్తల్ మానవుడు పితేకెంత్రో పస్సులకంటె మానవ లక్షణము లెక్కువగా కల్గియుండెను. మానవుడు చాముభ్యుత పటించుటకు కారణము ముఖ్యముగా నాతనిమాటలాభ:శక్తి. వీనివలన నొకరియొకరి మొకరి కండకేయటకు ఏలుకల్గినది. ఈ శక్తి యితర జంతువులలో వృద్ధిబొందలేదు. (మానవపరిణామము ఈ క్రింది పటమువలననన. ముందు (123) న) బొమ్మల పటమువలనను సులభ గ్రాహ్యమగును.)

మానవుడు (అటవికుడు)

↑
క్రోమెగ్నోన్ (Cro-Magnon)

↑
ఔరిగ్నోషియన్ Aurignacian)

↑
గ్రిమార్డి (Grimaldi)

↑
హోమోనియాండెర్తల్ Neanderthal)

1000,000 సంవత్సరములకు పూర్వము

↑
హీడెల్ బెర్గ్ (Heidelberg)

↑
పితేకెంత్రోపన్ (Pethecantropus)

500,000 సంవత్సరములకు పూర్వము

పితేకెంత్రోపన్ అనుమాటకు ఏవుమనిషియని యర్థము. ఏవు, మనుష్యు నకు సన్నిహితముగానున్నకోతి. ఈకోతిమధ్యని యస్థివంజరము బావాయను దీవినుండి నొరికినది. మానవపరిణామోన్నతికి ముఖ్యకారణము నివృయొక్క యుపయోగమును గుర్తించుట, ఇతర జంతువులలో నిది లేదు. నియాండెర్తల్ మానవుడు, నివృపయోగమును గ్రహించి దానినివాడుకొనుట నేర్చెను. ఈతడు గుహలలో నివసించుచు

గాతిపరికరములను వాడెడివాడు. ఇతనికంటె జ్ఞానమును పెంపొందిన జాతి గ్రీమాల్లి. ప్రాన్సు దేశమందలి కొండగుహలలో వైవారి యస్థి పంజరములు దొరకినవి. వీరు నీగ్రోజాతికి సన్నిహితులు. గుహలలో నివసించుచు, నత్తగుల్లదండలను కడియములను ధరించెడివాడు. నియాండెర్తల్ జాతి కంటె వీరికి నాగరికత హెచ్చుగా నున్నట్లు కన్పించుచున్నది.

ఔరిగ్నోషియో జాతిమనుష్యులు గుట్టములను, లేళ్ళను వేటాడి తిని జీవించెడివాడు. కొండగుహలలోనే నివసించుచు గాతిపరికరములను వాడుకొనెడివారు.

కోమేగ్నో జాతి మనుష్యుడు భూమిమీచ పెద్ద పెద్ద మంచుగడ్డ లావరించి యుండెడి రోజులనాటివాడు. అస్థిపంజరములనుబట్టి ఈతడు బాగా పొడవుగానుండి పెద్ద మెదడు కలియుండెడివాడని తెలియుచున్నది. ఈ జాతి కొండగుహలలో నివసించుచు, వారి నివాసముల యందు దంతపుముక్కలనుచెక్కి అందముగా నమర్చుకొనుచుండెడి వారు. అంతేగాక అప్పుడు నివసించుచుండెడి జంతువుల బొమ్మలు తమ గుహలలో చెక్కుచుండెడివారు. అట్టి బొమ్మలలో నాకాలమున నివసించుచుండి అంతరించిపోయిన జంతువుల బొమ్మలుగూడ గలవు.

హెమోసివియన్సు:— వీరు మానవులు. గుహలలో నివసించుట వదలి యడవులలో కల్లెలుపోగుచేసికొని గుహలవంటి గృహనిర్మాణము చేసుకొని యందు జీవించెడివారు. సుమారు 50 వేల సంవత్సరములకు పూర్వమే యిప్పటినాగరికత జ్ఞానము రాకపోయినను మనుష్యులకు మనుష్యాకారము వచ్చియున్నది.

మానవుడు వ్యవసాయము చేసుకొని వండించుకొనుట పదివేల సంవత్సరములనుండి యమలులోనున్నట్లు తెలియుచున్నది. ముఖ్య

ముగా నాల్గుశాఖలుగా మానవులు భూమిమీద నివసించుట కారంభించిరి. ఈ సిద్ధాంతములలో ననేకాభిప్రాయములు గలవు. మానవ చరిత్ర సుమారు నాల్గువేల సంవత్సరములనుండియే యున్నది. దీనిని బట్టి చూడగా నప్పటికి మానవుడు కొంతవరకు స్థానమును సంపాదించి యొకవిధమైన సౌఖ్యజీవనము చేయగల్గుచున్నట్లు హింపవచ్చును. మాటలచేత నూహలు తెల్పుకొనుట చాలకాలము నాగినపిదప భాషలకు లిపు లేర్పడినవి. ఒకమూల భాషనుండి లేటిక్, వ్రాక్యుతము, పాళీభాష లువయించినట్లు భాషాపరిశోధనాంశముల నలన తెలియుచున్నది. ఒకప్పుడు యూరపుఖండములో బహుళ వ్యాపకముగానున్న లాటిక్ భాషనుండి యనేకవందల భాష లుత్పత్తియై చివరకు లాటిక్ భాష వాసుకలోనుండి తగ్గిపోయినది. భారతభూమిలో ప్రాకృతభాష కొంతకాలముండిన తర్వాత నది సంస్కరింపబడి సంస్కృతముగా మారినది. ఈ సంస్కృతము చాల కాలము వాడుకభాషగాను, గ్రాంథికభాషగాను ఉండి, యిప్పుడు గ్రాంథికభాషగా మాత్ర మున్నది. దీనినుండి సుమారు ఐదువందలభాష లుద్భవించినవి. ఈజిప్టు ప్రాంతాలలో నుండి గతించిపోయిన జేబిలోనియర్ నాగరికతయందు, వారి భాషలలోని యభిప్రాయములు, గ్రంథములు మట్టివిశ్వ పెంకులమీద తడిగానున్నపుడు వ్రాసి, యెండబెట్టి వాటి నిప్పుడు మనము ఆకులమీద పెంకులుకాల్చినట్లు కాలెచ్చెడువారు. అట్లుకాల్చబడిన పెంకులయందక్షురములు చెరగనిస్థితిలో చాలకాలము దాచుకొనుటకు సావకాశమున్నది. న్యాయచట్టములు, చరిత్రలు, కథలు మున్నగునవి యన్నియు చిల్ల పెంకులమీదవ్రాసి కాల్చి చాలకాలము దాచుకొనుచు నుండెడివారు. సుమారు మూడువేల సంవత్సరములకు పూర్వమునుండి తాటి యాకులమీద గ్రంథములు వ్రాసి దాచుట యమలులోనికి వచ్చినది. సుమారు రొక శతాబ్దముండి కాగితముమీద నచ్చువేయుట సాగు

చున్నది. హిందూరాజులు, మహమ్మదీయరాజులుగూడ తాము ప్రపంచమునకు తెలియజేయ దలచుకొన్న ముఖ్యవిషయములు పెద్దపెద్ద రాతి స్తంభములమీద చెక్కించి గుళ్ళలోను, గోపురములలోను స్థాపించెడివారు. వాగరికత 100 సంవత్సరములలో శాస్త్రీయ పరిష్కారము వలన సద్భుతవేగమున నభివృద్ధిజెంది యున్నది. మేధాబలమున మానవుడు ప్రకృతినంతను గ్రాధనము చేసుకొని, యాహార విహార సంహారక్రియలకు దానిని తన యిట్టము వచ్చిన రీతిని వాడుకొను చున్నాడు.

పరిణామవాదము

చాలకాలము క్రిందటి నుండియు ప్రపంచములో మతము లను పేరుతో ప్రజాసీకమునందు ప్రకృతిని గురించి కొన్ని యభిప్రాయములు స్థిరపడిపోయినవి. ఒక్కొక్క మతమున కొక్కొక్క మతగ్రంథమున్నది. ఆ మతగ్రంథములందు సృష్టి యెట్లు ప్రారంభమైనది, మానవు డెట్లు ఉత్పత్తి జెందినది, అతడు తన జీవితము నెట్లు గడవవలసినది, యేపనులు చేయవచ్చును, చేయరాదు మొ॥ నియమింపబడియుండును. ఒక మతమునకు జెందిన మనుష్యు డా మతగ్రంథములో శాసించిన దానికి వ్యతిరేకముగా నూహించుటకుగాని, చరించుటకుగాని వీలుండెడిదిగాదు. అట్లాచరించినచో నది పాపము. మతగ్రంథశాసనము నమ్మనివారు మతదూరులు. అట్టివారిని సంఘము హేళనవేయుటయే గాక మతమునుండి సంఘమునుండి వెలివేయును. మానవునకు వాగరికతకల్గి, పల్లెలు పట్టణాలుగాను, గుడిసెలు యనేకఅంతస్తులుగల సౌధములుగాను, ముతాలు సంఘములు జాతులుగాను మారి, సీమలు రాజ్యాలుగాను మారిన పిదపగూడ నీ మతముల ప్రాముఖ్యము మారలేదు. అంతేగాక వాటి ప్రాముఖ్యత యనంతముగా విస్తరించినది.

ఇందు హిందూమతము, క్రీస్తుమతము, బౌద్ధమతము, క్రైస్తవమతము, ఇస్లాం (మసీద్) మతము ప్రాముఖ్యములైనవి. అన్ని మతములలోను సత్యము, అహింస, భగవద్భక్తి, బోధించుచుచున్నది. కావునను బట్టి భగవన్నామములు వేరువేరుగానున్నవి. బౌద్ధమతము భగవంతుడున్నట్లుగా గుర్తించుటలేదు. మితమతము లన్నిటియందును భగవంతుడనే యొక దివ్యతేజోమూర్తియొప్పులు, ఆయన గోళల్లములన నీ కంటికి కనపడే సృష్టియంతయు హతాత్తుగా సృష్టించబడినట్లు ఉద్ఘోషింప బడినది. సృష్టినిధాన మొక్కొక్క సుత్రంకము చందొక్కొక్క చూచిగా నర్థింపబడియున్నది. బౌద్ధమతము మనహా శేషించిన మతములన్నియు భగవంతునిమూలమునను, ఆయన నంకల్పము నలనను, సృష్టి సర్వము హతాత్తుగా నుద్భవించినట్లుగా ప్రబోధించుచున్నవి. క్రీస్తుమతగ్రంథమైన 'బైబిలు' లో 'జనీస్' అను ప్రకరణమునందు భగవంతుడు సృష్టినంతను ఏనుగోజులలో చేసినవి చెప్పబడి యున్నది. ఆఖరుగోజున "ఏడమ్" అనే పురుషుని, "ఈల్" అనే స్త్రీని సృజించి వారి నొక యుద్వాసవనమందుంచి, యందుగల "జ్ఞానవృక్షపు" (Tree of Knowledge) పండ్లను తిన రాదని శాసించెను. భగవంతు డంతస్థానమై పోయినపిదప 'ఈల్' అను ఒక చెడ్డదేవత సర్పరూపమునవచ్చి, యాయువురను ఆ చెట్టు పండ్లను తినవలసినదిగా కోరెను. వారు నిరాకరించిరి. అంతట ఈల్ వారి కా పండ్లు. తినుటవలన జ్ఞానమువచ్చుననియు, దానివలన గొప్పలాభమున్నదనియు చెప్పి యనేక విధముల ప్రోత్సహించెను. ఈల్ ముందర సమ్మతించి ఏడమ్నుగూడ సమ్మతించునటుల యిబ్బంది పెట్టెను, అతడుగూడ సమ్మతించి వారిద్దరుచేరి యొకపండు తినిరి. వెంటనే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యెను. ఫలభక్షణ ఫలితముగా వారికి ఆడు, మొగ భేదము తెలిసి వెంటనే యందుగల ఆకులను వస్త్రములుగా

ధరించిరి. భగవంతుడు వారినిచూచి తన యాజ్ఞాల్లంఘనముచేసినందుల క్రాగ్రహించి వారిని చావు పుట్టుకలుగల మానవులు గమ్మని శపించెను. భగవచ్చాప మనివార్యమగుటచేత వారు మానవులుగ వర్తించుచు, మరొకతోటలో నొకచిన్న కుటీరమును నిర్మించుకొని యందు భార్య భర్తలవలె కాపురముచేసిరి. ప్రపంచములోనున్న మానవజాతి యంతయు వారిరువురి సంతతి పరంపరవలన కల్గినది. ఇది సృష్టినిగూర్చిన క్రైస్తవమతసిద్ధాంతము. యూరప్ ఖండమునగల దేశములన్నిటి యందును ఈ మతము వ్యాప్తిలోనున్నది. ఈ మతముపుట్టి సుషాకు రెండువేల సంవత్సరములని చెప్పనచ్చును.

క్రైస్తవదేశమైన ఇంగ్లండునందు 1809 న సంవత్సరమున 'ఫార్లెస్ డార్పిన్' అనునాత డొక సామాన్యకుటుంబమున జన్మించెను. ఈతడు చిరుతనయస్సునుండియు తీక్ష్ణమైన విచక్షణజ్ఞానము, విమర్శన శక్తి కలిగినవాడు. బాల్యమునందు రంగులరెక్కలుగల్గిన తూనీగలను బట్టి బంధించి వాటిని పటములయందు చక్కగా నమర్చి జాగ్రత్తపడు చుండెడివాడు. ఈ యలవాటు ఫలితముగా ఇంగ్లండు దేశమందుగల తూనీగ జాతుల నన్నింటిని చూచి జ్ఞాపకము పెట్టుకొనెను. యశావనా వస్థలో నా దేశములో గొప్పదైన 'క్యూ' తోటలయందు జీనోపాయ మునకై వేతనమునకు కుదిరెను. తనయుద్యోగమందు వినయ విధేయతలచేత, నామర్థ్యకౌశలములచేత పై యధికారులను తృప్తిపరచి వారి యాదరాభిమానములకు పాత్రుడయ్యెను. అంతట 1887 లో ప్రభుత్వమువారు నూతనదీవుల పరిశోధనలకు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము మధ్యనున్న "గెలపెగోస్" అను ద్వీపసముదాయ మును చూచి నచ్చుట కీతనిని నియమించిరి. పొగటడలు లేని కాలములో 'బీగిల్' అనే యొక తెడ్లయోడలో నీతకు నావికాయాత్ర సాగించెను. ఉత్తర అమెరికాకు సుమారు 500 మైళ్ళదూరమునను,

ఇంగ్లండుకు 6000 మైళ్ళ దూరమునను నీ దీవులు ఆట్లాంటిక్ గముద్రములో నున్నవి. ఈ చిన్న చిన్న దీవుల గముద్రాయము, చుట్టను నంజలాది వేలాదిమైళ్ళ సముద్రముచేత నాచరింప బడుటచేత, కొన్ని లక్షల శతాబ్దములనుండి పెద్ద భూభండములనుగిరి పూర్తిగా వేరు చేయబడి అచ్చటి కెవ్వరు పోని కారణమున నిర్వాసుష్యమై యున్నది. డార్విన్ తన పరివారముతో సహా చాల రోజు లక్కడి విడిసి, ఆ ద్వీప సముదాయమునంతను బాగుగా పరిశీలించెను. ఇంగ్లండు, యూరప్ ఖండపు దేశములలో నాచూస్యముగా కనిపించు వృక్షజాతులను, జంతువులను ఎరిగియున్న వాడగుటచేత వానిని కచ్చటి జీవస్మృతి యంతయు శ్రోత్రగాగోచరించెను. వాటియందు పరిశోధనాచరములు ప్రత్యక్షముగా కనిపించెను. పక్షులలోను, మానీగలలోను, ఇతర చిన్న జంతువులలోను క్రమపరిశోధనాచరము విపులముగాను స్పష్టము గాను కనిపించుటచేత ఆయనకు అందుగల జంతుజాలము, వృక్ష జాలము ఆ దీవులయందే ప్రత్యేకముగా నుద్భవించినవనియు, నందుండి యితర భూఖండములకు పోవు మార్గములేక కొన్ని లక్షల సంవత్సరములనుండి యందే నివసించుచు పరిశోధనమును బొందుచున్న వనియు తలెను. ఈ యభిప్రాయము పూర్వపు హతాత్సంభవ సిద్ధాంతమునకు వ్యతిరేకమైనను, అందుగల విపుల నిదర్శనములనుబట్టి ఆయనకు గట్టి నమ్మకము తోచెను. దొరకినంతవరకు పరికరములను, నమానాలను, అస్థిపంజరములను తీసుకొని తిరిగి యింగ్లండుచేరి స్మృతి పరిశోధనా సిద్ధాంతము నుద్ఘాటింపసాగెను. మున్నుండి నూతన సిద్ధాంతమును ప్రజానీక మామోదింపలేదు. అంతేగాక ప్రతిఘటనగూడ జరిగెను. థామస్ హెన్రీ హక్సులే అను గొప్ప యువన్యాసవేత్త ఈ సిద్ధాంతమును చక్కగా బోధపరుచుకొని ఈయనకు తోడుగానుండి యీ పరిశోధనాసిద్ధాంతమును వ్యాప్తిలోనికి తీసుకొనివచ్చెను. 1859 వ

సంవత్సరములో డార్విన్ “ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్” (Origin of species) అనుగ్రంథమును ప్రచురించెను. ఈ గ్రంథమునందు సృష్టి హఠాత్సంభవము గాదనియు, జీవసృష్టి క్రమపరిణామమున నారోహణార్థమున నడచి ప్రస్తుతమున్న వృక్షజాతులు, జంతుజన్తువులు కల్గినవినియు నిరూపింపబడినది. స్వల్పమై నిశాడంబరమైన జీవులలోనుండి ఆడంబరమైనవి, పెద్దవి కొన్నినంకల తరములలో, ప్రతితరము నందును స్వల్పమగు మాపులు పొందుటచేత కలుచున్ననని ఈయన సిద్ధాంతము. నాలుగు సూత్రములలో నీ సిద్ధాంతము విశదపరపబడుచున్నది.

1. నాశనము 2. సవాజము 3. జీవనము 4. విశేషము (Death is the rule and life in an exception). ఈ సూత్రముయొక్క పూర్ణాభిప్రాయము వృక్షములయొక్కయు, జంతువుల యొక్కయు సృష్టి విధానమును పరిశీలించినచో విశదమగును.

ఒక కావిచెట్టుగాని, మఱిచెట్టుగాని సంవత్సరమునకు కొన్నికొట్ల కొట్ల గింజలను తయారుచేయుచున్నవి. అవన్నియు వచ్చెడి వాసకాలములో మొలకలెత్తి చెట్టుగాపెరిగినచో నీ భూమండలమంతయు నచిరకాలములో నొక కావిచెట్టు జాతి చేతగాని, మఱివృక్షజాతివలన గాని నిండిపోయి, మరి యితర మొక్కలకు చోటుండదు. అటువలెనే ఒకమామిడిచెట్టు సాలునకు నుత్పత్తిచేయు ఔషధలన్నియు మరుసటి సాలున మొలచి మామిడిచెట్లగుచు నున్నచో భూమియంతయు మామిడిచెట్లవలన నాక్రమింపబడిపోవును. ప్రతికప్పయు దాని ఋతుకాలమందు వెయ్యిగ్రుడ్లు పెట్టును. అట్లు ప్రతికప్పపెట్టిన గ్రుడ్లన్నియు పిల్లలైనచో నొక తటాకము కప్పలతో నిండిపోయి మరి యితర జలచరములకు చోటుండదు. మరియొక యుదాహరణ నల్లి. ప్రతిసల్లి సుమారు 60 వేల గ్రుడ్లు పెట్టును. ఈ గ్రుడ్లు వారము, పదిరోజులలో

పెరిగి నల్లలగును. ఆ కేతిని నల్లలు పెరుగుచున్నచో కెండు చూపుము లలో ప్రతియిట్లు నల్లలతో నిండిపోవును. కాని ఘక్యతిలో నల్లు జరుగుటలేదు. తొంబదితొమ్మిదిచాళ్ళు గింజలు, గ్రుడ్లు, నూతన జీవితములను పెంపొందించుటకు తగియున్నను నట్లుచేయక నశించిపోవుచున్నవి. అందువలన నశించునది గట్టి ధర్మముగా నున్నది. ఎచ్చటనైనను వీటివలన తన జీవితముకల్గినచో నది విశేషముగా నున్నది.

2. జీవనపోరాటము, అందు నిపుణుల జయము (Struggle for existence and survival of the fittest)

మొదటి సూత్రము ప్రకారము చాల జంతువులు, మొక్కలు నశించి పోవుటకు కారణము జీవనపోరాటము. ఈ విషయము ఊదా హరణవలన విశదమగును. ఒక మామిడిచెట్టు మిక్కుటముగా కాచిన దనుకొనుడు. అనగా సుమారు 1500 లగాయితే 2000 కాదుల వరకు నున్నవి. అవి యెన్నడు కోయకపోయినచో పండ్లు పండి చెట్టు క్రిందనే కుప్పలు, కుప్పలుగా పడును. పై గుంజు కుళ్ళి చీకిన తర్వాత అన్ని టెంకల నుండియు మొక్కలు బయలుదేరును. కాని కొంత కాలమునకు చాల భాగము చచ్చిపోయి, రెంజో మూజో పెద్ద చెట్లుగా పెరుగును. నీరు అన్ని టెంకలకు అందిన పిదప మొలకలువచ్చి జీవనపోరాటము ప్రారంభమైనది. అందిన నీరు సమముగా నన్నియు తీసుకొని జీవించవలసియున్నది. చెట్టుమొదట నున్న యెరువు చాల తక్కువగా నుండును. అదే ఆధారముగా నన్ని టెంకలు బ్రతుకవలసి యున్నది. పైగా చెట్టు మొదట నీడ యుండును. అన్ని చిన్న మొక్కలకు యెండకావలసియున్నది. వర్షము కురిసిన పిమ్మట నీరున్నను, అనేక వందల టెంకలు నీల్చుటచేత నది కొలదికాలములో హరించి పోవుచున్నది. ఇట్టి యిరుకు పరిస్థితులలో జీవితము నాగించవలెనన్న

రెండువేల టెంకలు ఒక విధమైన పోచాలములో నుండును. గుర్రపు పందెములలో ప్రతిగుర్రము తా నన్నిటికంటె ముందు పోనలెనని యాసక్తితో పరుగిడు మాదిరి నీ టెంకలన్నియు జీనయాత్ర : గించు చుండును. ఇట్లు కొన్ని సంవత్సరములు గడచు సరికి చాల భాగము మొక్కలు చసపోయి చివరకు రెండో, మూడో మిగిలి పెద్దవిగా పెరుగును. బ్రతికిన మొక్కలను పోచాలములో నిపుణులుగా భావింప నగును. ప్రతి పోచాలమున ప్రతి చెట్టుకొర అడవులలో నిట్టి జీవనపోచాలము గాగుచునేయుండును. అట్టి పోచాలములో గెలిచినవి బ్రదుకు చుండును. లేనివి నశించి పోవుచుండును.

పార్శ్వశాస్త్రజ్ఞుడుగెలిచిన మొక్కలయందు, జంతువుల యందునొక సూక్ష్మమైన విశిష్టత, లేక మార్పుఉన్నదని గుర్తించియున్నాడు. ఇట్టి మార్పులేక విశిష్టత యనునది జన్మతః లేక నీ పోచాల సమయమున యార్జించిననని యాతనిసిద్ధాంతము. అవి సూక్ష్మోత్పత్తిసూక్ష్మములు, నగ్న దృష్టి కగోచరములు. ఒక చెట్టుగాని జంతువుగాని ప్రతి తరములోను ఒక్కొక్కచిన్నపూర్వు నీ విధముగా పొందుసరికి, కొన్ని వేలతరము గడచిన పిదప మొదటి చెట్టు, జంతువు కంటె భిన్నరూపమును పొంద గలవు. మార్పులు ఒక్కొక్కటి చిన్నది, స్థూలదృష్టికి కనిపించనిదియే యైనను, వేలాది చిన్నపూర్వులను పొందిన చెట్టులో నివి ప్రస్ఫుటముగా కన్పించి, ప్రాతిపదికలోని చెట్టుకంటె చాల భిన్నముగా కన్పించును. అప్పుడు రెండు తరగతుల మొక్కలేర్పడుచున్నవి. జంతుపరిణామము గూడ నిట్లే. ఒక గొట్టెలమంద యెత్తైన కొండలమధ్య నున్నదను కొండము. రాతినేల యగుటచేత నచ్చట పచ్చిక మొలనదు. చెట్లు విరివిగా పెరుగును. గొట్టెలమందకు చెట్లయాకులే ఆహారముగా నుండును. ఆకుల నందుకొనుటకు గొట్టెలు తమ మెడలను పైకి నాగించనలసి యుండును. ప్రతిదినము నిట్లుచేయుటచేత వాటిమెడలు


కొద్దిగా పొడుగుగుటకు నానకాశమున్నది. అది మంత్రమును గొప్ప వృక్షుడు ఈ పొడుగునాడే లక్షణము వాటికి వచ్చును. కెండవతరము గూడ కొండలమీదనే నివసించుచున్నచో మొదటి యింకను కొంచెము గాగుటకు నానకాశమున్నది. ఇట్టి పరిస్థితులలో మంచులు గొట్టెలలో వీటిని సరిపోల్చి చూచినచో స్థలస్వస్థికి నోచుకుండుంతకు మాన్యు ఏమియు కరవడదు. ఎందుచేతననగా, ఒక్కొక్కతరమునకు మొదటి ఒక మిల్లిమీటర్ మాత్రము సాగును. కొండలమీద నున్న గొట్టెలమంద యచ్చటనే నొక వెయ్యి సంవత్సరము టున్నచో చందమును రెండువేల తరములైతను గడిచిపోవును. ఒక్కొక తరమునకు గొట్టెలమొడి లొక మిల్లిమీటర్ వంతున సాగుచున్నచో, రెండువేల తరములు గడచిన పిమ్మట నచ్చటి గొట్టెలమందకు సుమారు రెండు మీటర్లు పొడుగును. నెనుకటి గొట్టెలమందలో వీటిని సరిపోల్చి చూచినచో ప్రత్యక్షముగా నివి గొట్టెలుకావు. మరొక బంతువులని తోచును. ఆ విధముగా పరిణామమును పొందినదే “జరాఫీ” అను జంతువు. ఈ జంతువునకు గొట్టెకు మొడపొడివులో తప్ప మరీ యేయితర విషయమునందును తేడాలు కన్పించవు. ఈ విధమైన పరిణామము, ఉపయోగ అనుపయోగములమీద నాధారపడినది. తరుచు ఉపయోగపడే అనయనము వివరీతముగా నృప్థిజెందుట, ఉపయోగపడని యవయవము నీరసించి కృశించి పోవుట జరుగును. అనుపయోగ విషయమున సముద్రములో బాగుగాలోతు అనగా 10 వేల యడుగుల లోతున నివసించు చేపలను ఉదాహరణముగా తీసుకొనవచ్చును. సూర్యకాంతి పై భాగమున నివసించు వాటికి మాత్రమే ప్రసరించును. కాంతివలన యితర నస్తువులను గ్రహించు యవయవము కన్ను గనుక, నీటిపై నను కొలిది అనగా సుమారు 100 అడుగులలోతువరకు నివసించు బంతువులకు కన్నుయొక్క యవయోగముండును. అటుపైన

కాంతి నీటిని చొచ్చుకొనిపోలేదు. అనంతము కారుచీకటిలో నివసించు జంతువులకు కన్నులుండిము ప్రయోజనములేదు. అందుచేత సచ్చటి జంతువులకు కళ్ళుండివు. ఉపరిభాగముననున్న జలచరమలే బాగుగా లోతు నీటిలో నివసించుట కలవాటుపడినచో వాటి కడినం కున్న కళ్ళు క్రమముగాకృశించి, హరించిపోవును. జీనసృష్టి పరిణామము నకు ఉపయోగ, అనుపయోగ కారణములు హేతువులని 'లమార్క్' (Lamarck) శాస్త్రజ్ఞుడు సిద్ధాంతీకరించెను.

తరువాత మెండలియమును సిద్ధాంతము వెలునడెను. గ్రిగర్ మెండల్ (Grigarmendal) అను ఆస్ట్రీయా (Austria) దేశపు ఒక మతాధిపతి తన తోటలో విలానార్థము కొన్ని ప్రయోగములనుచేసి, వాటి పర్యవసానములను వ్రాసి తన డ్రాయరులో పెట్టి చనిపోయెను. తరువాతి శాస్త్రజ్ఞులట్టి పరిశోధనలనే గావించి, యొక సిద్ధాంతమును జేసిరి. కొంతకాలమునకు మెండలు వ్రాసిపెట్టినవి బయట వడగా నతడు ఇంతకు పూర్వమే యాసిద్ధాంతము తెలుసుకొనెనని యూహించి, ఆ సిద్ధాంతమునకు మెండలిజమ్ (Mendalism) అని నామకరణము చేసిరి. మెండలు రెండుతరగతుల బటానీ మొక్కలను తన తోటలో పెంచెను. అందొకటి పొట్టిరకము, రెండవది పొడుగురకము. పొట్టిరకము నుచూరు 10లగాయితు 12 అంగుళముల యెత్తువరకు మాత్రమే పెరుగును. పొడుగుది 30 అంగుళములు లగాయితు 40 అంగుళముల ఎత్తువరకు పెరుగును. ఈ రెండును పూచినపిదప వాటికి పరస్పర పరాగసంపర్కము కుంచతో చేసెను. అనగా పొట్టిమొక్క పరాగము (పుప్పొడి) పొడుగు మొక్క కీలాగ్రము (Stigma) మీదను, పొడుగు మొక్క పరాగము పొట్టిమొక్క కీలాగ్రము మీదను ఉంచెను. అటుపైన నవి కాయలు కాచిన పిదప వాటి గింజలను జాగ్రత్తగా నొక మడిలో వేరుగా నాటి పోషించెను. పరాగసంపర్కము కాబడిన మొక్కలు మొదటితరము, వాటి గింజలవలన బయలుదేరిన మొక్కలు రెండవ తరము. ఈ రెండవతరములోని మొక్కలన్నియుగూడ పొడుగు

మొక్కలై బయలుదేరినవి. పొట్టి గుర్రము మొచ్చుట నవ్వకట్టి నైనదో కనిపించలేదు. రెండవ తరములో, మొక్కలను యితర మొక్కలతో కలపక వాటిలో వాటికే వర్ణవచనాగ్రంథము గావించెను. ఈ క్రియ జరిగిన పూర్వం కాచిన కాయలనుండి విత్తిన ములు బాగ్రక్షగా నేకరించి, వాటిని తిరిగి ప్రత్యేకమైన మొక మడిలోపాటి నీరుపెట్టి యెరువువేసి చక్కగా పోషించెను. కనీశుమాడన తరము. ఈ తరములోని మొక్కలన్నియు కమముగాలేవు. కొన్ని పొట్టివి, కొన్ని పొడుగువి. లెక్కించినచూడగా 100875 పొడుగువి పొట్టివి జేరినవి. పొట్టివాటిగింజలను ప్రత్యేకముగా 4, 5 తరములవరకు చాల్చుచున్నప్పుడు, వాటినుండి పొట్టిమొక్కలే బయలుదేరినవి. పొడుగుమొక్కల విత్తిన ములు నాల్గవతరములో నూటికి 75 పొడుగుచెట్లు, 25 పొట్టిచెట్లు ఉత్పత్తిచేసెను. దీనినిబట్టి చూడగా మూడవ తరములోని పొడు గుగానున్న చెట్లన్నియు యభార్యపు పొడుగువి కానని తెలిసినది. వాటి యందు లెక్కవేసిచూడగా 25 మాత్రము యభార్యముగా పొడుగు మొక్కలను సృజించుచున్నవి. తక్కిన 50 మొక్కలు తిరిగి పొట్టి పొడుగు 1 : 3 నిష్పత్తిలో విడిపోవుచున్నవి. ఈ ప్రయోగ ఫలితము లీ కింది పటముద్వారా విశదమగును.

పొడుగు × పొట్టి 1 వ తరము



బ్రాకెటులోనుంచిన పొడుగు మొక్కలు నూటికి పాతికవంతు పొట్టి మొక్కలనుగూడ ఉత్పత్తి చేయుచున్నవి. అందుచేత మూడవ తరము లోని నిష్పత్తి 1 : 2 : 1 అయియున్నది. ఈవిధమైన నిష్పత్తి యేరెండు గుణములను కలిపి యీ విధముగా పరిశీలించినను కన్పించుచున్నది. అందుచేత నిది యొకసిద్ధాంతమైనది. ఈ సిద్ధాంతప్రకారము మూడవ తరములోనే మొక్కలలో పెద్దమార్పు కలుగుచున్నది. అట్టిమార్పు డార్విన్ (Darwin), లమార్కు (Lamarck) ల సిద్ధాంతముల ప్రకారము వచ్చుటకు వందలాది తరములు పట్టును. కనుక నీ నూతన సిద్ధాంతమువలన పై రెండు సిద్ధాంతములు త్రోసివేయబడుచున్నవి. ఈ సిద్ధాంతములు యూరప్ ఖండములలోని దేశములలో వ్యాపించి అచిరకాలములో మేధావుల సమావేశములలో చర్చనీయాంశములైవవి. ప్రాతిపదికలో వీటి నామోదించువారు కొందరు, ప్రతిఘటించువారు మరి కొందరు ఉన్నను, క్రమముగా ప్రజానీకములో నివి విస్తరించుసరికి యామోదించువారిసంఖ్య యెక్కువై పోయినది. ఇట్టి పరిస్థితులలో డచ్చి (Dutch) దేశములోని ప్రకృతి శాస్త్రజ్ఞుడు హుగో డి వ్రీస్ (Hugo de Vries) అను నాతడు 1901 లో మరొక సిద్ధాంతమును కనుగొనెను. దీనికి హతాత్సంభవముగా పెద్ద మార్పు లోకే తరములో రావచ్చుననియు, వాటిమూలమున పరిణామములు జరుగుచున్నవనియు నీతని యభిప్రాయము. ఈ నూతనసిద్ధాంతమును మ్యుటేషన్ సిద్ధాంత (Mutation theory) మందురు.

మ్యుటేషన్ సిద్ధాంతము (Mutation theory) డివ్రీస్ తన తోటలో (Oenothera Lamarkiana) యీనో తీరా లమార్క్కి యానా అను మొక్కను పెంచుచుండెను. రెండు మూడుసంవత్సరములకు తోటలో వాటి విత్తనములుపడి యనేక వందల మొక్కలు మొలచినవి. వీటన్నిటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుటలో డివ్రీసునకు మిగత

వాటికంటె నెక్కువ భిన్నముగా రెండు మొక్కలు ఏర్పడినవి. భిన్నరూపములోనున్న యీ రెండు క్రొత్త మొక్కలు ఆదివర కెచ్చుటను నర్హింపబడియుండలేదు. అనుభవముచేత కూడ నెచ్చు నిది సరకు చూడలేదు. ఆ యపూర్వవిశేషము గల మొక్కలను క్రొత్త వేరుగా బెంచి వాటిని త్రవములు లేని పుడిగిటి కనత్తరము పెంచగా వాటినుండి యపూర్వ భిన్నరూపము గల మొక్కలే బయలుదేరినవి. అంతట వాటిని యడివరకువాటికంటె భిన్నమైన స్పేషిస్ (Species) అనగా నూతనముగు మొక్కలుగా భావించినారు. ఈ యపూర్వపు మొక్కలను ఆమ్స్టర్ డామ్ (Amsterdam) పట్టణములోనున్న తన తోటలో ప్రత్యేకముగా పెంచి వాటిగింజలవలన 2 వ తరము, 3 వ తరము ఈ విధముగా ననేక తరములవరకు వాటిని పెంచుచు పరిశీలించెను. ప్రతితరమునందును, ననేక మొక్కల గుంపులో రెండు మూడు తిరిగి వినూతనమైన, యపూర్వమైన మొక్కలు బయలు దేరుచు వచ్చినవి. అనన్నియుగూడ క్రొత్తగా నావిర్భవించినవేగాని యడివరకున్న నమూనాలు గావు. అంతట డీవీసి జీవపరిణామము ఈ నూతన నమూనాల యావిర్భావము హఠాత్తుగా కలుగుటచేత సంభవించినచున్న; పరిణామమునకు ప్రధానకారణ మిదియేనని సిద్ధాంతకరించెను.

సమన్వయము

శాస్త్రీయపరిశీలనలవలన తెలియదగు సృష్టివిధాన మిందు వినరింపబడిన మాదిరిగా నున్నది. భారత దేశమందుగల పురాణాధికారులు లో నీ విషయ మనేక కథల మూలమున ననేక రీతులుగా నున్నది. కొన్ని పురాణములలోని కథలు, వాక్యములు, సూత్రములు పరిశీలించినచో నీ ప్రస్తుతమందు చదివిన సిద్ధాంతమునకు సరిపోల్పదగిన విషయ

ములు కప్పించుచున్నవి. ఈ సిద్ధాంత సారాంశము సూర్యునిలోనుండి గ్రహకుటుంబము వాటియందు సూర్యతేజస్సు మూలముననే జీవసృష్టి కల్గుట, అది పోషింపఁజుట జరుగుచున్ననని తెలియుచున్నది. ఈ విషయమునే సూత్రప్రాయముగా నాదిత్యహృదయమును స్తూత్రమునందు గల క్లోకమున జెప్పబడినది.

శ్లో. 1. నాశయ త్యేషన్వై భూతం | తదేవ సృజతి ప్రభుః |
పాచ త్యేష, తప త్యేష | వర్ష త్యేష గభ స్తిభిః ||

ఈ శ్లోకార్థమునుబట్టి సృష్టిని కల్పించుటకును నశింపజేయుటకును సూర్యతేజస్సు కారణభూతమని తెలుచున్నది.

పురాణోత్సాహసములయందుగల కథలకును, సూత్రప్రాయమున సృష్టి విధానమును బోధించిన వేదమంత్రములకును వ్యత్యాసము కన్పించుచున్నది.

“ఆకాశాద్వాయుః.....”

అని క్రమముగా వర్ణింపబడియున్నది. ఈ క్రమణిక ప్రస్తుతసృష్టి కథలో వివరించిన విధానమునకు బహుచేరువుగా నున్నది. దీనిని నమన్వయించుటకు ఆకాశాత్ వాయుః అనగా నాకాశమందుముందుగా చలించు తేజోవాయు పుత్పన్నమైన దనుకోవలెను. ఇదియే నెబ్యులస్. వీటినుండి అగ్ని అనగా సూర్యుండలములోని యగ్నితోగూడిన తేజో వాయువు. వీటినుండి యావిరి అది చల్లబడగా మున్ముందు నీరుద్భవించినది. ఆ నీటియావిరి చల్లదనముచేత భూమ్యుపరిభాగమందు భూగడ్డ తెట్టు ఏర్పడియున్నది. ఆ తెట్టుదిగాద ముందుగా మొక్కలు పుట్టినవి. మొక్కలయందు హరితస్రకలిమిని యాహారనిర్మాణశక్తి కలిగినది.

జంతుపరిణామమును సమన్వయించుటకొకటి విశేష మార్గాల మున్నది. పురాణములలో చెప్పిన క్రమమున మహావిప్లవములకు యవతారములను బరికీలించి చూచినచో వరుసగా 1. చేప (జలమందుండు జంతువు (Water animal) 2. తాబేలు (ఉభయజీవి. Amphelian) 3. వరాహము (మొట్టమొదటి నిరసించుజంతువు) 4. వరసింహము (Lion and man) 5. వామనమూర్తి (Dwarfman) 6. క్రీడామానవతారము. (ఇందు కోతిమనుష్యులు) 7. క్రీకృష్ణావతారము (నాగరికతగల మనుష్యులు) 8. తాండవావతారము (మామూలు మేధావిమైన మనుష్యులు.)

ఈ గ్రంథమునందు వర్ణింపబడిన కీలినీ విప్లవమూర్తి యవతారములు గూడ క్రమముదప్పక ముందు జలచరస్థితి, యట్లుపైనుభయ ప్రదేశజీవి, దానివెనుక పూర్తిగా మొట్టమొదటమాత్రమే నివసించగల్గిన జంతువు నుండులచేత నినిన్నయు పరిణామవాదమును బలపరుచుచున్నవి.

ఇంతవరకు వినరించిన విషయమంతయు వృక్షములలోను, జంతువులలోను శరీరాభివృద్ధిని, దాని పరిణామమును మాత్రమే దెల్పుచున్నది. అంతియగాక మానవుని నాగరికతాక్రమము, ఈతని బుద్ధి బలప్రవృద్ధిని గూర్చి సంకుచితముగా చెప్పుచున్నది. జంతువులందును, మొక్కలయందును, మానవులందును జీవాత్మ యను నది యున్నదని చెప్పక తప్పదు. ఈ జీవాత్మను గురించిగాని పరిణామమునుగూర్చిగాని తెలుపుట యీ గ్రంథముయొక్క ఆశయముగాదు.

ఆత్మపదార్థమునుగూర్చి యుపనిషత్తులు శ్రుతి స్మృతులు విపులముగా బోధించుచున్నవి. ఆత్మనుగూర్చి తెలుసుకొనుట చాల దుర్లభము. దీనివిషయము కఠోపనిషత్తునందు విపులముగా వినరింపబడినది.

దానిని నిరూపించుటలోగూడ, ఎస్తుత త్వమునుబట్టి యది నల్లనాతీత మగుటయేగాక నర్ణించుట కసాధ్యమనిగూడ తెలియుచున్నది. మనము స్థాలదృష్టి చేతను, సూక్ష్మదృష్టి చేతను దేనినిచూచి తెలుసుకొనలేమో, యట్టి వస్తువు 'ఆత్మగా' చెప్పబడియున్నది.

